

患者説明書あり

クラスII

製 剤 名	キシロカインハチアズレ含嗽水	500mL/ 本
R p .	【般】 <u>アズレンスルホン酸 Na 水和物・炭酸水素ナトリウム含嗽剤</u>	10 g
	【般】 <u>リドカイン塩酸塩液 4%</u>	10 mL
	<u>注射用水</u> を加えて	500 mL
準備するもの	500 mL の外用水剤の容器（赤キャップ）、メートルグラス	
調製法	<p>① 500 mL の外用容器に 200 ～ 300mL の注射用水を敷き水し、<u>アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム含嗽剤</u>10 gを加える。</p> <p>② <u>リドカイン塩酸塩液 4%</u> を10 mL加える。</p> <p>③ <u>注射用水</u>を加え全量 500 mL にする。</p>	
使用目的	化学療法剤使用に伴う口内炎等の痛み	
用法 用量	1 日数回、口腔内不快感時にうがいする	
容 器	500 mL の外用水剤の容器（赤キャップ）	
貯法	冷所保存（冷液は、口内炎の炎症に清涼感を与える）	
使用期限	未開封 3 週間、開封後 1 週間	
備 考	【参考】エレース含嗽水（2003 年 5 月 13 日）	

2014 年 2 月

2014 年 10 月

2015 年 4 月

2015 年 11 月

2022 年 7 月