

患者説明書あり

クラスⅢ

製 剤 名		P-AG 液	
R p .	【般】 <u>ポラプレジック口腔内崩壊錠 75mg</u>	9 錠	
	【般】 <u>アルギン酸ナトリウム液 5%</u>	140 mL	
	注射用水	140 mL	
	全量	280 mL	
準備するもの	内容水剤の容器（白キャップ）、薬杯		
調製法	① <u>ポラプレジック口腔内崩壊錠 75 mg</u> 9 錠を容器にとる。 ② 注射用水 140 mL を加えて錠剤を崩壊させ、懸濁液とする。 ③ <u>アルギン酸ナトリウム液 5%</u> を 140 mL 加え、全量 280 mL とする。		
使用目的	口内炎予防及び口内炎治療		
用 法 用 量	1 日 4 回 毎食後＋寝る前・・・最高 6 回まで可 1 回 10 mL を口腔内全体に含ませた後、嚥下する。 必要時 フレーバー使用		
容 器	内用水剤の容器（白キャップ）		
貯法	冷所保存		
使用期限	14 日		
備 考	亜鉛：抗酸化作用、粘膜保護作用、創傷治癒作用 アルギン酸ナトリウム液：粘膜付着作用、止血作用 【参考文献】 病院薬局製剤〔第 6 版〕P 5 日本薬学会第 129 年会（2009 年）		

2014 年 10 月

2015 年 4 月

2019 年 3 月（サンメールからアルロイド G へ採用変更）

2022 年 7 月