

消化器内科・消化器外科.....	4
5-FU+CDDP+T-mab 療法(初回).....	4
5-FU+CDDP+T-mab 療法(2回目以降).....	6
Bevacizumab (10mg)+FOLFIRI(ポンプ使用).....	8
Bevacizumab (10mg)+mFOLFOX6(ポンプ使用).....	9
Bevacizumab (5mg)+FOLFIRI(ポンプ使用).....	10
Bevacizumab (5mg)+mFOLFOX6(ポンプ使用).....	11
Cape+CDDP+T-mab 療法 (初回).....	12
Cape+CDDP+T-mab 療法 (2回目以降).....	15
CapeOX+Nivolumab (胃).....	18
CAPOX+T-mab(初回).....	19
CAPOX+T-mab(2回目以降).....	20
CDDP+ETP.....	21
CDGP/5-FU(食道地固め).....	22
CPT-11 A 法(胃).....	24
CPT-11 B 法.....	25
DCF 療法.....	26
Durvalumab + Tremelimumab.....	28
Durvalumab(1500mg 4週毎 肝臓癌/胆道癌).....	29
FOLFIRI(ポンプ使用).....	30
FOLFIRINOX.....	31
FP 療法.....	32
FP+ペムブロリズマブ.....	34
GEM+CDDP.....	36
GEM+CDDP+Durvalumab.....	37
GEM+CDDP+S1.....	39
GEM+Radiation(膵癌).....	40
GEM+S1 療法.....	41
Docetaxel(食道).....	42
IRIS.....	43
Low dose FP.....	44
mFOLFIRINOX.....	45
Nivolumab(240mg 2週毎).....	46
Nivolumab (480mg 4週毎).....	47
mFOLFOX6(ポンプ使用).....	48
RPMI+CDDP.....	49
S1/CDDP 併用療法(胃).....	50
S1/Docetaxel 療法.....	53
S1+PTX(胃).....	54

SOX.....	55
SOX(胃).....	56
SOX+Nivolumab (胃)	57
SOX+T-mab(2回目以降).....	58
SOX+T-mab(初回).....	59
SOX+ ベバシズマブ	60
SP療法 (3週毎).....	61
TACE(肝臓癌)	63
TAI (CDDP) Auto injection.....	64
TAI (CDDP) 手押し.....	65
MTX-5FU療法(胃)	66
Weekly GEM.....	68
weekly PTX (胃癌)	69
weekly PTX (食道癌)	70
weekly アブラキサン.....	71
XELIRI+Bev(7.5mg/kg).....	72
XELIRI+ベバシズマブ (5mg/kg)	73
XELOX.....	74
XELOX+ ベバシズマブ	75
XP療法	76
アテゾリズマブ+ベバシズマブ	78
アブラキサン	79
アブラキサン+ゲムシタピン	80
アブラキサン+サイラムザ併用療法.....	81
オニバイド+5FU/LV.....	82
肝臓 RAM.....	83
サイラムザ+FOLFIRI.....	84
サイラムザ+PTX療法.....	85
サイラムザ単独.....	86
ザルトラップ-FOLFIRI	87
ストレプトゾシン	88
セツキシマブ (毎週) 単独 (初回)	89
セツキシマブ (毎週) 単独 (2回目以降)	90
セツキシマブ+エンコラフェニブ (初回)	91
セツキシマブ+エンコラフェニブ (2回目以降初回)	92
セツキシマブ+エンコラフェニブ+ビメニチニブ (初回)	93
セツキシマブ+エンコラフェニブ+ビメニチニブ (2回目以降初回)	94
セツキシマブ (2週毎) 単独.....	95
セツキシマブ (2週毎) +FOLFIRI	96
セツキシマブ (2週毎) +IRIS	97
セツキシマブ (2週毎) +mFOLFOX6.....	98

セツキシマブ (2週毎) +エンコラフェニブ	99
セツキシマブ (2週毎) +エンコラフェニブ+ビメニチニブ.....	100
ゼローダ +アバスチン	101
低容量 CDGP/5-FU による放射線化学療法(食道)	102
トラスツズマブ デルクステカン	103
ベクティビックス単独療法.....	104
ベクティビックス+mFOLFOX 6	105
ベクティビックス+FOLFIRI.....	106
ベバシズマブ -IRIS	107
ペルツズマブ+トラスツズマブ(初回).....	108
ペルツズマブ+トラスツズマブ(2回目以降初)	109
ミリプラ.....	110
ロンサーフ+ ベバシズマブ	111

消化器内科・消化器外科

5-FU+CDDP+T-mab 療法(初回)

がん腫	胃癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
2	ラクテック輸液 500mL	1瓶
	点滴静注	
3	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 10mL	1S
	静注	

Day2

1	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	硫酸Mg補正液 1mEq/mL 20mL	8ml
	点滴静注	
2	トラスツズマブ (ハーセプチン)	8mg/kg
	生理食塩液 100mL	1キット
	注射用水 20mL	2A
	点滴静注	
3	デキサメタゾン 6.6mg	2瓶
	パロノセトロン 0.75mg	1瓶
	生理食塩液 50mL	1瓶
	点滴静注	
4	フルオロウラシル	800mg/m ²
	生理食塩液 500mL	1袋
	点滴静注	
5	フロセミド 20mg	0.5A
	静注	

6	生理食塩液 500 mL	1 袋
	シスプラチン	80 mg/m ²
	点滴静注	
7	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
8	ラクテックD輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
9	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day3, 4

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
3	フルオロウラシル	800 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day5, 6

1	ソルデム3A輸液 500 mL	800 mg
	点滴静注	1 袋

アプレピタント併用

5-FU+CDDP+T-mab 療法(2回目以降)

がん腫	胃癌
1サイクルの日数	21

Day1

1	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
2	ラクテック輸液 500mL	1瓶
	点滴静注	
3	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 10mL	1S
	静注	

Day2

1	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	硫酸Mg補正液 1mEq/mL 20mL	8ml
	点滴静注	
2	トラスツズマブ (ハーセプチン)	6mg/kg
	生理食塩液 100mL	1キット
	注射用水 20mL	2A
	点滴静注	
3	デキサメタゾン 6.6mg	2瓶
	パロノセトロン 0.75mg	1瓶
	生理食塩液 50mL	1瓶
	点滴静注	
4	フルオロウラシル	800mg
	生理食塩液 500mL	1袋
	点滴静注	
5	フロセミド 20mg	0.5A
	静注	
6	生理食塩液 500mL	1袋

	シスプラチン	80 mg/m ²
	点滴静注	
7	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
8	ラクテックD輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
9	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day3, 4

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
3	フルオロウラシル	800 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day5, 6

1	ソルデム3A輸液 500 mL	800 mg
	点滴静注	1 袋

アプレピタント併用

Bevacizumab (10mg)+FOLFIRI(ポンプ使用)

がん腫	大腸癌
1 サイクルの日数	14

Day1

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 100 mL	1 キット
	ベバシズマブ BS	10 mg/kg
	点滴静注	
3	生理食塩液 20 mL	1 A
	点滴静注	
4	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	レボホリナート	200 mg/m ²
	点滴静注	
5	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	イリノテカン	150 mg/m ²
	点滴静注	
6	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	フルオロウラシル	400 mg/m ²
	点滴静注	
7	生理食塩液 100 mL	1 キット
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²
	点滴静注	

Bevacizumab (10mg)+mFOLFOX6(ポンプ使用)

がん腫	大腸癌
1 サイクルの日数	14

Day1

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 100 mL	1 キット
	ベバシズマブ BS	10 mg/kg
	点滴静注	
3	生理食塩液 20 mL	1 A
	点滴静注	
4	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	レボホリナート	200 mg/m ²
	点滴静注	
5	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	オキサリプラチン	85 mg/m ²
	点滴静注	
6	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	フルオロウラシル	400 mg/m ²
	点滴静注	
7	生理食塩液 100 mL	1 キット
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²
	点滴静注	

Bevacizumab (5mg)+FOLFIRI(ポンプ使用)

がん腫	大腸癌
1 サイクルの日数	14

Day1

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 100 mL	1 キット
	ベバシズマブ BS	5 mg/kg
	点滴静注	
3	生理食塩液 20 mL	1 A
	点滴静注	
4	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	レボホリナート	200 mg/m ²
	点滴静注	
5	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	イリノテカン	150 mg/m ²
	点滴静注	
6	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	フルオロウラシル	400 mg/m ²
	点滴静注	
7	生理食塩液 100 mL	1 キット
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²
	点滴静注	

Bevacizumab (5mg)+mFOLFOX6(ポンプ使用)

がん腫	大腸癌
1 サイクルの日数	14

Day1

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 100 mL	1 キット
	ベバシズマブ BS	5 mg/kg
	点滴静注	
3	生理食塩液 20 mL	1 A
	点滴静注	
4	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	レボホリナート	200 mg/m ²
	点滴静注	
5	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	オキサリプラチン	85 mg/m ²
	点滴静注	
6	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	フルオロウラシル	400 mg/m ²
	点滴静注	
7	生理食塩液 100 mL	1 キット
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²
	点滴静注	

Cape+CDDP+T-mab 療法 (初回)

がん腫	胃癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
2	ラクテック輸液 500mL	1瓶
	点滴静注	
3	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 10mL	1S
	静注	

Day2

1	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	硫酸Mg補正液 1mEq/mL 20mL	8瓶
	点滴静注	
2	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
3	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 10mL	1S
	静注	
5	トラスツズマブ (ハーセプチン)	8mg/kg
	生理食塩液 100mL	1瓶
	注射用水 20mL	2A
	点滴静注	
6	パロノセトロン 0.75mg	1瓶
	デキサメタゾン 6.6mg	2瓶
	生理食塩液 50mL	1瓶
	点滴静注	

7	フロセミド 20 mg	0.5 A
	静注	
8	生理食塩液 500 mL	1 袋
	シスプラチン	80 mg/m ²
	点滴静注	
9	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
10	ラクテックD輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day3

1	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 10 mL	1 S
	静注	

Day4

1	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	

4	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	

カペシタビン：2000mg/m² (day1-14)

アプレピタント併用

Cape+CDDP+T-mab 療法 (2回目以降)

がん腫	胃癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
2	ラクテック輸液 500mL	1瓶
	点滴静注	
3	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 10mL	1S
	静注	

Day2

1	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	硫酸Mg補正液 1mEq/mL 20mL	8瓶
	点滴静注	
2	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
3	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 10mL	1S
	静注	
5	トラスツズマブ (ハーセプチン)	6mg/kg
	生理食塩液 100mL	1瓶
	注射用水 20mL	2A
	点滴静注	
6	パロノセトロン 0.75mg	1瓶
	デキサメタゾン 6.6mg	2瓶
	生理食塩液 50mL	1瓶
	点滴静注	

7	フロセミド 20 mg	0.5 A
	静注	
8	生理食塩液 500 mL	1 袋
	シスプラチン	80 mg/m ²
	点滴静注	
9	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
10	ラクテックD輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day3

1	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 10 mL	1 S
	静注	

Day4

1	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	

4	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	

カペシタビン：2000mg/m² (day1-14)

アプレピタント併用

CapeOX+Nivolumab（胃）

がん腫	胃癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	グラニセトロン静注液 1 mg / 1 mL シリンジ	1 筒
	デキサート注射液 6. 6 mg (*デカドロン)	1 瓶
	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【212mL/h】	化療①[23:31]
2	ブドウ糖注 5% 500 mL	1 袋
	オキサリプラチン点滴静注液 100mg	130 mg/m ²
	デキサート注射液 3. 3 mg (*デカドロン)	0.5 A
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【263.25mL/h】	化療②[23:32]
3	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴（全開）	化療③[23:33]
4	オブジーボ点滴静注 100 mg / 10 mL	360 mg
	大塚生食注 2 ポート 100 mL	70 mL
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【212mL/h】	化療④[23:34]
5	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴（全開）	化療⑤[23:35]

カペタビン：(C 法) 2000mg/m²/day (D1-14)

CAPOX+T-mab(初回)

がん腫	胃癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 100 mL	1 ㇿ
	トラスツズマブ (ハーセプチン)	8 mg/kg
	注射用水 20 mL	2 A
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 ㇿ
	生理食塩液 50 mL	1 ㇿ
	点滴静注	
3	5%ブドウ糖注 500 mL	1 袋
	オキサリプラチン	130 mg/m ²
	デキサメタゾン 3.3 mg	0.5 A
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 ㇿ
	点滴静注	

カペシタビン：(C法) 2000mg/m²/day (D1-14)

CAPOX+T-mab(2回目以降)

がん腫	胃癌
1サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 100 mL	1 ㇿ
	トラスツズマブ (ハーセプチン)	6 mg/kg
	注射用水 20 mL	2 A
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 ㇿ
	生理食塩液 50 mL	1 ㇿ
	点滴静注	
3	5%ブドウ糖注 500 mL	1 袋
	オキサリプラチン	130 mg/m ²
	デキサメタゾン 3.3 mg	0.5 A
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 ㇿ
	点滴静注	

カペシタビン：(C法) 2000mg/m²/day (D1-14)

CDDP+ETP

がん腫	緊急申請
1 サイクルの日数	21

Day1

1	硫酸Mg補正液 1 mEq/mL 20mL (要希釈)	1 A
	テルモ生食 500 mL	1 袋
	点滴 (速度指定) mL/h 【70mL/h】	10:00
2	デキサート注射液 6.6 mg (*デカロン)	1 瓶
	パロノセトロン静注 0.75mg/5mL	1 瓶
	生理食塩液 PL「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【228mL/h】	10:15
	テルモ生食 500 mL	500 mL
	シスプラチン点滴静注 10 mg 20 mL	80 mg/m ²
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【250mL/h】	10:30
	15%マンニトールS注射液 300 mL	1 袋
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	12:30
	テルモ生食 500 mL	1 袋
	エポシド点滴静注液 100mg/5mL「サト」(*ラステット)	100 mg/m ²
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【252.5mL/h】	13:00
	生理食塩液 PL「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	15:00
	テルモ生食 500 mL	1 袋
	点滴 (速度指定) mL/h 【70mL/h】	17:00

Day2

	ラクテック注 500 mL	1 瓶
	点滴 (速度指定) mL/h 【40mL/h】	00:00
	デキサート注射液 6.6 mg (*デカロン)	1 瓶
	生理食塩液 PL「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【208mL/h】	10:15
	テルモ生食 500 mL	1 袋

	エポシド 点滴静注液 100mg/5mL「サント」(*ラステット)	100 mg/m ²
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【252.5mL/h】	10:30
	ラクテック注 500 mL	1 瓶
	点滴 (速度指定) mL/h 【40mL/h】	12:00
	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	12:30

Day3

	ラクテック注 500 mL	1 瓶
	点滴 (速度指定) mL/h 【40mL/h】	00:00
	デキサート注射液 6. 6 mg (*デカトロン)	1 瓶
	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【208mL/h】	10:15
	テルモ生食 500 mL	1 袋
	エポシド 点滴静注液 100mg/5mL「サント」(*ラステット)	100 mg/m ²
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【252.5mL/h】	10:30
	ラクテック注 500 mL	1 瓶
	点滴 (速度指定) mL/h 【40mL/h】	12:00
	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	12:30

CDGP/5-FU(食道地固め)

がん腫	食道癌
1 サイクルの日数	28

Day1-5

1	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 100 mL	1 キット
	ネダプラチン (アクプラ)	14 mg/m ²
	点滴静注	

3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	ラクテックD輸液 500 mL	1 袋
	フルオロウラシル	500 mg/m ²
	点滴静注	

CPT-11 A 法(胃)

がん腫	胃癌
1 サイクルの日数	42

Day1, 8, 15, 22

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	イリノテカン	100 mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

CPT-11 B 法

がん腫	胃癌
1 サイクルの日数	63

Day1, 15, 29

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 250 mL	1 袋
	イリノテカン	150 mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

DCF 療法

がん腫	食道癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	ラクテックD輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	ソルデム3AG輸液 500 mL	1 袋
	硫酸Mg補正液 1 mEq/mL 20 mL	8 瓶
	点滴静注	
3	ソルデム3AG輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	パロノセトロン 0.75 mg	1 瓶
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 100 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	ドセタキセル	30 mg/m ²
	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	点滴静注	
6	シスプラチン	80 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
7	フルオロウラシル	800 mg/m ²
	生理食塩液 1000 mL	1 袋
	点滴静注	
8	ソルデム3AG輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day2-6

1	ラクテックD輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	ソルデム3AG輸液 500 mL	1 袋

	点滴静注	
3	ソルデム3AG輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
4	デキサメタゾン 6.6mg	1瓶
	生理食塩液 100mL	1キット
	点滴静注	
5	フルオロウラシル	800mg/m ²
	生理食塩液 1000mL	1袋
	点滴静注	

Day6

1	生理食塩液 50mL	1瓶
	点滴静注	

Day15

1	デキサメタゾン 6.6mg	1瓶
	生理食塩液 100mL	1キット
	点滴静注	
2	ドセタキセル	30mg/m ²
	5%ブドウ糖液 250mL	1瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 50mL	1瓶
	点滴静注	

アプレピタント併用

Durvalumab + Tremelimumab

がん腫	肝臓癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL 点滴（全開）	1 罎
2	トレメリムマブ点滴静注用（25, 300） 大塚生食注 250 mL 化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【265mL/h】	300 mg/body 1 袋
3	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL 点滴（全開）	1 罎
4	イミフィンジ点滴静注 120 mg / 2.4 mL 大塚生食注 250 mL 化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【280mL/h】	1500 mg/body 1 袋
5	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL 点滴（全開）	1 罎

Tremelimumab:300mg/body(D1), Durvalumab: 1500mg/body(D1) / 28D
1 回のみ、以降は Durvalumab(1500mg 4 週毎 肝臓癌) のレジメンで継続

切除不能な肝細胞癌の場合

1. イミフィンジ・イシュド併用療法

イミフィンジ
通常、成人にはデュルバルマブ（遺伝子組換え）*として、1回1500mgを4週間間隔で60分以上かけて点滴静注する。ただし、体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kg（体重）とする。

イシュド
デュルバルマブ（遺伝子組換え）*との併用において、通常、成人にはトレメリムマブ（遺伝子組換え）*として、300mgを60分以上かけて単回点滴静注する。ただし、体重30kg以下の場合の投与量は4mg/kg（体重）とする。

2. イミフィンジ単剤療法
通常、成人にはデュルバルマブ（遺伝子組換え）として、1回1500mgを4週間間隔で60分以上かけて点滴静注する。ただし、体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kg（体重）とする。

*: HIMALAYA試験（デュルバルマブ+トレメリムマブ併用療法群）においては、デュルバルマブ1500mg及びトレメリムマブ300mgを1回、その後、4週間の間隔を空けてデュルバルマブ1500mgを4週間間隔で受与しました。1回目の併用投与時は、トレメリムマブを最初に投与し、トレメリムマブ投与終了後にデュルバルマブを投与しました。

Durvalumab(1500mg 4 週毎 肝臓癌／胆道癌)

がん腫	肝臓癌／胆道癌
1 サイクルの日数	28

Day1, 15

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴 (全開)	
2	イミフィンジ点滴静注 1 2 0 m g / 2 . 4 m L	1500 mg/body
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【280mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴 (全開)	

Durvalumab: 1500mg 4 週毎

FOLFIRI(ポンプ使用)

がん腫	大腸癌
1 サイクルの日数	14

Day1

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	レボホリナート	200 mg/m ²
	点滴静注	
3	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	イリノテカン	150 mg/m ²
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	フルオロウラシル	400 mg/m ²
	点滴静注	
5	生理食塩液 100 mL	1 キット
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²
	点滴静注	

FOLFIRINOX

がん腫	膵臓癌
1 サイクルの日数	14

Day1

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	オキサリプラチン	85 mg/m ²
	5%ブドウ糖液 2 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	5%ブドウ糖液 2 5 0 m L	1 瓶
	イリノテカン	180 mg/m ²
	点滴静注	
4	5%ブドウ糖液 2 5 0 m L	1 瓶
	レボホリナート	200 mg/m ²
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	フルオロウラシル	400 mg/m ²
	点滴静注	
6	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²
	点滴静注	

FP 療法

がん腫	食道癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	生食 500 mL	1 袋
	硫酸Mg 補正液 1 mEq/mL 20 mL	8 mL
	KCL 注 20mEq キット	10 mL
	点滴静注	
2	パロノセトロン 0.75 mg	1 瓶
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
3	生食 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	ラシックス注 20mg	1 A
	静注	
5	シスプラチン	80 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
6	生理食塩液 PL 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴 (全開)	
7	生理食塩液 PL 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴 (全開)	
8	生食 500 mL	1 袋
	点滴静注	
9	フルオロウラシル	800 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day2-3

1	生食 500 mL	1 袋
---	-----------	-----

	点滴静注	
4	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
5	フルオロウラシル	800 mg/m ²
	生理食塩液 1000 mL	1 袋
	点滴静注	

Day4-5

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	フルオロウラシル	800 mg/m ²
	生理食塩液 1000 mL	1 袋
	点滴静注	

Day6

3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

シプ ラチン : 80mg/m²(day1), 5FU : 800mg/m²(day1-5) / 4weeks

アプレビタト併用

FP+ペムプロリズマブ

がん腫	食道癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 罎
	点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	09:29
2	キイトルーダ点滴静注 100 mg 4 mL	200 mg/body
	大塚生食注2ポート 100 mL	1 キツ
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【216mL/h】	09:30
3	テルモ生食 500 mL	1 袋
	硫酸Mg 補正液 1 mEq/mL 20mL (要希釈)	8 mL
	KCL注 20 mEq キット (要希釈)	10 mL
	点滴 (速度指定) mL/h 【259mL/h】	10:00
4	パロノセトロン静注 0.75mg/5mL	1 瓶
	デキサート注射液 6. 6 mg (*デ'カ'ロン)	1 罎
	デキサート注射液 3. 3 mg (*デ'カ'ロン)	1 A
	大塚生食注2ポート 100 mL	1 キツ
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【216mL/h】	11:45
5	テルモ生食 500 mL	1 袋
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【250mL/h】	12:00
6	シスプラチン点滴静注 10 mg 20 mL	80 mg/m ²
	テルモ生食 500 mL	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【250mL/h】	12:00
7	ラシックス注 20 mg	1 A
	点滴の側管から静注	12:00
8	テルモ生食 500 mL	1 袋
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【250mL/h】	14:00
9	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 罎
	点滴 (全開)	14:00

10	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 罎
	点滴 (全開)	14:01
11	フルオウラシル注 250mg 5mL「ト-7」(*5-FU)	800 mg/m ²
	テルモ生食 500 mL	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【21.5mL/h】	14:02

Day2, 3

1	テルモ生食 500 mL	1 袋
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【250mL/h】	09:00
2	デキサート注射液 6. 6 mg (*デ'カ'ロン)	1 罎
	大塚生食注 2 ポート 100 mL	1 罎
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【204mL/h】	11:00
3	テルモ生食 500 mL	1 袋
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【250mL/h】	11:30
4	フルオウラシル注 250mg 5mL「ト-7」(*5-FU)	800 mg/m ²
	テルモ生食 500 mL	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【21.5mL/h】	14:00

Day4,5

1	デキサート注射液 6. 6 mg (*デ'カ'ロン)	1 罎
	大塚生食注 2 ポート 100 mL	1 罎
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【204mL/h】	11:00
2	フルオウラシル注 250mg 5mL「ト-7」(*5-FU)	800 mg/m ²
	テルモ生食 500 mL	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【21.5mL/h】	14:00

Day6

1	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 罎
	点滴 (全開)	14:00

ペムブロリズマブ：200mg/body(day1)、シスプラチン：80mg/m²(day1),5FU：800mg/m²(day1-5) / 3weeks
アプレタト併用

GEM+CDDP

がん腫	胆道癌、膵臓癌
1 サイクルの日数	21

Day1, 8

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	シスプラチン	25 mg/m ²
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

GEM+CDDP+Durvalumab

がん腫	胆道癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL 点滴（全開）	1 罎
2	イミフィンジ点滴静注 120 mg / 2.4 mL 大塚生食注 250 mL 化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【280mL/h】	1500 mg 1 袋
3	グラニセトロン静注液 1 mg / 1 mL シリンジ デキサート注射液 6.6 mg (*デカトロン) 生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL 点滴（速度指定） mL/h 【212mL/h】	1 筒 1 罎 1 罎
4	ゲムシタビン点滴静注用 大塚糖液 5% TN 100 mL 化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【200mL/h】	1000 mg/m ² 1 キツ
5	シスプラチン点滴静注 10 mg 20 mL 大塚生食注 250 mL 化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【300mL/h】	25 mg/m ²
6	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL 点滴（全開）	

Day8

1	グラニセトロン静注液 1 mg / 1 mL シリンジ デキサート注射液 6.6 mg (*デカトロン) 生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL 点滴（速度指定） mL/h 【212mL/h】	1 筒 1 罎 1 罎
2	ゲムシタビン点滴静注用 大塚糖液 5% TN 100 mL 化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【200mL/h】	1000 mg/m ² 1 キツ
3	シスプラチン点滴静注 10 mg 20 mL 大塚生食注 250 mL	25 mg/m ²

	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【300mL/h】	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	
	点滴 (全開)	

GEM: 1000mg/m²(D1,8), CDDP: 25mg/m²(D1,8), Durvalumab: 1500mg/body(D1) / 21D

最大 8 回、終了後は、Durvalumab(1500mg 4 週毎 胆道癌)に変更

GEM+CDDP+S1

がん腫	胆道癌
1 サイクルの日数	14

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	シスプラチン	25 mg/m ²
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

S-1 80mg/m²/日 Day1-7

GEM+Radiation(膵癌)

がん腫	胆道癌
1 サイクルの日数	5 週連続投与

Day1, 8, 15, 22, 29, 36

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	ゲムシタビン	600 mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

GEM は 400mg/m²から開始し増減

GEM+S1 療法

がん腫	胆道癌、膵臓癌
1 サイクルの日数	21

Day1, 8

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	5%ブドウ糖液 100 mL	1 キット
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

S-1 : 80mg/m² (day1-14)

Docetaxel(食道)

がん腫	食道癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	ドセタキセル	70 mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

IRIS

がん腫	大腸癌
1 サイクルの日数	28

Day1, 15

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	イリノテカン	125 mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

S-1 : 80mg/m² (day1-14)

Low dose FP

がん腫	胃癌
1 サイクルの日数	42

Day1-5, 8-12, 15-19, 22-26

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	シスプラチン	6 mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	フルオロウラシル	330 mg/m ²
	点滴静注	

mFOLFIRINOX

がん腫	膵臓癌
1 サイクルの日数	14

Day1

1	デキサート注射液 6. 6 mg (*テカドロン)	1 瓶
	デキサート注射液 3. 3 mg (*テカドロン)	1 A
	グラニセトロン静注液 1 mg / 1 mL シリジ	1 筒
	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴 (速度指定) mL/h 【216mL/h】	化療①[23:31]
2	オキサリプラチン点滴静注液 100mg	85 mg/m ²
	ブドウ糖注 5% 250 mL	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【133.5mL/h】	化療②[23:32]
3	ブドウ糖注 5% 250 mL	1 袋
	イリノテカン塩酸塩点滴静注 40mg	150 mg/m ²
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【171.66mL/h】	化療③[23:33]
4	ブドウ糖注 5% 250 mL	1 袋
	レボオキサリプラチン点滴静注用 25 mg 「NP」	200 mg/m ²
	化学療法 点滴の側管から点滴 mL/h 【125mL/h】	化療③[23:33]
5	大塚生食注 2 ポート 100 mL	1 キット
	フルオウラシル注 250mg 5mL 「ト-ワ」(*5-FU)	2400 mg/m ²
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【3.21mL/h】	化療④[23:34]

L-OHP : 85mg/m², CPT-11 : 150mg/m², LV : 200mg/m², 5-FU (ホソフ) : 2400mg/m² / 2w

Nivolumab(240mg 2 週毎)

がん腫	胃癌、食道癌
1 サイクルの日数	14

Day1

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ニボルマブ (オプジーボ)	240 mg
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Nivolumab (480mg 4 週毎)

がん腫	胃癌、食道癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ニボルマブ (オプジーボ)	480 mg
	生理食塩液 100 mL	70mL
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

mFOLFOX6(ポンプ使用)

がん腫	大腸癌、小腸癌
1 サイクルの日数	14

Day1

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	レボホリナート	200 mg/m ²
	点滴静注	
3	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	オキサリプラチン	85 mg/m ²
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	フルオロウラシル	400 mg/m ²
	点滴静注	
5	生理食塩液 100 mL	1 キット
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²
	点滴静注	

RPMI+CDDP

がん腫	胃癌
1 サイクルの日数	56

Day1, 8, 15, 22, 29, 36

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	レボホリナート	250 mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	フルオロウラシル	600 mg/m ²
	点滴静注	
4	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	シスプラチン	25 mg/m ²
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

S1/CDDP 併用療法(胃)

がん腫	胃癌
1 サイクルの日数	35

Day7

1	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
2	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
3	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 10mL	1S
	静注	

Day8

1	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	硫酸Mg補正液 1mEq/mL 20mL	8ml
	点滴静注	
2	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
3	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 10mL	1S
	静注	
5	グラニセトロン 1mg	1筒
	デキサメタゾン 6.6mg	2瓶
	生理食塩液 50mL	1瓶
	点滴静注	
6	フロセミド 20mg	0.5A
	静注	
7	生理食塩液 500mL	1袋

	シスプラチン	60 mg/m ²
	点滴静注	
8	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
9	ラクテックD輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day9

1	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 10 mL	1 S
	静注	

Day10

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
3	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

S-1 : 80mg/m² (day1-21)

アプレピタント併用

S1/Docetaxel 療法

がん腫	食道癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	ドセタキセル	40 mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

S-1 : 80mg/m²(day1-14)

S1+PTX(胃)

がん腫	胃癌
1 サイクルの日数	21

Day1, 8

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	デキサメタゾン 6.6 mg	2 瓶
	デキサメタゾン 3.3 mg	1 A
	ファモチジン 20 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	パクリタキセル	50 mg/m ²
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

S-1 : 80mg/m² (day1-14)

SOX

がん腫	大腸癌
1 サイクルの日数	21

Day1, 15

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	5%ブドウ糖注 5 0 0 m L	1 袋
	オキサリプラチン	130 mg/m ²
	デキサメタゾン 3. 3 m g	0.5 A
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

S-1 : 80mg/m² (day1-14)

SOX(胃)

がん腫	胃癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	5%ブドウ糖注 5 0 0 m L	1 袋
	オキサリプラチン	100 mg/m ²
	デキサメタゾン 3. 3 m g	0.5 A
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

S-1 : 80mg/m² (day1-14)

SOX+Nivolumab（胃）

がん腫	胃癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	グラニセトロン静注液 1 mg / 1 mL シリンジ	1 筒
	デキサート注射液 6. 6 mg (*デカドロン)	1 瓶
	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【212mL/h】	化療①[23:31]
2	ブドウ糖注 5% 500 mL	1 袋
	オキサリプラチン点滴静注液 100mg	100 mg/m ²
	デキサート注射液 3. 3 mg (*デカドロン)	0.5 A
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【260.25mL/h】	化療②[23:32]
3	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴（全開）	化療③[23:33]
4	オブジーボ点滴静注 100 mg / 10 mL	360 mg
	大塚生食注 2 ポート 100 mL	70 mL
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【212mL/h】	化療④[23:34]
5	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴（全開）	化療⑤[23:35]

S-1 : 80mg/m² (day1-14)

SOX+T-mab(2回目以降)

がん腫	胃癌
1サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 100 mL	1 ㊦
	トラスツズマブ (ハーセプチン)	6 mg/kg
	注射用水 20 mL	2 A
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 ㊦
	生理食塩液 50 mL	1 ㊦
	点滴静注	
3	5%ブドウ糖注 500 mL	1 袋
	オキサリプラチン	100 mg/m ²
	デキサメタゾン 3.3 mg	0.5 A
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 ㊦
	点滴静注	

S-1 : 80mg/m²/day (D1-14),

SOX+T-mab(初回)

がん腫	胃癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 100 mL	1 ㊦
	トラスツズマブ (ハーセプチン)	8 mg/kg
	注射用水 20 mL	2 A
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 ㊦
	生理食塩液 50 mL	1 ㊦
	点滴静注	
3	5%ブドウ糖注 500 mL	1 袋
	オキサリプラチン	100 mg/m ²
	デキサメタゾン 3.3 mg	0.5 A
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 ㊦
	点滴静注	

S-1 : 80mg/m²/day (D1-14),

SOX+ ベバシズマブ

がん腫	大腸癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	ベバシズマブ BS	7.5 mg/kg
	点滴静注	
3	生理食塩液 2 0 m L	1 A
	静注	
4	5%ブドウ糖注 5 0 0 m L	1 袋
	オキサリプラチン	130 mg/m ²
	デキサメタゾン 3. 3 m g	0.5 A
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

S-1 : 80mg/m² (day1-14)

SP 療法 (3 週毎)

がん腫	胃癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	ヴィーンF 輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	ヴィーンF 輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
3	ヴィーンF 輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 10 mL	1 S
	静注	

Day2

1	ソルデム3A 輸液 500 mL	1 袋
	硫酸Mg 補正液 1 mEq/mL 20 mL	8 mL
	点滴静注	
2	ソルデム3A 輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
3	ソルデム3A 輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 10 mL	1 S
	静注	
5	パロノセトロン 0.75 mg	1 瓶
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
6	フロセミド 20 mg	0.5 A
	静注	
	生理食塩液 500 mL	1 袋

7	シスプラチン	60 mg/m ²
	点滴静注	
8	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
9	ヴィーンF輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day3, 4

1	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 10 mL	1 S
	静注	

S-1 : 80mg/m² (day1-14)

アプレピタント併用

TACE(肝臓癌)

がん腫	肝臓癌
1 サイクルの日数	

Day1

1	エピルビシン	40 mg
	動注	

TAI (CDDP) Auto injection

がん腫	肝臓癌
1 サイクルの日数	

Day1

1	生理食塩液 100 mL	1 <small>キット</small>
	シスプラチン (アイエーコール)	100 mg
	動注	

TAI (CDDP) 手押し

がん腫	肝臓癌
1 サイクルの日数	

Day1

1	シスプラチン (アイエーコール)	100 mg
	動注	

MTX-5FU 療法(胃)

がん腫	胃癌
1 サイクルの日数	1-2 週休薬

Day1

1	ラクテックD輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	アセタゾラミド 500 mg	0.5 瓶
	点滴静注	
3	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	メソトレキサート (メソトレキサート)	100 mg/m ²
	点滴静注	
5	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	7%炭酸水素ナトリウム液 20 mL	2 A
	ヘパリンナトリウム 5000 単位/5 mL	0.5 瓶
	点滴静注	
6	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	フルオロウラシル	600 mg/m ²
	点滴静注	

Day2, 3

1	ラクテックD輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	ロイコボリン 3 mg	5 A
	静注	
3	ロイコボリン 3 mg	5 A
	静注	
4	ロイコボリン 3 mg	5 A

	静注	
--	----	--

Weekly GEM

がん腫	胆道癌、膵臓癌
1 サイクルの日数	28

Day1, 8, 15

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	5%ブドウ糖液 100 mL	1 キット
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

weekly PTX (胃癌)

がん腫	胃癌
1 サイクルの日数	28

Day1, 8, 15

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	ファモチジン 20 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	点滴静注	
2	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	パクリタキセル	80 mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

weekly PTX（食道癌）

がん腫	食道癌
1 サイクルの日数	49

Day1, 8, 15, 22, 29, 36

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	ファモチジン 20 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	点滴静注	
2	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	パクリタキセル	100 mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

weekly アブラキサン

がん腫	胃癌
1 サイクルの日数	28

Day1, 8, 15

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	パクリタキセル (アルブミン懸濁型) (アブラキサン)	100 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

XELIRI + Bev(7.5mg/kg)

がん腫	大腸癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ベバシズマブ BS	7.5 mg/kg
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	イリノテカン	200 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	
	点滴静注	

カペシタビン：14 日間内服

1.31 m² 未満 1 8 0 0 mg/日1.31 m² - 1.64 m² 2 4 0 0 mg/日1.64 m² 以上 3 0 0 0 mg/日

XELIRI+ベバシズマブ (5mg/kg)

がん腫	大腸癌
1 サイクルの日数	14

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	ベバシズマブ BS	5 mg/kg
	点滴静注	
3	生理食塩液 2 0 m L	1 A
	静注	
4	5%ブドウ糖液 2 5 0 m L	1 瓶
	イリノテカン	150 mg/m ²
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

カペシタビン：2000mg/m² (day1-7)

XELOX

がん腫	大腸癌、胃癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	5%ブドウ糖注 5 0 0 m L	1 袋
	オキサリプラチン	130 mg/m ²
	デキサメタゾン 3. 3 m g	0.5 A
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

カペシタビン 2000mg/m² (day1-14)

XELOX+ ベバシズマブ

がん腫	大腸癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	ベバシズマブ BS	7.5 mg/kg
	点滴静注	
3	生理食塩液 2 0 m L	1 A
	静注	
4	5%ブドウ糖注 5 0 0 m L	1 袋
	オキサリプラチン	130 mg/m ²
	デキサメタゾン 3. 3 m g	0.5 A
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

カペシタビン：2000mg/m² (day1-14)

XP 療法

がん腫	胃癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	ヴィーンF輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
2	ヴィーンF輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
3	ヴィーンF輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 10mL	1S
	静注	

Day2

1	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	硫酸Mg補正液 1mEq/mL 20mL	8ml
	点滴静注	
2	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
3	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 10mL	1S
	静注	
5	パロノセトロン 0.75mg	1瓶
	デキサメタゾン 6.6mg	1瓶
	生理食塩液 50mL	1瓶
	点滴静注	
6	フロセミド 20mg	0.5A
	静注	
7	生理食塩液 500mL	1袋

	シスプラチン	80 mg/m ²
	点滴静注	
8	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
9	ヴィーンF 輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day3, 4

1	ソルデム3A 輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	ソルデム3A 輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	ソルデム3A 輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 10 mL	1 S
	静注	

カペシタビン：2000mg/m² (day1-14)

アプレピタント併用

アテゾリズマブ+ベバシズマブ

がん腫	肝臓癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 50 mL	1 罎
	点滴静注	
2	アテゾリズマブ (テセントリク)	1200 mg
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 罎
	点滴静注	
4	ベバシズマブ BS	15 mg/kg
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
5	生理食塩液 50 mL	1 罎
	点滴静注	

アブラキサン

がん腫	胃癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	パクリタキセル (アルブミン懸濁型) (アブラキサン)	260 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

アブラキサン+ゲムシタビン

がん腫	膵臓癌
1 サイクルの日数	28

Day1, 8, 15

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	パロノセトロン 0. 7 5 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	パクリタキセル (アルブミン懸濁型) (アブラキサン)	125 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	ゲムシタビン	1000 mg/m ²
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

アブラキサン+サイラムザ併用療法

がん腫	胃癌
1サイクルの日数	28

Day1, 15

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ラムシルマブ (サイラムザ)	8 mg/kg
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	パクリタキセル (アルブミン懸濁型) (アブラキサン)	100 mg/m ²
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
5	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day8

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	パクリタキセル (アルブミン懸濁型) (アブラキサン)	100 mg/m ²
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

オニバイド+5FU/LV

がん腫	膵臓癌
1 サイクルの日数	14

Day1

1	デキサート注射液 6. 6 mg (*テ*カ*ロソ)	
	グラニセトロン静注液 1 mg / 1 mL シリジ	
	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	
	デキサート注射液 3. 3 mg (*テ*カ*ロソ)	1 A
	点滴 (速度指定) mL/h 【216mL/h】	
2	ブドウ糖注 5% 250 mL	
	レボ*ホリ*ナト点滴静注用 25 mg 「NP」	200 mg/m ²
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【125mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 罎
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	
4	ブドウ糖注 5% 500 mL	1 袋
	オニバイド点滴静注 43mg/10mL	70 mg/m ²
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【344.18mL/h】	
5	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 罎
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	
6	大塚生食注 2 ポート 100 mL	1 キツ
	フルオウラシル注 250mg 5mL 「ト-ワ」(*5-FU)	2400 mg/m ²
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h	

"nal-IRI:70mg/m2,

LV:200mg/m2,

5-FU:2400mg/m2"

肝臓 RAM

がん腫	肝臓癌
1 サイクルの日数	14

Day1

1	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ラムシルマブ (サイラムザ)	8 mg/kg
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

サイラムザ+FOLFIRI

がん腫	大腸癌
1 サイクルの日数	14

Day1

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	パロノセトロン 0.75 mg	1 瓶
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ラムシルマブ (サイラムザ)	8 mg/kg
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	イリノテカン	150 mg/m ²
	点滴静注	
5	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	レボホリナート	200 mg/m ²
	点滴静注	
6	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	フルオロウラシル	400 mg/m ²
	点滴静注	
7	生理食塩液 100 mL	1 キット
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²
	点滴静注	

サイラムザ+PTX療法

がん腫	胃癌
1サイクルの日数	28

Day1, 15

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	ファモチジン 20 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ラムシルマブ (サイラムザ)	8 mg/kg
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	パクリタキセル	80 mg/m ²
	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day8

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	ファモチジン 20 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	パクリタキセル	80 mg/m ²
	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

サイラムザ単独

がん腫	胃癌
1 サイクルの日数	14

Day1

1	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ラムシルマブ (サイラムザ)	8 mg/kg
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

ザルトラップ-FOLFIRI

がん腫	大腸癌
1 サイクルの日数	14

Day1

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	パロノセトロン 0.75 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	アフリベルセプト ベータ (ザルトラップ)	4 mg/kg
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	イリノテカン	150 mg/m ²
	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	レボホリナート	200 mg/m ²
	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	点滴静注	
6	フルオロウラシル	400 mg/m ²
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
7	フルオロウラシル	2400 mg/m ²
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	

ストレプトゾシン

がん腫	神経内分泌腫瘍
1 サイクルの日数	7

Day1

1	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	
2	パロノセトロン 0.75 mg	1 瓶
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	ストレプトゾシン (ザノサー)	1 g/m ²
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
4	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	

アプレピタント併用

セツキシマブ（毎週）単独（初回）

がん腫	大腸癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	点滴静注	
3	生理食塩液 250 mL	1 袋
	セツキシマブ（アービタックス）	400 mg/m ²
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

アービタックス単独(初回)より名称変更

セツキシマブ（毎週）単独（2回目以降）

がん腫	大腸癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	点滴静注	
3	生理食塩液 250 mL	1 袋
	セツキシマブ（アービタックス）	250 mg/m ²
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

アービタックス単独(2回目以降)より名称変更

セツキシマブ+エンコラフェニブ（初回）

がん腫	大腸癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	デキサート注射液 6. 6 m g (*デカドロン)	1 瓶
	ポララミン注 5 m g	1 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【212mL/h】	
2	アービタックス注射液 1 0 0 m g 20m L	400 mg/m ²
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【125mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	

"セツキシマブ 400mg/m²(D1)/1w.、エンコラフェニブ 300mg1 日 1 回を連日

2 回目以降アービタックス減量

セツキシマブ □ RAS 野生型"

セツキシマブ+エンコラフェニブ (2回目以降初回)

がん腫	大腸癌
1サイクルの日数	7

Day1

1	デキサート注射液 6. 6 m g (*デ*カ*ロン)	1 罎
	ポララミン注 5 m g	1 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴 (速度指定) mL/h 【212mL/h】	
2	アービタックス注射液 1 0 0 m g 20m L	250 mg/m ²
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【250mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴 (全開)	

セツキシマブ 250mg/m²(D1)/1w、、エンコラフェニブ 300mg1日1回を連日

セツキシマブ+エンコラフェニブ+ビメニチニブ（初回）

がん腫	大腸癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	デキサート注射液 6. 6 m g (*デカドロン)	1 罎
	ポララミン注 5 m g	1 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴（速度指定） mL/h 【212mL/h】	
2	アービタックス注射液 1 0 0 m g 20m L	400 mg/m ²
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【125mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴（全開）	

"セツキシマブ 400mg/m²(D1)/1w、、エンコラフェニブ 300mg1 日 1 回、ビメニチニブ 45mg1 日 2 回を連日

2 回目以降アービタックス減量

セツキシマブ RAS 野生型"

セツキシマブ+エンコラフェニブ+ビメニチニブ (2回目以降初回)

がん腫	大腸癌
1サイクルの日数	7

Day1

1	デキサート注射液 6. 6 mg (*デ*カ*ロソ)	1 罇
	ポララミン注 5 mg	1 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 mL	1 罇
	点滴 (速度指定) mL/h 【212mL/h】	
2	アービタックス注射液 1 0 0 mg 20m L	250 mg/m ²
	大塚生食注 2 5 0 mL	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【250mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 mL	1 罇
	点滴 (全開)	

セツキシマブ 250mg/m²(D1)/1w、、エンコラフェニブ 300mg1 日 1 回、ビメニチニブ 45mg1 日 2 回を連日

セツキシマブ（2週毎）単独

がん腫	大腸癌
1サイクルの日数	14

Day1

1	生理食塩液P L「フソー」 50 mL	1 罎
	デキサート注射液 6.6 mg (*デ*カ*ト*ロン)	1 罎
	ポララミン注 5 mg	1 A
	点滴（速度指定） mL/h 【212mL/h】	化療①[23:31]
2	大塚生食注 250 mL	1 袋
	アービタックス注射液 100 mg 20mL	500 mg/m ²
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【125mL/h】	化療②[23:32]
3	生理食塩液P L「フソー」 50 mL	1 罎
	点滴（全開）	化療③[23:33]

Cmab：500mg/m² / 2wセツキシマブ RAS 野生型

セツキシマブ（2週毎）+FOLFIRI

がん腫	大腸癌
1サイクルの日数	14

Day1

1	デキサート注射液 6. 6 mg (*デカドロン)	1 瓶
	グラニセトロン静注液 1 mg / 1 mL シリンジ	1 筒
	ポララミン注 5 mg	1 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【212mL/h】	化療①[23:31]
2	大塚生食注 250 mL	1 袋
	アービタックス注射液 100 mg 20mL	500 mg/m ²
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【125mL/h】	化療②[23:32]
3	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴（全開）	化療③[23:33]
4	ブドウ糖注 5% 250 mL	1 袋
	レボ ホリナト点滴静注用（25, 100）	200 mg/m ²
	化学療法 点滴の側管から点滴 mL/h 【125mL/h】	化療④[23:34]
5	ブドウ糖注 5% 250 mL	1 袋
	イリノテカン塩酸塩点滴静注 40mg	150 mg/m ²
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【125mL/h】	化療④[23:34]
6	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	フルオウラシル注 250mg 5mL「ト-7」(*5-FU)	400 mg/m ²
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【696mL/h】	化療⑤[23:35]
7	大塚生食注 2 ポート 100 mL	1 キツ
	フルオウラシル注 250mg 5mL「ト-7」(*5-FU)	2400 mg/m ²
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h	化療⑥[23:36]

"Cmab : 500mg/m², LV : 200mg/m², CPT-11 : 150mg/m², 5-FU (iv) : 400mg/m², 5-FU (ホソフ) : 2400mg/m²

セツキシマブ □ RAS 野生型"

セツキシマブ（2 毎週） + IRIS

がん腫	大腸癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	デキサート注射液 6. 6 m g (*テカトロン)	1 罎
	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリジ	1 筒
	ポララミン注 5 m g	1 A
	点滴（速度指定） mL/h 【216mL/h】	化療①[23:31]
2	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	アービタックス注射液 1 0 0 m g 20m L	500 mg/m ²
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【125mL/h】	化療②[23:32]
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴（全開）	化療③[23:33]
4	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	イリノテカン塩酸塩点滴静注 40mg	150 mg/m ²
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【171.66mL/h】	化療④[23:34]
5	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴（全開）	化療⑤[23:35]

Day15

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	デキサート注射液 6. 6 m g (*テカトロン)	1 罎
	ポララミン注 5 m g	1 A
	点滴（速度指定） mL/h 【212mL/h】	化療①[23:31]
2	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	アービタックス注射液 1 0 0 m g 20m L	250 mg/m ²
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【250mL/h】	化療②[23:32]
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴（全開）	化療③[23:33]

Cmab 500mg/m² (day1), CPT-11 150mg/m² (day1), S-1 80mg/m² (day1-14) / 3wセツキシマブ RAS 野生型

セツキシマブ（2週毎）+mFOLFOX6

がん腫	大腸癌
1サイクルの日数	14

Day1

1	生理食塩液P L「フソー」 50 mL	1 罎
	パロノセトロン静注 0.75mg/5mL	1 瓶
	デキサート注射液 6.6 mg (*デ'カ'ロン)	1 罎
	ポララミン注 5 mg	1 A
	点滴（速度指定） mL/h 【232mL/h】	化療①[23:31]
2	大塚生食注 250 mL	1 袋
	アービタックス注射液 100 mg 20mL	500 mg/m ²
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【125mL/h】	化療②[23:32]
3	生理食塩液P L「フソー」 50 mL	1 罎
	点滴（全開）	化療③[23:33]
4	ブドウ糖注 5% 250 mL	1 袋
	レボ'ホリ'ナート点滴静注用（25, 100）	200 mg/m ²
	化学療法 点滴の側管から点滴 mL/h 【125mL/h】	化療④[23:34]
5	ブドウ糖注 5% 250 mL	1 袋
	オキサリプラチン点滴静注液 100mg	85 mg/m ²
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【133.5mL/h】	化療④[23:34]
6	生理食塩液P L「フソー」 50 mL	1 罎
	フルオウラシル注 250mg 5mL「ト-7」(*5-FU)	400 mg/m ²
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【696mL/h】	化療⑤[23:35]
7	大塚生食注 2ポート 100 mL	1 キツ
	フルオウラシル注 250mg 5mL「ト-7」(*5-FU)	2400 mg/m ²
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h	化療⑥[23:36]

Cmab : 500mg/m²(, L-OHP : 85mg/m², LV : 200mg/m², 5-FU (iv) : 400mg/m², 5-FU(ホ'ン'ブ') : 2400mg/m²セツキシマブ RAS 野生型

セツキシマブ（2週毎）＋エンコラフェニブ

がん腫	大腸癌
1サイクルの日数	14

Day1

1	デキサート注射液 6. 6 mg (*デカドロン)	1 瓶
	ポララミン注 5 mg	1 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【212mL/h】	化療①[23:31]
2	アービタックス注射液 100 mg 20mL	500 mg/m ²
	大塚生食注 250 mL	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【125mL/h】	化療②[23:32]
3	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴（全開）	化療③[23:33]

セツキシマブ 500mg/m²(D1)/2w、、エンコラフェニブ 300mg1日1回セツキシマブ RAS 野生型 エンコラフェニブ BRAF 変異陽性

セツキシマブ (2週毎) +エンコラフェニブ+ビメニチニブ

がん腫	大腸癌
1サイクルの日数	14

Day1

1	デキサート注射液 6. 6 m g (*デ'カ'ロン)	1 罎
	ポララミン注 5 m g	1 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴 (速度指定) mL/h 【212mL/h】	化療①[23:31]
2	アービタックス注射液 1 0 0 m g 20m L	500 mg/m ²
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【125mL/h】	化療②[23:32]
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴 (全開)	化療③[23:33]

セツキシマブ 500mg/m²(D1)/2w、エンコラフェニブ 300mg1日1回、ビメニチニブ 45mg1日2回を連日セツキシマブ RAS 野生型 エンコラフェニブ、ビメニチニブ BRAF 変異陽性

ゼローダ +アバスチン

がん腫	大腸癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 100 mL	1 錠
	ベバシズマブ BS	7.5 mg/kg
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 錠
	点滴静注	

カペシタビン：2000mg/m² (day1-14)

低容量 CDGP/5-FU による放射線化学療法(食道)

がん腫	食道癌
1 サイクルの日数	28

Day1-5, 8-12, 15-19, 22-26

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	ネダプラチン (アクプラ)	10 mg
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	40 ml
	フルオロウラシル	500 mg
	点滴静注	

トラスツズマブ デルクステカン

がん腫	胃癌
1 サイクルの日数	21

Day1, 15

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	5%ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	トラスツズマブ デルクステカン (エンハーツ)	6.4 mg/kg
	5%ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	注射用水 2 0 m L	2 A
	点滴静注	
3	5%ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	

ベクティビックス単独療法

がん腫	大腸癌
1 サイクルの日数	14

Day1

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 20 mL	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	静注	
3	生理食塩液 100 mL	1 瓶
	パニツムマブ (ベクティビックス)	6 mg/kg
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

ベクティビックス+mFOLFOX 6

がん腫	大腸癌
1 サイクルの日数	14

Day1

1	生理食塩液 20 mL	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	静注	
2	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	パロノセトロン 0.75 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	生理食塩液 100 mL	1 キット
	パニツムマブ (ベクティビックス)	6 mg/kg
	点滴静注	
5	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
6	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	レボホリナート	200 mg/m ²
	点滴静注	
7	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	オキサリプラチン	85 mg/m ²
	点滴静注	
8	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	フルオロウラシル	400 mg/m ²
	点滴静注	
9	生理食塩液 100 mL	1 キット
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²
	点滴静注	

ベクティビックス+FOLFIRI

がん腫	大腸癌
1 サイクルの日数	14

Day1

1	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 20 mL	1 A
	静注	
2	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	パロノセトロン 0.75 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 100 mL	1 キット
	パニツムマブ (ベクティビックス)	6 mg/kg
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	イリノテカン	150 mg/m ²
	点滴静注	
6	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	レボホリナート	200 mg/m ²
	点滴静注	
7	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	フルオロウラシル	400 mg/m ²
	点滴静注	
8	生理食塩液 100 mL	1 キット
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²
	点滴静注	

ベバシズマブ -IRIS

がん腫	大腸癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	ベバシズマブ BS	7.5 mg/kg
	点滴静注	
3	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	イリノテカン	150 mg/m ²
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

S-1 : 80mg/m²/day 2 週間服用後 1 週間休薬

ペルツズマブ+トラスツズマブ(初回)

がん腫	大腸癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴 (全開)	
	パージェタ点滴静注 420mg/14mL	840 mg
	大塚生食注 2 5 0 m L	
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【278mL/h】	
	ハーセプチン注射用 6 0 m g	8 mg/kg
	大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L	
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【66.66mL/h】	
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴 (全開)	

"Pertuzumab: 840mg(D1), T-mab: 8mg/kg(D1)/3W

2 回目以降は両剤減量

ペルツズマブ,トラスツズマブ □ HER2 陽性"

ペルツズマブ+トラスツズマブ(2回目以降初)

がん腫	大腸癌
1サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液P L「フソー」 50 mL	1 罎
	点滴（全開）	
	パージェタ点滴静注 420mg/14mL	420 mg
	大塚生食注2 50 mL	
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【528mL/h】	
	ハーセプチン注射用 60 mg	6 mg/kg
	大塚生食注2 ポート100 mL	
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【200mL/h】	
	生理食塩液P L「フソー」 50 mL	1 罎
	点滴（全開）	

"Pertuzumab: 420mg(D1), T-mab: 6mg/kg(D1)/3W

2回目以降は両剤減量"

ミリプラ

がん腫	肝臓癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	ミリプラ (ミリプラチン)	120 mg
	ミリプラ用懸濁用液 4 m L	6 mL
	動注	

ロンサーフ+ ベバシズマブ

がん腫	大腸癌
1 サイクルの日数	28

Day1, 15

1	ベバシズマブ BS	5 mg/kg
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

ロンサーフ： 35mg/m²/回 1日2回、day1-5,8-12 内服、day6-7,13-28 休薬

