

産婦人科.....	3
3weeks TC.....	3
3weeks TC(脱感作)	4
3weeks TC+アバスタチン	6
3weeks パクリタキセル	7
Act-D 療法	8
ADM+IFM.....	9
AP	12
BEP (産婦人科)	14
CAP.....	17
CPT-11 単剤.....	19
CPT-11/CDDP	20
CPT-11+アバスタチン	23
DC.....	24
DC(脱感作).....	25
DOC/GEM.....	27
dose-denseTC	28
EMACO	29
EMA/EP 療法	32
ETOPOSIDE	35
GEM.....	36
GEM+アバスタチン.....	37
IFM	38
MTX.....	40
PEM+Bev (維持療法)	41
PEM+TC+Bev.....	42
PEM+TC	43
PEM+TP+Bev.....	44
Pembro+CCRT(Pembro+CDDP)	46
Pembro+CCRT(CDDP)	47
Pembro+CCRT (Pembro 維持 6 週毎)	48
Pembro+CCRT (Pembro 維持 3 週毎)	49
Pembro+DTX+CBDCA.....	49
Pembro+DTX+CBDCA(Pembro 維持 6 週毎).....	51
Pembro+DTX+CBDCA(Pembro 維持 3 週毎).....	52
Pembro+PTX+CBDCA.....	53
Pembro+PTX+CBDCA(Pembro 維持 6 週毎)	54
Pembro+PTX+CBDCA(Pembro 維持 3 週毎)	55
TP	56

weekly CDDP	58
WeeklyCDDP 【sh】	60
weekly PTX+CBDCA.....	61
Weekly パクリタキセル	62
Weekly パクリタキセル+アバスチン	63
アバスチン維持療法.....	64
キイトルーダ+レンビマ（3週）	65
キイトルーダ+レンビマ（6週）	66
ドキシル.....	67
ドキシル+アバスチン	68
ドキシル+カルボプラチン	69
ドキシソルピシン単剤.....	70
ドセタキセル療法	71
ノギテカン(産婦人科)	72
ノギテカン+アバスチン	73
ハラヴェン	74

産婦人科

3weeks TC

がん腫	卵巣癌、子宮体癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	3 瓶
	ファモチジン 20 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	パクリタキセル	175 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	カルボプラチン	AUC=5
	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	点滴静注	

3weeks TC(脱感作)

がん腫	卵巣癌、子宮体癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	大塚生食注 2 5 0 m L 点滴 (維持)	1 袋 化療①[23:31]
2	デキサート注射液 6. 6 m g (*デ'カ'ロン) ガスター注射液 2 0 m g ポララミン注 5 m g グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリジ 生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L 点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【120mL/h】	3 瓶 1 A 1 A 1 筒 1 瓶 化療②[23:32]
3	パクリタキセル注 3 0 m g / 5 m L 「NK」 テルモ生食 5 0 0 m L 化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【176.38mL/h】	175 mg/m ² 1 袋 化療③[23:33]
4	カルボプラチン希釈液 (減感作用) (Rp5) ブドウ糖注 5 % 2 5 0 m L 化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【250mL/h】 1 0 0 0 倍希釈	25 mL 225 mL 化療④[23:34]
5	カルボプラチン希釈液 (減感作用) (Rp6) ブドウ糖注 5 % 2 5 0 m L 化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【250mL/h】 1 0 0 倍希釈	25 mL 225 mL 化療⑤[23:35]
6	カルボプラチン希釈液 (減感作用) (Rp7) ブドウ糖注 5 % 2 5 0 m L 化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【250mL/h】 1 0 倍希釈	25 mL 225 mL 化療⑥[23:36]
7	カルボプラチン 50mg 「NK」 / 5 m L ブドウ糖注 5 % 2 5 0 m L 化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【250.5mL/h】 1 倍希釈	AUC 1 袋 化療⑦[23:37]

8	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	化療⑧[23:38]

PTX: 175mg/m²(D1), CBDCA: AUC=5 / 3w

CBDCA : 1000 倍→100 倍→10 倍→1 倍 と順に投与

3weeks TC+アバスチン

がん腫	卵巣癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	3 瓶
	ファモチジン 20 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	パクリタキセル	175 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	カルボプラチン	AUC=5
	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
6	ベバシズマブ (アバスチン)	15 mg/kg
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	

3weeks パクリタキセル

がん腫	卵巣癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	3 瓶
	ファモチジン 2 0 m g	1 A
	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
	パクリタキセル	175 mg/m ²
2	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Act-D 療法

がん腫	絨毛性疾患
1 サイクルの日数	14

Day1, 2, 3, 4, 5

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	アクチノマイシン D (コスメゲン)	0.5 mg
	注射用水 5 m L	1 A
	生理食塩液 2 0 m L	1 A
	静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

ADM+IFM

がん腫	緊急申請
1 サイクルの日数	21

Day1-2

1	ソルデム1輸液 500 mL (*ツタT1)	1 袋
	メイロン静注7% 20 mL	1 A
	点滴 (速度指定) mL/h 【173.33mL/h】	
2	生理食塩液PL「フソー」 50 mL	1 瓶
	デキサート注射液6. 6 mg (*デ'カ'ロン)	1 瓶
	デキサート注射液3. 3 mg (*デ'カ'ロン)	1 A
	グラニセトロン静注液 1 mg / 1 mLシリンジ	1 筒
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【108mL/h】	
3	ウロミテキサン注 400 mg	2 A
	点滴の側管から静注	
4	注射用イホマイド 1 g	2 g/m ²
	テルモ生食 500 mL	1 袋
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【125mL/h】	
5	ソルデム1輸液 500 mL (*ツタT1)	1 袋
	メイロン静注7% 20 mL	1 A
	点滴 (速度指定) mL/h 【173.33mL/h】	
6	ド'キルビ'シ'ン塩酸塩注射用 10mg「NK」(*アド'リア'シ'ン)	30 mg/m ²
	テルモ生食 500 mL	1 袋
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【250mL/h】	
7	ウロミテキサン注 400 mg	2 A
	点滴の側管から静注	
8	ソルデム1輸液 500 mL (*ツタT1)	1 袋
	メイロン静注7% 20 mL	1 A
	点滴 (速度指定) mL/h 【173.33mL/h】	
9	生理食塩液PL「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	

10	ウロミテキサン注400mg	2A
	点滴の側管から静注	
11	ソルデム1輸液 500mL (*ツタT1)	1袋
	メイロン静注7% 20mL	1A
	点滴(速度指定) mL/h【173.33mL/h】	
12	ソルデム1輸液 500mL (*ツタT1)	1袋
	メイロン静注7% 20mL	1A
	点滴(速度指定) mL/h【173.33mL/h】	
13	テルモ生食 500mL	1袋
	点滴(速度指定) mL/h【55.55mL/h】	

Day3-5

1	ソルデム1輸液 500mL (*ツタT1)	1袋
	メイロン静注7% 20mL	1A
	点滴(速度指定) mL/h【173.33mL/h】	
2	生理食塩液PL「フソー」 50mL	1瓶
	デキサート注射液6. 6mg (*テ'カ'ロソ)	1瓶
	デキサート注射液3. 3mg (*テ'カ'ロソ)	1A
	グラニセトロン静注液1mg/1mLシリンジ	1筒
	点滴の側管から点滴(速度指定) mL/h【108mL/h】	
3	注射用イホマイド1g	2g/m ²
	テルモ生食 500mL	1袋
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h【125mL/h】	
4	ウロミテキサン注400mg	2A
	点滴の側管から静注	
5	ソルデム1輸液 500mL (*ツタT1)	1袋
	メイロン静注7% 20mL	1A
	点滴(速度指定) mL/h【173.33mL/h】	
6	生理食塩液PL「フソー」 50mL	1瓶
	点滴の側管から点滴(速度指定) mL/h【600mL/h】	
7	ウロミテキサン注400mg	2A

	点滴の側管から静注	
8	ソルデム1輸液 500mL (*ツタT1)	1袋
	メイロン静注7% 20mL	1A
	点滴(速度指定) mL/h 【173.33mL/h】	
9	ウロミテキサン注400mg	2A
	点滴の側管から静注	
10	ソルデム1輸液 500mL (*ツタT1)	1袋
	メイロン静注7% 20mL	1A
	点滴(速度指定) mL/h 【173.33mL/h】	
11	テルモ生食 500mL	1袋
	点滴(速度指定) mL/h 【55.55mL/h】	

"IFM : 2g/m²(d1-5, 1コース 10g/m² 以下), ADM : 30mg/m²(d1,2) / 21日毎

アプレピタント、ジーラスタ併用

AP

がん腫	子宮体癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	ソルデム 3 A 輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day2

1	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	フロセミド 20 mg	1 A
	点滴静注	
3	パロノセトロン 0.75 mg	1 瓶
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	ドキシソルビシン	60 mg/m ²
	点滴静注	
5	生理食塩液 500 mL	1 袋
	シスプラチン	50 mg/m ²
	点滴静注	
6	15%マンニトール S 注射液 300 mL	1 瓶
	点滴静注	
7	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	
8	ソルデム 3 A 輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day3

1	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	

2	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
3	ラクテック輸液 500mL	1瓶
	点滴静注	
4	メトクロプラミド 10mg	1A
	デキサメタゾン 6.6mg	1瓶
	生理食塩液 50mL	1瓶
	点滴静注	
5	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
6	生理食塩液 10mL	1S
	静注	

Day4

1	メトクロプラミド 10mg	1A
	デキサメタゾン 6.6mg	1瓶
	生理食塩液 50mL	1瓶
	点滴静注	
2	ラクテック輸液 500mL	1瓶
	点滴静注	
3	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	

BEP (産婦人科)

がん腫	卵巣癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 500 mL	1 袋
	エトポシド	100 mg/m ²
	点滴静注	
4	生理食塩液 250 mL	1 袋
	シスプラチン	20 mg/m ²
	点滴静注	
5	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
6	15%マンニトールS注射液 300 mL	1 瓶
	点滴静注	
7	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day2

1	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶

	点滴静注	
4	生理食塩液 500 mL	1 袋
	エトポシド	100 mg
	点滴静注	
5	生理食塩液 250 mL	1 袋
	シスプラチン	20 mg/m ²
	点滴静注	
6	生理食塩液 100 mL	1 ｷｯ
	ブレオマイシン (ブレオ)	20 mg/m ²
	点滴静注	
7	15%マンニトールS注射液 300 mL	1 罎
	点滴静注	
8	ラクテック輸液 500 mL	1 罎
	点滴静注	
9	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day3, 4, 5

1	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	ラクテック輸液 500 mL	1 罎
	点滴静注	
3	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 罎
	生理食塩液 50 mL	1 罎
	点滴静注	
4	生理食塩液 500 mL	1 袋
	エトポシド	100 mg/m ²
	点滴静注	
5	生理食塩液 250 mL	1 袋
	シスプラチン	20 mg/m ²

	点滴静注	
6	15%マンニトールS注射液 300mL	1 瓶
	点滴静注	
7	ラクテック輸液 500mL	1 瓶
	点滴静注	
8	ソルデム3A輸液 500mL	1 袋
	点滴静注	

Day6

1	ソルデム3A輸液 500mL	1 袋
	点滴静注	
2	ラクテック輸液 500mL	1 瓶
	点滴静注	

Day9, 16

1	ソルデム3A輸液 200mL	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6mg	1 瓶
	生理食塩液 50mL	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 100mL	1 キット
	ブレオマイシン (ブレオ)	20 mg/m ²
	点滴静注	

CAP

がん腫	子宮体癌、卵巣癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	

Day2

1	ラクテック輸液 500mL	1瓶
	点滴静注	
2	ラクテック輸液 500mL	1瓶
	フロセミド 20mg	1A
	点滴静注	
3	グラニセトロン 1mg	1筒
	デキサメタゾン 6.6mg	1瓶
	生理食塩液 50mL	1瓶
	点滴静注	
4	生理食塩液 100mL	1キット
	シクロホスファミド (エンドキサン)	500mg/m ²
	点滴静注	
5	生理食塩液 100mL	1キット
	ドキソルビシン	30mg/m ²
	点滴静注	
6	生理食塩液 500mL	1袋
	シスプラチン	75mg/m ²
	点滴静注	
7	ラクテック輸液 500mL	1瓶
	点滴静注	
8	15%マンニトールS注射液 300mL	1瓶
	点滴静注	
9	ソルデム3A輸液 500mL	1袋

	点滴静注	
--	------	--

Day3

1	ラクテック輸液 500mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ソルデム3A輸液 500mL	1 袋
	点滴静注	
3	ラクテック輸液 500mL	1 瓶
	点滴静注	
4	グラニセトロン 1mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6mg	1 瓶
	生理食塩液 50mL	1 瓶
	点滴静注	
5	ソルデム3A輸液 500mL	1 袋
	点滴静注	
6	生理食塩液 10mL	1 S
	静注	

Day4

1	グラニセトロン 1mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6mg	2 瓶
	生理食塩液 50mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ラクテック輸液 500mL	1 瓶
	点滴静注	
3	ソルデム3A輸液 500mL	1 袋
	点滴静注	

CPT-11 単剤

がん腫	卵巣癌
1 サイクルの日数	28

Day1, 8, 15

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	イリノテカン	100 mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

CPT-11/CDDP

がん腫	卵巣癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	ソルデム 3 A 輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day2

1	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	フロセミド 20 mg	1 A
	点滴静注	
3	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	生理食塩液 250 mL	1 袋
	イリノテカン	60 mg/m ²
	点滴静注	
5	生理食塩液 500 mL	500 mL
	シスプラチン	60 mg/m ²
	点滴静注	
6	15%マンニトール S 注射液 300 mL	1 瓶
	点滴静注	
7	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	
8	ソルデム 3 A 輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day3

1	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	

2	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
3	ラクテック輸液 500mL	1瓶
	点滴静注	
4	グラニセトロン 1mg	1筒
	デキサメタゾン 6.6mg	1瓶
	生理食塩液 50mL	1瓶
	点滴静注	
5	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
6	生理食塩液 10mL	1S
	静注	

Day4

1	ラクテック輸液 500mL	1瓶
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1mg	1筒
	デキサメタゾン 6.6mg	1瓶
	生理食塩液 50mL	1瓶
	点滴静注	
3	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	

Day9, 15

1	デキサメタゾン 6.6mg	1瓶
	グラニセトロン 1mg	1筒
	生理食塩液 50mL	1瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 250mL	1袋
	イリノテカン	60mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 50mL	1瓶
	点滴静注	

CPT-11+アバスチン

がん腫	卵巣癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	イリノテカン	100 mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	ベバシズマブ (アバスチン)	15 mg/kg
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day8, 15

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	イリノテカン	100 mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

DC

がん腫	卵巣癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	2 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 250 mL	1 袋
	ドセタキセル	70 mg/m ²
	点滴静注	
4	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	カルボプラチン	AUC=5
	点滴静注	

DC(脱感作)

がん腫	卵巣癌、子宮体癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	点滴 (速度指定) mL/h 【250mL/h】	化療①[23:31]
2	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリジ	1 筒
	デキサート注射液 3. 3 m g (*デ'カ'ロン)	4 A
	ガスター注射液 2 0 m g	1 A
	ポララミン注 5 m g	1 A
	アロカリス点滴静注 2 3 5 m g / 1 0 m L	1 罎
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【136mL/h】	化療②[23:32]
3	ドセタキセル注 2 0 m g	70 mg/m ²
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【83.33mL/h】	化療③[23:33]
4	カルボプラチン希釈液 (減感作用) Rp5	25 ml/
	ブドウ糖注 5 % 2 5 0 m L	225 ml/
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【250mL/h】	化療④[23:34]
5	カルボプラチン希釈液 (減感作用) Rp6	25 ml/
	ブドウ糖注 5 % 2 5 0 m L	225 ml/
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【250mL/h】	化療⑤[23:35]
6	カルボプラチン希釈液 (減感作用) Rp7	25 ml/
	ブドウ糖注 5 % 2 5 0 m L	225 ml/
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【250mL/h】	化療⑥[23:36]
7	カルボプラチン 50mg 「NK」 / 5 m L	5 mg
	ブドウ糖注 5 % 2 5 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【250.5mL/h】	化療⑦[23:37]
8	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	化療⑧[23:38]

DTX: 175mg/m²(D1), CBDCA: AUC=5 / 3w

CBDCA : 1000 倍→100 倍→10 倍→1 倍 と順に投与

DOC/GEM

がん腫	子宮肉腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	ゲムシタビン	800 mg/m ²
	5%ブドウ糖液 100 mL	1 キット
	点滴静注	

Day8

1	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	2 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	ゲムシタビン	800 mg/m ²
	5%ブドウ糖液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
4	生理食塩液 250 mL	1 袋
	ドセタキセル	70 mg/m ²
	点滴静注	

dose-denseTC

がん腫	卵巣がん
1 サイクルの日数	21

Day1

1	デキサート注射液 3. 3 m g (*デ'カ'ロン)	1.5 A
	ガスター注射液 2 0 m g	1 A
	ポララミン注 5 m g	1 A
	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリジ'	1 筒
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴 (速度指定) mL/h 【111mL/h】	化療①[23:31]
2	パクリタキセル注 3 0 m g / 5 m L 「NK」	80 mg/m ²
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【263.33mL/h】	化療②[23:32]
3	カルボプラチン 50mg 「NK」 / 5 m L	6(AUC)
	ブドウ糖注 5 % 2 5 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【250.6mL/h】	化療③[23:33]
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴 (全開)	化療④[23:34]

Day8,15

1	デキサート注射液 6. 6 m g (*デ'カ'ロン)	1 罎
	ガスター注射液 2 0 m g	1 A
	ポララミン注 5 m g	1 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴 (速度指定) mL/h 【110mL/h】	化療①[23:31]
2	パクリタキセル注 3 0 m g / 5 m L 「NK」	80 mg/m ²
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【263.33mL/h】	化療②[23:32]
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴 (全開)	化療③[23:33]

"PTX: 80mg/m²(D1,8,15), CBDCA: AUC=6(D1) / 21D

Day1-3 のみ アプレピタント併用"

Cre : +0.2 補正して投与量を計算する

EMACO

がん腫	絨毛性疾患
1 サイクルの日数	14

Day1

1	生理食塩液 500 mL 点滴静注	1 袋
2	グラニセトロン 1 mg デキサメタゾン 6.6 mg デキサメタゾン 3.3 mg 生理食塩液 50 mL 点滴静注	1 筒 1 瓶 1 A 1 瓶
3	エトポシド 生理食塩液 500 mL 点滴静注	100 mg/m ² 1 袋
4	アクチノマイシン D (コスメゲン) 注射用水 5 mL 生理食塩液 20 mL 静注	0.5 mg/m ² 1 A 1 A
5	メトトレキサート (メソトレキサート) 生理食塩液 500 mL 点滴静注	300 mg/m ² 1 袋

Day2

1	グラニセトロン 1 mg デキサメタゾン 6.6 mg デキサメタゾン 3.3 mg 生理食塩液 50 mL 点滴静注	1 筒 1 瓶 1 A 1 瓶
2	エトポシド 生理食塩液 500 mL 点滴静注	100 mg/m ² 1 袋
3	アクチノマイシン D (コスメゲン) 注射用水 5 mL	0.5 mg/m ² 1 A

	生理食塩液 20 mL	1 A
	静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	ロイコポリン 3 mg	5 A
	静注	

Day3

1	ロイコポリン 3 mg	5 A
	静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	ロイコポリン 3 mg	5 A
	静注	

Day4

1	ロイコポリン 3 mg	5 A
	静注	

Day8

1	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	デキサメタゾン 3.3 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	シクロホスファミド (エンドキサン)	600 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
4	ピンクリスチン (オンコビン)	0.8 mg/m ²
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

EMA/EP 療法

がん腫	絨毛性疾患
1 サイクルの日数	14

Day1

1	生理食塩液 500 mL 点滴静注	1 袋
2	グラニセトロン 1 mg デキサメタゾン 6.6 mg 生理食塩液 50 mL 点滴静注	1 筒 1 瓶 1 瓶
3	アクチノマイシン D (コスメゲン) 注射用水 5 mL 生理食塩液 20 mL 静注	0.5 mg/m ² 1 A 1 A
4	エトキシド 生理食塩液 500 mL 点滴静注	100 mg/m ² 1 袋
5	メソトレキサート (メソトレキセート) 生理食塩液 500 mL 点滴静注	300 mg/m ² 1 袋
6	生理食塩液 50 mL 点滴静注	1 瓶

Day2

4	グラニセトロン 1 mg デキサメタゾン 6.6 mg 生理食塩液 50 mL 点滴静注	1 筒 1 瓶 1 瓶
2	ロイコボリン 3 mg 静注	5 A
3	ロイコボリン 3 mg 静注	5 A

Day3

1	ロイコボリン 3 m g	5 A
	静注	
2	ロイコボリン 3 m g	5 A
	静注	

Day8

1	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	硫酸M g 補正液 1 m E q / m L 2 0 m L	1 A
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6 . 6 m g	1 瓶
	デキサメタゾン 3 . 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	エトキシド	150 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
4	ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
5	シスプラチン	75 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
6	1 5 % マンニトール S 注射液 3 0 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
7	ラクテック輸液 5 0 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day9

1	ラクテック輸液 5 0 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

3	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
6	生理食塩液 20 mL	1 A
	静注	

Day10

4	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

ETOPOSIDE

がん腫	絨毛性疾患
1 サイクルの日数	21

Day1, 2, 3, 4, 5

1	ソルデム3A輸液 200mL	1袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1mg	1筒
	生理食塩液 100mL	1キット
	点滴静注	
3	エトポシド	100mg/m ²
	生理食塩液 250mL	1袋
	点滴静注	

GEM

がん腫	子宮肉腫、卵巣癌
1 サイクルの日数	28

Day1, 8, 15

1	生理食塩液 100 mL	1 <small>キット</small>
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 <small>瓶</small>
	点滴静注	
2	5%ブドウ糖液 100 mL	1 <small>キット</small>
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 <small>瓶</small>
	点滴静注	

GEM+アバスチン

がん腫	卵巣癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	生理食塩液 100 mL	1 <small>キット</small>
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 <small>瓶</small>
	点滴静注	
2	5%ブドウ糖液 100 mL	1 <small>キット</small>
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 100 mL	1 <small>キット</small>
	ペバシズマブ (アバスチン)	15 mg/kg
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 <small>瓶</small>
	点滴静注	

Day8, 15

1	生理食塩液 100 mL	1 <small>キット</small>
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 <small>瓶</small>
	点滴静注	
2	5%ブドウ糖液 100 mL	1 <small>キット</small>
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 <small>瓶</small>
	点滴静注	

IFM

がん腫	子宮肉腫
1 サイクルの日数	28

Day1, 2, 3, 4, 5

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ソルデム 3 A 輸液 2 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	イホスファミド (イホマイド)	1.5 g/m ²
	点滴静注	
4	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	メスナ 4 0 0 m g	300 mg
	点滴静注	
5	ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L	1 袋
	7%炭酸水素ナトリウム液 2 0 m L	1 A
	点滴静注	
6	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	メスナ 4 0 0 m g	300 mg
	点滴静注	
7	ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L	1 袋
	7%炭酸水素ナトリウム液 2 0 m L	1 A
	点滴静注	
8	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	メスナ 4 0 0 m g	300 mg
	点滴静注	
9	ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

Day6

1	ラクテック輸液 500mL	1瓶
	点滴静注	

MTX

がん腫	絨毛性疾患
1 サイクルの日数	21

Day1, 2, 3, 4, 5

1	メトトレキサート (メソトレキセート)	0.4 mg/kg
	生理食塩液 20 mL	1 A
	筋注	

PEM+Bev（維持療法）

がん腫	子宮頸癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL 点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	1 罎
2	キイトルーダ点滴静注 100 mg 4 mL 大塚生食注2 ポート 100 mL 化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【216mL/h】	200 mg/body 1 キット
3	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL 点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	1 罎
4	アバスチン点滴静注用 100mg/4mL 大塚生食注2 ポート 100 mL 化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【47.06mL/h】	15 mg/kg 70 mL
10	生食 50 mL 点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	1 袋

PEM+TP+Bev 療法後の維持療法

PEM+TC+Bev

がん腫	子宮頸癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL 点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	1 罎
2	キイトルーダ点滴静注 100 mg 4 mL 大塚生食注2 ポート 100 mL 化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【216mL/h】	200 mg 1 罎
3	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL 点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	1 罎
4	グラニセトロン静注液 1 mg / 1 mL シリンジ デキサート注射液 3. 3 mg (*デカトロン) ガスター注射液 20 mg ポララミン注 5 mg アロカリス点滴静注 235 mg / 10 mL 生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL 点滴 (速度指定) mL/h 【140mL/h】	1 筒 6 A 1 A 1 A 1 罎 1 罎
5	パクリタキセル注 30 mg / 5 mL 「NK」 テルモ生食 500 mL 化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【176.38mL/h】	175 mg/m ² 1 袋
6	カルボプラチン 50mg 「NK」 / 5 mL ブドウ糖注 5% 250 mL 化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【250.5mL/h】	AUC5 1 袋
7	アバスチン点滴静注用 100mg/4mL 大塚生食注2 ポート 100 mL 化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【47.06mL/h】	15 mg/kg 70 mL
8	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL 点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	1 罎

PEM+TC

がん腫	子宮頸癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL 点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	1 罎
2	キイトルーダ点滴静注 100 mg 4 mL 大塚生食注2 ポート 100 mL 化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【216mL/h】	200 mg 1 キット
3	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL 点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	1 罎
4	グラニセトロン静注液 1 mg / 1 mL シリンジ デキサート注射液 3. 3 mg (*デカトロン) ガスター注射液 20 mg ポララミン注 5 mg アロカリス点滴静注 235 mg / 10 mL 生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL 点滴 (速度指定) mL/h 【140mL/h】	1 筒 6 A 1 A 1 A 1 罎 1 罎
5	パクリタキセル注 30 mg / 5 mL 「NK」 テルモ生食 500 mL 化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【176.38mL/h】	175 mg/m ² 1 袋
6	カルボプラチン 50mg 「NK」 / 5 mL ブドウ糖注 5% 250 mL 化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【250.5mL/h】	AUC5 1 袋
7	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL 点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	1 罎

PEM+TP+Bev

がん腫	子宮頸癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 罎
	点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	08:55
2	キイトルーダ点滴静注 100 mg 4 mL	200 mg/body
	大塚生食注 2 ポート 100 mL	1 罎
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【216mL/h】	09:00
3	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 罎
	点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	09:29
4	パロノセトロン静注 0.75mg/5mL	1 瓶
	デキサート注射液 6. 6 mg (*デカトロン)	3 罎
	ガスター注射液 20 mg	1 A
	ポララミン注 5 mg	1 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 罎
	点滴 (速度指定) mL/h 【128mL/h】	09:30
5	パクリタキセル注 30 mg / 5 mL 「NK」	175 mg/m ²
	テルモ生食 500 mL	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【176.38mL/h】	10:00
6	KCL注 20 mEq キット (要希釈)	10 mL
	硫酸Mg 補正液 1 mEq/mL 20mL (要希釈)	8 mL
	テルモ生食 500 mL	1 袋
	点滴 (速度指定) mL/h 【518mL/h】	13:00
7	ラシックス注 20 mg	1 A
	静注	13:59
8	シスプラチン点滴静注 10 mg 20 mL	50 mg/m ²
	大塚生食注 250 mL	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【350mL/h】	14:00
9	アバスチン点滴静注用 100mg/4mL	15 mg/kg

	大塚生食注2 ポート 1 0 0 m L	70 ml/
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【47.06mL/h】	15:00
10	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	点滴 (速度指定) mL/h 【250mL/h】	16:30
11	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	点滴 (速度指定) mL/h 【250mL/h】	18:30
12	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	点滴 (速度指定) mL/h 【250mL/h】	20:30
13	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	点滴 (速度指定) mL/h 【200mL/h】	22:30

Day2

1	ラクテック注 5 0 0 m L	1 瓶
	点滴 (速度指定) mL/h 【125mL/h】	01:00
2	ソルデム3A輸液 5 0 0 m L (*ツタ T3)	1 袋
	点滴 (速度指定) mL/h 【125mL/h】	05:00
3	ラクテック注 5 0 0 m L	1 瓶
	点滴 (速度指定) mL/h 【125mL/h】	09:00
4	ソルデム3A輸液 5 0 0 m L (*ツタ T3)	1 袋
	点滴 (速度指定) mL/h 【125mL/h】	13:00

Pembro: 200mg/body(D1), PTX: 175mg/m²(D1), CDDP: 50mg/m²(D1), Bev: 15mg/kg(D1) / 21D

アプレピタント、デカドロン(8mg2x3 日分)併用

Pembro+CCRT(Pembro+CDDP)

がん腫	子宮頸癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL 点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	1 罎 化療①[23:31]
2	キイトルーダ点滴静注 100 mg 4 mL 大塚生食注2ポート 100 mL 化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【216mL/h】	200 mg/body 1 キット 化療②[23:32]
3	K C L 注 20 m E q キット (要希釈) 硫酸 M g 補正液 1 mEq/mL 20mL (要希釈) テルモ生食 500 mL 点滴 (速度指定) mL/h 【518mL/h】	10 mL/ 8 mL/ 1 袋 化療③[23:33]
4	パロノセトロン静注 0.75mg/5mL アロカリス点滴静注 235 mg / 10 mL デキサート注射液 6. 6 mg (*デカドロン) 生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL 点滴 (速度指定) mL/h 【136mL/h】	1 瓶 1 罎 9.9 mg 1 罎 化療④[23:34]
5	ラシックス注 20 mg 静注	1 A 化療⑤[23:35]
6	シスプラチン点滴静注 10 mg 20 mL テルモ生食 500 mL 化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【380mL/h】	40 mg/m ² 300 mL/ 化療⑥[23:36]
7	テルモ生食 500 mL 点滴 (速度指定) mL/h 【500mL/h】	1 袋 化療⑦[23:37]
8	テルモ生食 500 mL 点滴 (速度指定) mL/h 【500mL/h】	1 袋 化療⑧[23:38]

Pembro: 200mg/body(d1), CDDP: 40mg/m²(d1) /7d

内服：デカドロン(0.5) 16T2X 朝夕食後 3日分、オランザピン(5) 1T1X 夕食後 4日分

Pembro+CCRT(Pembro+CDDP)→Pembro+CCRT(CDDP)×2→Pembro+CCRT(Pembro+CDDP)→Pembro+CCRT(CDDP)×2→Pembro+CCRT(Pembro 維持 3週毎) or Pembro+CCRT(Pembro 維持 6週毎)

Pembro+CCRT(CDDP)

がん腫	子宮頸癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	KCL注20mEqキット (要希釈)	10 mL
	硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL (要希釈)	8 mL
	テルモ生食 500mL	1 袋
	点滴 (速度指定) mL/h 【518mL/h】	化療③[23:33]
2	パロノセトロン静注 0.75mg/5mL	1 瓶
	アロカリス点滴静注 235mg/10mL	1 瓶
	デキサート注射液 6.6mg (*デカロン)	9.9 mg
	生理食塩液PL「フソー」 50mL	1 瓶
	点滴 (速度指定) mL/h 【136mL/h】	化療④[23:34]
3	ラシックス注20mg	1 A
	静注	化療⑤[23:35]
4	シスプラチン点滴静注 10mg 20mL	40 mg/m ²
	テルモ生食 500mL	300 mL
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【380mL/h】	化療⑥[23:36]
5	テルモ生食 500mL	1 袋
	点滴 (速度指定) mL/h 【500mL/h】	化療⑦[23:37]
6	テルモ生食 500mL	1 袋
	点滴 (速度指定) mL/h 【500mL/h】	化療⑧[23:38]

CDDP: 40mg/m²(d1) /7d

内服：デカロン(0.5) 16T2X 朝夕食後 3日分、オランザピン(5) 1T1X 夕食後 4日分

Pembro+CCRT(Pembro+CDDP)→Pembro+CCRT(CDDP)×2→Pembro+CCRT(Pembro+CDDP)→Pembro+CCRT(CDDP)×2→Pembro+CCRT(Pembro 維持3週毎) or Pembro+CCRT(Pembro 維持6週毎)

Pembro+CCRT (Pembro 維持 6 週毎)

がん腫	子宮頸癌
1 サイクルの日数	42

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L 点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	1 罎 化療①[23:31]
2	キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g 4 m L 大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L 化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【232mL/h】	400 mg/body 1 キット 化療②[23:32]
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L 点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	1 罎 化療③[23:33]

Pembro:400mg/6w

Pembro+CCRT(Pembro+CDDP)→Pembro+CCRT(CDDP)*2→Pembro+CCRT(Pembro+CDDP)→Pembro+CCRT(CDDP)*2→Pembro+CCRT(Pembro 維持 3 週毎) or Pembro+CCRT(Pembro 維持 6 週毎)

Pembro 6 週毎で 15 サイクル 3 週毎で 30 サイクル

Pembro+CCRT (Pembro 維持 3 週毎)

がん腫	子宮頸癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L 点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	1 罎 化療①[23:31]
2	キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g 4 m L 大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L 化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【232mL/h】	200 mg/body 1 キット 化療②[23:32]
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L 点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	1 罎 化療③[23:33]

Pembro:200mg/3w

Pembro+CCRT(Pembro+CDDP)→Pembro+CCRT(CDDP)*2→Pembro+CCRT(Pembro+CDDP)→Pembro+CCRT(CDDP)*2→Pembro+CCRT(Pembro 維持 3 週毎) or Pembro+CCRT(Pembro 維持 6 週毎)

Pembro 6 週毎で 15 サイクル 3 週毎で 30 サイクル

Pembro+DTX+CBDCA

がん腫	子宮体癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L 点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	1 罎 化療①[23:31]
2	キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g 4 m L 大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L 化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【216mL/h】	200 mg 1 キット 化療②[23:32]
3	パロノセトロン静注 0.75mg/5mL アロカリス点滴静注 2 3 5 m g / 1 0 m L デキサート注射液 6. 6 m g (*デカトロン) 生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L 点滴 (速度指定) mL/h 【136mL/h】	1 瓶 1 罎 9.9 mg 1 罎 化療③[23:33]
4	ドセタキセル注 2 0 m g 大塚生食注 2 5 0 m L	75 mg 1 袋

	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【250mL/h】	化療④[23:34]
5	カルボプラチン 50mg 「NK」 / 5 mL	5 mg
	ブドウ糖注 5% 250 mL	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【250.5mL/h】	化療⑤[23:35]
6	生理食塩液 PL 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	化療⑥[23:36]

"Pembro:200mg/body(d1), DTX:75mg/m²(d1), CBDCA:AUC=5(d1) / 21d

Pembro+DTX+CBDCA×最大 6→Pembro+DTX+CBDCA(Pembro 維持 6 週毎) or

Pembro+DTX+CBDCA(Pembro 維持 3 週毎)"

Pembro+DTX+CBDCA(Pembro 維持 6 週毎)

がん腫	子宮体癌
1 サイクルの日数	42

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	化療①[23:31]
2	キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g 4 m L	400 mg/body
	大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L	1 キット
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【232mL/h】	化療②[23:32]
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	化療③[23:33]

Pembro:400mg/6w

Pembro+DTX+CBDCA×最大 6→Pembro+DTX+CBDCA(Pembro 維持 6 週毎) or

Pembro+DTX+CBDCA(Pembro 維持 3 週毎)

Pembro+DTX+CBDCA(Pembro 維持 3 週毎)

がん腫	子宮体癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	化療①[23:31]
2	キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g 4 m L	200 mg/body
	大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L	1 キット
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【232mL/h】	化療②[23:32]
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	化療③[23:33]

Pembro:200mg/3w

Pembro+DTX+CBDCA×最大 6→Pembro+DTX+CBDCA(Pembro 維持 6 週毎) or

Pembro+DTX+CBDCA(Pembro 維持 3 週毎)

Pembro+PTX+CBDCA

がん腫	子宮体癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	化療①[23:31]
	キイトルーダ点滴静注 100 mg 4 mL	200 mg/body
2	大塚生食注 2 ポート 100 mL	1 瓶
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【216mL/h】	化療②[23:32]
	パロノセトロン静注 0.75mg/5mL	1 瓶
3	アロカリス点滴静注 235 mg / 10 mL	1 瓶
	デキサート注射液 6. 6 mg (*デカトロン)	19.8 mg
	ガスター注射液 20 mg / 2 mL	1 A
	ポララミン注 5 mg	1 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴 (速度指定) mL/h 【148mL/h】	化療③[23:33]
	パクリタキセル注 30 mg / 5 mL「NK」	175 mg/m ²
	テルモ生食 500 mL	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【176.38mL/h】	化療④[23:34]
	カルボプラチン 50mg「NK」 / 5 mL	AUC=5
	ブドウ糖注 5% 250 mL	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【250.5mL/h】	化療⑤[23:35]
	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	化療⑥[23:36]

"Pembro:200mg/body(d1), PTX:175mg/m²(d1), CBDCA:AUC=5(d1) / 21d

Pembro+PTX+CBDCA×最大 6→Pembro+PTX+CBDCA(Pembro 維持 6 週毎) or Pembro+PTX+CBDCA(Pembro 維持 3 週毎)"

Pembro+PTX+CBDCA(Pembro 維持 6 週毎)

がん腫	子宮体癌
1 サイクルの日数	42

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	化療①[23:31]
2	キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g 4 m L	400 mg/body
	大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L	1 キット
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【232mL/h】	化療②[23:32]
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	化療③[23:33]

Pembro:400mg/6w

Pembro+PTX+CBDCA×最大 6→Pembro+PTX+CBDCA(Pembro 維持 6 週毎) or

Pembro+PTX+CBDCA(Pembro 維持 3 週毎)

Pembro+PTX+CBDCA(Pembro 維持 3 週毎)

がん腫	子宮体癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	化療①[23:31]
2	キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g 4 m L	200 mg/body
	大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L	1 キット
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【232mL/h】	化療②[23:32]
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	化療③[23:33]

Pembro:200mg/3w

Pembro+PTX+CBDCA×最大 6→Pembro+PTX+CBDCA(Pembro 維持 6 週毎) or

Pembro+PTX+CBDCA(Pembro 維持 3 週毎)

TP

がん腫	子宮体癌、卵巣癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	ソルデム 3 A 輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day2

1	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	フロセミド 20 mg	1 A
	点滴静注	
3	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	生理食塩液 500 mL	1 袋
	パクリタキセル	135 mg/m ²
	点滴静注	
5	生理食塩液 500 mL	1 袋
	シスプラチン	75 mg/m ²
	点滴静注	
6	15%マンニトールS注射液 300 mL	1 瓶
	点滴静注	
7	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	
8	ソルデム 3 A 輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day3

1	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
---	----------------	-----

	点滴静注	
2	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
3	ラクテック輸液 500mL	1瓶
	点滴静注	
4	グラニセトロン 1mg	1筒
	デキサメタゾン 6.6mg	1瓶
	生理食塩液 50mL	1瓶
	点滴静注	
5	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
6	生理食塩液 10mL	1S
	静注	

Day4

1	グラニセトロン 1mg	1筒
	デキサメタゾン 6.6mg	1瓶
	生理食塩液 50mL	1瓶
	点滴静注	
2	ラクテック輸液 500mL	1瓶
	点滴静注	
3	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	

weekly CDDP

がん腫	子宮頸癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
2	ラクテック輸液 500mL	1瓶
	フロセミド 20mg	1A
	点滴静注	
3	グラニセトロン 1mg	1筒
	デキサメタゾン 6.6mg	1瓶
	生理食塩液 50mL	1瓶
	点滴静注	
4	生理食塩液 500mL	1袋
	シスプラチン	40mg/m ²
	点滴静注	
5	ラクテック輸液 500mL	1瓶
	点滴静注	
	15%マンニトールS注射液 300mL	1瓶
	点滴静注	
6	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	

Day2

1	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
2	ラクテック輸液 500mL	1瓶
	点滴静注	
3	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	

4	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
5	ラクテック輸液 5 0 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
6	生理食塩液 1 0 m L	1 S
	静注	

Day3

1	ラクテック輸液 5 0 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

WeeklyCDDP 【sh】

がん腫	子宮頸癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	テルモ生食 500 mL	1 袋
	KCL注20mEqキット (要希釈)	10 mL
	硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL (要希釈)	8 mL
	点滴 (速度指定) mL/h 【518mL/h】	化療①[23:31]
2	グラニセトロン静注液1mg/1mLシリンジ	1 筒
	デキサート注射液6.6mg (*デカドロン)	1 瓶
	デキサート注射液3.3mg (*デカドロン)	1 A
	アロカリス点滴静注 235mg/10mL	1 瓶
	生理食塩液PL「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴 (速度指定) mL/h 【128mL/h】	化療②[23:32]
3	ラシックス注20mg	1 A
	静注	化療③[23:33]
4	シスプラチン点滴静注10mg 20mL	40 mg/m ²
	テルモ生食 500 mL	300 mL
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【380mL/h】	化療④[23:34]
5	テルモ生食 500 mL	1 袋
	点滴 (速度指定) mL/h 【500mL/h】	化療⑤[23:35]
6	テルモ生食 500 mL	1 袋
	点滴 (速度指定) mL/h 【500mL/h】	化療⑥[23:36]

CDDP: 40mg/m² / 7D (放射線併用はCDDP5回投与)

weekly PTX+CBDCA

がん腫	卵巣がん、緊急申請（腔癌）
1 サイクルの日数	28

Day1, 8

1	デキサート注射液 6. 6 m g (*デ'カ'ロン)	1 瓶
	ガスター注射液 2 0 m g	1 A
	ポララミン注 5 m g	1 A
	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリジ	1 筒
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【112mL/h】	
2	パクリタキセル注 3 0 m g / 5 m L 「NK」	60 mg/m ²
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【260mL/h】	
3	カルボプラチン 50mg 「NK」 / 5 m L	AUC 2
	ブドウ糖注 5 % 2 5 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【250.2mL/h】	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	

PTX: 60mg/m²(D1,8,15) , CBDCA AUC=2(D1,8,15) / 4W 6 コース

Weekly パクリタキセル

がん腫	卵巣癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	生理食塩液 100 mL	1 ｷｯ
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 ｼﾞ
	ファモチジン 20 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	点滴静注	
2	パクリタキセル	80 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 ｼﾞ
	点滴静注	

Weekly パクリタキセル+アバスチン

がん腫	卵巣癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	ファモチジン 20 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	パクリタキセル	80 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
3	ベバシズマブ (アバスチン)	15 mg/kg
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day8, 15

1	生理食塩液 100 mL	1 キット
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	ファモチジン 20 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	点滴静注	
2	パクリタキセル	80 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

アバスチン維持療法

がん腫	卵巣癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	ベバシズマブ (アバスチン)	15 mg/kg
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

キイトルーダ+レンビマ (3週)

がん種	子宮体癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 100 mL	1 キット
	ペムブロリズマブ (キイトルーダ)	200 mg/body
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

レンビマ 20mg/日連日

キイトルーダ+レンビマ（6週）

がん種	子宮体癌
1 サイクルの日数	42

Day1

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 100 mL	1 キット
	ペムブロリズマブ（キイトルーダ）	400 mg/body
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

レンビマ 20mg/日連日

ドキシル

がん腫	卵巣癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	生理食塩液 250 mL 点滴静注	1 袋
2	グラニセトロン 1 mg デキサメタゾン 6.6 mg ファモチジン 20 mg 生理食塩液 50 mL 点滴静注	1 筒 3 瓶 1 A 1 瓶
3	ドキシルピシン塩酸塩 リポソーム注射剤 (ドキシル) 5%ブドウ糖液 250 mL 点滴静注	50 mg/m ² 1 瓶
4	ラクテック輸液 500 mL 点滴静注	1 瓶

ドキシル+アバスチン

がん腫	卵巣癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	3 瓶
	ファモチジン 2 0 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ドキシソルビシン塩酸塩 リポソーム注射剤 (ドキシル)	50 mg/m ²
	5 %ブドウ糖液 2 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	ベバシズマブ (アバスチン)	15 mg/kg
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

ドキシル+カルボプラチン

がん腫	卵巣癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3.3m g	3 A
	ファモチジン 2 0 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ドキシソルビシン塩酸塩 リポソーム注射剤 (ドキシル)	30 mg/m ²
	5 %ブドウ糖液 2 5 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	カルボプラチン 50mg 「NK」 / 5 m L	AUC=5
	ブドウ糖注 5 % 2 5 0 m L	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

アプレピタント併用

ドキシソルピシン単剤

がん腫	子宮体癌、子宮肉腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	グラニセトロン静注液 1 mg / 1 mL シリンジ	1 筒
	デキサート注射液 6. 6 mg (*デカドロン)	1 瓶
	デキサート注射液 3. 3 mg (*デカドロン)	1 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴 (速度指定) mL/h 【216mL/h】	
2	ドキシソルピシン塩酸塩注射用 10mg「NK」(*アドリアシン)	60 mg/m ²
	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【600mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	

ADR: 60mg/m² / 21D

ドセタキセル療法

がん腫	子宮体癌、卵巣癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ドセタキセル	70 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

2024/9/20 医師に確認して、4W→3W に変更

ノギテカン(産婦人科)

がん腫	卵巣癌
1 サイクルの日数	21

Day1, 2, 3, 4, 5

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 100 mL	1 キット
	ノギテカン (ハイカムチン)	1.5 mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

ノギテカン+アバスチン

がん腫	卵巣癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 100 mL	1 キット
	ノギテカン (ハイカムチン)	1.5 mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 100 mL	1 キット
	ベバシズマブ (アバスチン)	15 mg/kg
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day2, 3, 4, 5

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 100 mL	1 キット
	ノギテカン (ハイカムチン)	1.5 mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

ハラヴェン

がん腫	子宮肉腫
1 サイクルの日数	21

Day1, 8

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	エリブリン (ハラヴェン)	1.4 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

