

産婦人科.....	2
3weeks TC.....	2
3weeks TC(脱感作)	3
3weeks TC+アバスタチン	5
3weeks パクリタキセル	6
Act-D 療法	7
ADM+IFM.....	8
AP	11
BEP (産婦人科)	13
CAP.....	16
CPT-11 単剤.....	18
CPT-11/CDDP	19
CPT-11+アバスタチン	22
DC.....	23
DOC/GEM.....	24
dose-denseTC	25
EMACO	26
EMA/EP 療法	29
ETOPOSIDE.....	32
GEM.....	33
GEM+アバスタチン	34
IFM	35
MTX.....	37
TP	38
weekly CDDP	40
weekly PTX+CBDCA	42
Weekly パクリタキセル	43
Weekly パクリタキセル+アバスタチン	44
アバスタチン維持療法.....	45
キイトルーダ+レンビマ (3週)	46
キイトルーダ+レンビマ (6週)	47
ドキシル.....	48
ドキシル+アバスタチン	49
ドセタキセル療法	50
ノギテカン(産婦人科)	51
ノギテカン+アバスタチン	52
ハラヴェン	53

産婦人科

3weeks TC

がん腫	卵巣癌、子宮体癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	3 瓶
	ファモチジン 20 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	パクリタキセル	175 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	カルボプラチン	AUC=5
	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	点滴静注	

3weeks TC(脱感作)

がん腫	卵巣癌、子宮体癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	大塚生食注 2 5 0 m L 点滴 (維持)	1 袋 化療①[23:31]
2	デキサート注射液 6. 6 m g (*デ'カ'ロン) ガスター注射液 2 0 m g ポララミン注 5 m g グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリジ 生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L 点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【120mL/h】	3 瓶 1 A 1 A 1 筒 1 瓶 化療②[23:32]
3	パクリタキセル注 3 0 m g / 5 m L 「NK」 テルモ生食 5 0 0 m L 化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【176.38mL/h】	175 mg/m ² 1 袋 化療③[23:33]
4	カルボプラチン希釈液 (減感作用) (Rp5) ブドウ糖注 5 % 2 5 0 m L 化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【250mL/h】 1 0 0 0 倍希釈	25 mL 225 mL 化療④[23:34]
5	カルボプラチン希釈液 (減感作用) (Rp6) ブドウ糖注 5 % 2 5 0 m L 化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【250mL/h】 1 0 0 倍希釈	25 mL 225 mL 化療⑤[23:35]
6	カルボプラチン希釈液 (減感作用) (Rp7) ブドウ糖注 5 % 2 5 0 m L 化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【250mL/h】 1 0 倍希釈	25 mL 225 mL 化療⑥[23:36]
7	カルボプラチン 50mg 「NK」 / 5 m L ブドウ糖注 5 % 2 5 0 m L 化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【250.5mL/h】 1 倍希釈	AUC 1 袋 化療⑦[23:37]

8	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	化療⑧[23:38]

PTX: 175mg/m²(D1), CBDCA: AUC=5 / 3w

CBDCA : 1000 倍→100 倍→10 倍→1 倍 と順に投与

3weeks TC+アバスチン

がん腫	卵巣癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 250 mL 点滴静注	1 袋
2	グラニセトロン 1 mg デキサメタゾン 6.6 mg ファモチジン 20 mg クロルフェニラミン 5 mg 生理食塩液 50 mL 点滴静注	1 筒 3 瓶 1 A 1 A 1 瓶
3	パクリタキセル 生理食塩液 500 mL 点滴静注	175 mg/m ² 1 袋
4	カルボプラチン 5%ブドウ糖液 250 mL 点滴静注	AUC=5 1 瓶
5	生理食塩液 50 mL 点滴静注	1 瓶
6	ベバシズマブ (アバスチン) 生理食塩液 100 mL 点滴静注	15 mg/kg 1 キット

3weeks パクリタキセル

がん腫	卵巣癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	3 瓶
	ファモチジン 2 0 m g	1 A
	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
	パクリタキセル	175 mg/m ²
2	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Act-D 療法

がん腫	絨毛性疾患
1 サイクルの日数	14

Day1, 2, 3, 4, 5

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	アクチノマイシン D (コスメゲン)	0.5 mg
	注射用水 5 mL	1 A
	生理食塩液 20 mL	1 A
	静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

ADM+IFM

がん腫	緊急申請
1 サイクルの日数	21

Day1-2

1	ソルデム1輸液 500 mL (*ツタT1)	1 袋
	メイロン静注7% 20 mL	1 A
	点滴 (速度指定) mL/h 【173.33mL/h】	
2	生理食塩液PL「フソー」 50 mL	1 瓶
	デキサート注射液6. 6 mg (*デ'カ'ロン)	1 瓶
	デキサート注射液3. 3 mg (*デ'カ'ロン)	1 A
	グラニセトロン静注液1 mg / 1 mLシリンジ	1 筒
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【108mL/h】	
3	ウロミテキサン注400 mg	2 A
	点滴の側管から静注	
4	注射用イホマイド1 g	2 g/m ²
	テルモ生食 500 mL	1 袋
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【125mL/h】	
5	ソルデム1輸液 500 mL (*ツタT1)	1 袋
	メイロン静注7% 20 mL	1 A
	点滴 (速度指定) mL/h 【173.33mL/h】	
6	ド'キルビ'シ'ン塩酸塩注射用10mg「NK」(*アド'リア'シ'ン)	30 mg/m ²
	テルモ生食 500 mL	1 袋
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【250mL/h】	
7	ウロミテキサン注400 mg	2 A
	点滴の側管から静注	
8	ソルデム1輸液 500 mL (*ツタT1)	1 袋
	メイロン静注7% 20 mL	1 A
	点滴 (速度指定) mL/h 【173.33mL/h】	
9	生理食塩液PL「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	

10	ウロミテキサン注400mg	2A
	点滴の側管から静注	
11	ソルデム1輸液 500mL (*ツタT1)	1袋
	メイロン静注7% 20mL	1A
	点滴(速度指定) mL/h【173.33mL/h】	
12	ソルデム1輸液 500mL (*ツタT1)	1袋
	メイロン静注7% 20mL	1A
	点滴(速度指定) mL/h【173.33mL/h】	
13	テルモ生食 500mL	1袋
	点滴(速度指定) mL/h【55.55mL/h】	

Day3-5

1	ソルデム1輸液 500mL (*ツタT1)	1袋
	メイロン静注7% 20mL	1A
	点滴(速度指定) mL/h【173.33mL/h】	
2	生理食塩液PL「フソー」 50mL	1瓶
	デキサート注射液6. 6mg (*デ'カ'ロン)	1瓶
	デキサート注射液3. 3mg (*デ'カ'ロン)	1A
	グラニセトロン静注液1mg/1mLシリンジ	1筒
	点滴の側管から点滴(速度指定) mL/h【108mL/h】	
3	注射用イホマイド1g	2g/m ²
	テルモ生食 500mL	1袋
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h【125mL/h】	
4	ウロミテキサン注400mg	2A
	点滴の側管から静注	
5	ソルデム1輸液 500mL (*ツタT1)	1袋
	メイロン静注7% 20mL	1A
	点滴(速度指定) mL/h【173.33mL/h】	
6	生理食塩液PL「フソー」 50mL	1瓶
	点滴の側管から点滴(速度指定) mL/h【600mL/h】	
7	ウロミテキサン注400mg	2A

	点滴の側管から静注	
8	ソルデム1輸液 500mL (*ツタT1)	1袋
	メイロン静注7% 20mL	1A
	点滴(速度指定) mL/h 【173.33mL/h】	
9	ウロミテキサン注400mg	2A
	点滴の側管から静注	
10	ソルデム1輸液 500mL (*ツタT1)	1袋
	メイロン静注7% 20mL	1A
	点滴(速度指定) mL/h 【173.33mL/h】	
11	テルモ生食 500mL	1袋
	点滴(速度指定) mL/h 【55.55mL/h】	

"IFM : 2g/m²(d1-5, 1コース10g/m²以下), ADM : 30mg/m²(d1,2) / 21日毎

アプレピタント、ジーラスタ併用

AP

がん腫	子宮体癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	ソルデム 3 A 輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day2

1	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	フロセミド 20 mg	1 A
	点滴静注	
3	パロノセトロン 0.75 mg	1 瓶
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	ドキシソルビシン	60 mg/m ²
	点滴静注	
5	生理食塩液 500 mL	1 袋
	シスプラチン	50 mg/m ²
	点滴静注	
6	15%マンニトール S 注射液 300 mL	1 瓶
	点滴静注	
7	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	
8	ソルデム 3 A 輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day3

1	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	

2	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
3	ラクテック輸液 500mL	1瓶
	点滴静注	
4	メトクロプラミド 10mg	1A
	デキサメタゾン 6.6mg	1瓶
	生理食塩液 50mL	1瓶
	点滴静注	
5	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
6	生理食塩液 10mL	1S
	静注	

Day4

1	メトクロプラミド 10mg	1A
	デキサメタゾン 6.6mg	1瓶
	生理食塩液 50mL	1瓶
	点滴静注	
2	ラクテック輸液 500mL	1瓶
	点滴静注	
3	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	

BEP (産婦人科)

がん腫	卵巣癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 500 mL	1 袋
	エトポシド	100 mg/m ²
	点滴静注	
4	生理食塩液 250 mL	1 袋
	シスプラチン	20 mg/m ²
	点滴静注	
5	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
6	15%マンニトールS注射液 300 mL	1 瓶
	点滴静注	
7	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day2

1	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶

	点滴静注	
4	生理食塩液 500 mL	1 袋
	エトポシド	100 mg
	点滴静注	
5	生理食塩液 250 mL	1 袋
	シスプラチン	20 mg/m ²
	点滴静注	
6	生理食塩液 100 mL	1 瓶
	ブレオマイシン (ブレオ)	20 mg/m ²
	点滴静注	
7	15%マンニトールS注射液 300 mL	1 瓶
	点滴静注	
8	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	
9	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day3, 4, 5

1	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	生理食塩液 500 mL	1 袋
	エトポシド	100 mg/m ²
	点滴静注	
5	生理食塩液 250 mL	1 袋
	シスプラチン	20 mg/m ²

	点滴静注	
6	15%マンニトールS注射液 300mL	1 瓶
	点滴静注	
7	ラクテック輸液 500mL	1 瓶
	点滴静注	
8	ソルデム3A輸液 500mL	1 袋
	点滴静注	

Day6

1	ソルデム3A輸液 500mL	1 袋
	点滴静注	
2	ラクテック輸液 500mL	1 瓶
	点滴静注	

Day9, 16

1	ソルデム3A輸液 200mL	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6mg	1 瓶
	生理食塩液 50mL	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 100mL	1 キット
	ブレオマイシン (ブレオ)	20 mg/m ²
	点滴静注	

CAP

がん腫	子宮体癌、卵巣癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	

Day2

1	ラクテック輸液 500mL	1瓶
	点滴静注	
2	ラクテック輸液 500mL	1瓶
	フロセミド 20mg	1A
	点滴静注	
3	グラニセトロン 1mg	1筒
	デキサメタゾン 6.6mg	1瓶
	生理食塩液 50mL	1瓶
	点滴静注	
4	生理食塩液 100mL	1キット
	シクロホスファミド (エンドキサン)	500mg/m ²
	点滴静注	
5	生理食塩液 100mL	1キット
	ドキソルビシン	30mg/m ²
	点滴静注	
6	生理食塩液 500mL	1袋
	シスプラチン	75mg/m ²
	点滴静注	
7	ラクテック輸液 500mL	1瓶
	点滴静注	
8	15%マンニトールS注射液 300mL	1瓶
	点滴静注	
9	ソルデム3A輸液 500mL	1袋

	点滴静注	
--	------	--

Day3

1	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
3	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
6	生理食塩液 10 mL	1 S
	静注	

Day4

1	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	2 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

CPT-11 単剤

がん腫	卵巣癌
1 サイクルの日数	28

Day1, 8, 15

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	イリノテカン	100 mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

CPT-11/CDDP

がん腫	卵巣癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	ソルデム 3 A 輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day2

1	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	フロセミド 20 mg	1 A
	点滴静注	
3	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	生理食塩液 250 mL	1 袋
	イリノテカン	60 mg/m ²
	点滴静注	
5	生理食塩液 500 mL	500 mL
	シスプラチン	60 mg/m ²
	点滴静注	
6	15%マンニトール S 注射液 300 mL	1 瓶
	点滴静注	
7	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	
8	ソルデム 3 A 輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day3

1	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	

2	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
3	ラクテック輸液 500mL	1瓶
	点滴静注	
4	グラニセトロン 1mg	1筒
	デキサメタゾン 6.6mg	1瓶
	生理食塩液 50mL	1瓶
	点滴静注	
5	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
6	生理食塩液 10mL	1S
	静注	

Day4

1	ラクテック輸液 500mL	1瓶
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1mg	1筒
	デキサメタゾン 6.6mg	1瓶
	生理食塩液 50mL	1瓶
	点滴静注	
3	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	

Day9, 15

1	デキサメタゾン 6.6mg	1瓶
	グラニセトロン 1mg	1筒
	生理食塩液 50mL	1瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 250mL	1袋
	イリノテカン	60mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 50mL	1瓶
	点滴静注	

CPT-11+アバスチン

がん腫	卵巣癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	イリノテカン	100 mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	ベバシズマブ (アバスチン)	15 mg/kg
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day8, 15

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	イリノテカン	100 mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

DC

がん腫	卵巣癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	2 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 250 mL	1 袋
	ドセタキセル	70 mg/m ²
	点滴静注	
4	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	カルボプラチン	AUC=5
	点滴静注	

DOC/GEM

がん腫	子宮肉腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	ゲムシタビン	800 mg/m ²
	5%ブドウ糖液 100 mL	1 キット
	点滴静注	

Day8

1	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	2 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	ゲムシタビン	800 mg/m ²
	5%ブドウ糖液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
4	生理食塩液 250 mL	1 袋
	ドセタキセル	70 mg/m ²
	点滴静注	

dose-denseTC

がん腫	卵巣がん
1 サイクルの日数	21

Day1

1	デキサート注射液 3. 3 m g (*デ'カ'ロン)	1.5 A
	ガスター注射液 2 0 m g	1 A
	ポララミン注 5 m g	1 A
	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリジ'	1 筒
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴 (速度指定) mL/h 【111mL/h】	化療①[23:31]
2	パクリタキセル注 3 0 m g / 5 m L 「NK」	80 mg/m ²
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【263.33mL/h】	化療②[23:32]
3	カルボプラチン 50mg 「NK」 / 5 m L	6(AUC)
	ブドウ糖注 5 % 2 5 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【250.6mL/h】	化療③[23:33]
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴 (全開)	化療④[23:34]

Day8,15

1	デキサート注射液 6. 6 m g (*デ'カ'ロン)	1 罎
	ガスター注射液 2 0 m g	1 A
	ポララミン注 5 m g	1 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴 (速度指定) mL/h 【110mL/h】	化療①[23:31]
2	パクリタキセル注 3 0 m g / 5 m L 「NK」	80 mg/m ²
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【263.33mL/h】	化療②[23:32]
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴 (全開)	化療③[23:33]

"PTX: 80mg/m²(D1,8,15), CBDCA: AUC=6(D1) / 21D

Day1-3 のみ アプレピタント併用"

Cre : +0.2 補正して投与量を計算する

EMACO

がん腫	絨毛性疾患
1 サイクルの日数	14

Day1

1	生理食塩液 500 mL 点滴静注	1 袋
2	グラニセトロン 1 mg デキサメタゾン 6.6 mg デキサメタゾン 3.3 mg 生理食塩液 50 mL 点滴静注	1 筒 1 瓶 1 A 1 瓶
3	エトポシド 生理食塩液 500 mL 点滴静注	100 mg/m ² 1 袋
4	アクチノマイシン D (コスメゲン) 注射用水 5 mL 生理食塩液 20 mL 静注	0.5 mg/m ² 1 A 1 A
5	メトトレキサート (メソトレキサート) 生理食塩液 500 mL 点滴静注	300 mg/m ² 1 袋

Day2

1	グラニセトロン 1 mg デキサメタゾン 6.6 mg デキサメタゾン 3.3 mg 生理食塩液 50 mL 点滴静注	1 筒 1 瓶 1 A 1 瓶
2	エトポシド 生理食塩液 500 mL 点滴静注	100 mg/m ² 1 袋
3	アクチノマイシン D (コスメゲン) 注射用水 5 mL	0.5 mg/m ² 1 A

	生理食塩液 20 mL	1 A
	静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	ロイコポリン 3 mg	5 A
	静注	

Day3

1	ロイコポリン 3 mg	5 A
	静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	ロイコポリン 3 mg	5 A
	静注	

Day4

1	ロイコポリン 3 mg	5 A
	静注	

Day8

1	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	デキサメタゾン 3.3 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	シクロホスファミド (エンドキサン)	600 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
4	ピンクリスチン (オンコビン)	0.8 mg/m ²
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

EMA/EP 療法

がん腫	絨毛性疾患
1 サイクルの日数	14

Day1

1	生理食塩液 500 mL 点滴静注	1 袋
2	グラニセトロン 1 mg デキサメタゾン 6.6 mg 生理食塩液 50 mL 点滴静注	1 筒 1 瓶 1 瓶
3	アクチノマイシン D (コスメゲン) 注射用水 5 mL 生理食塩液 20 mL 静注	0.5 mg/m ² 1 A 1 A
4	エトキシド 生理食塩液 500 mL 点滴静注	100 mg/m ² 1 袋
5	メトトレキサート (メソトレキセート) 生理食塩液 500 mL 点滴静注	300 mg/m ² 1 袋
6	生理食塩液 50 mL 点滴静注	1 瓶

Day2

4	グラニセトロン 1 mg デキサメタゾン 6.6 mg 生理食塩液 50 mL 点滴静注	1 筒 1 瓶 1 瓶
2	ロイコボリン 3 mg 静注	5 A
3	ロイコボリン 3 mg 静注	5 A

Day3

1	ロイコボリン 3 m g	5 A
	静注	
2	ロイコボリン 3 m g	5 A
	静注	

Day8

1	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	硫酸M g 補正液 1 m E q / m L 2 0 m L	1 A
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6 . 6 m g	1 瓶
	デキサメタゾン 3 . 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	エトキシド	150 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
4	ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
5	シスプラチン	75 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
6	1 5 % マンニトール S 注射液 3 0 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
7	ラクテック輸液 5 0 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day9

1	ラクテック輸液 5 0 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

3	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
6	生理食塩液 20 mL	1 A
	静注	

Day10

4	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

ETOPOSIDE

がん腫	絨毛性疾患
1 サイクルの日数	21

Day1, 2, 3, 4, 5

1	ソルデム3A輸液 200mL	1袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1mg	1筒
	生理食塩液 100mL	1キット
	点滴静注	
3	エトポシド	100mg/m ²
	生理食塩液 250mL	1袋
	点滴静注	

GEM

がん腫	子宮肉腫、卵巣癌
1 サイクルの日数	28

Day1, 8, 15

1	生理食塩液 100 mL	1 <small>キット</small>
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 <small>瓶</small>
	点滴静注	
2	5%ブドウ糖液 100 mL	1 <small>キット</small>
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 <small>瓶</small>
	点滴静注	

GEM+アバスチン

がん腫	卵巣癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	生理食塩液 100 mL	1 <small>キット</small>
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 <small>瓶</small>
	点滴静注	
2	5%ブドウ糖液 100 mL	1 <small>キット</small>
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 100 mL	1 <small>キット</small>
	ペバシズマブ (アバスチン)	15 mg/kg
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 <small>瓶</small>
	点滴静注	

Day8, 15

1	生理食塩液 100 mL	1 <small>キット</small>
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 <small>瓶</small>
	点滴静注	
2	5%ブドウ糖液 100 mL	1 <small>キット</small>
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 <small>瓶</small>
	点滴静注	

IFM

がん腫	子宮肉腫
1 サイクルの日数	28

Day1, 2, 3, 4, 5

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ソルデム 3 A 輸液 2 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	イホスファミド (イホマイド)	1.5 g/m ²
	点滴静注	
4	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	メスナ 4 0 0 m g	300 mg
	点滴静注	
5	ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L	1 袋
	7%炭酸水素ナトリウム液 2 0 m L	1 A
	点滴静注	
6	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	メスナ 4 0 0 m g	300 mg
	点滴静注	
7	ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L	1 袋
	7%炭酸水素ナトリウム液 2 0 m L	1 A
	点滴静注	
8	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	メスナ 4 0 0 m g	300 mg
	点滴静注	
9	ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

Day6

1	ラクテック輸液 500mL	1瓶
	点滴静注	

MTX

がん腫	絨毛性疾患
1 サイクルの日数	21

Day1, 2, 3, 4, 5

1	メトトレキサート（メソトレキセート）	0.4 mg/kg
	生理食塩液 20 mL	1 A
	筋注	

TP

がん腫	子宮体癌、卵巣癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	ソルデム 3 A 輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day2

1	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	フロセミド 20 mg	1 A
	点滴静注	
3	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	生理食塩液 500 mL	1 袋
	パクリタキセル	135 mg/m ²
	点滴静注	
5	生理食塩液 500 mL	1 袋
	シスプラチン	75 mg/m ²
	点滴静注	
6	15%マンニトールS注射液 300 mL	1 瓶
	点滴静注	
7	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	
8	ソルデム 3 A 輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day3

1	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
---	----------------	-----

	点滴静注	
2	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
3	ラクテック輸液 500mL	1瓶
	点滴静注	
4	グラニセトロン 1mg	1筒
	デキサメタゾン 6.6mg	1瓶
	生理食塩液 50mL	1瓶
	点滴静注	
5	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
6	生理食塩液 10mL	1S
	静注	

Day4

1	グラニセトロン 1mg	1筒
	デキサメタゾン 6.6mg	1瓶
	生理食塩液 50mL	1瓶
	点滴静注	
2	ラクテック輸液 500mL	1瓶
	点滴静注	
3	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	

weekly CDDP

がん腫	子宮頸癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
2	ラクテック輸液 500mL	1瓶
	フロセミド 20mg	1A
	点滴静注	
3	グラニセトロン 1mg	1筒
	デキサメタゾン 6.6mg	1瓶
	生理食塩液 50mL	1瓶
	点滴静注	
4	生理食塩液 500mL	1袋
	シスプラチン	40mg/m ²
	点滴静注	
5	ラクテック輸液 500mL	1瓶
	点滴静注	
	15%マンニトールS注射液 300mL	1瓶
	点滴静注	
6	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	

Day2

1	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
2	ラクテック輸液 500mL	1瓶
	点滴静注	
3	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	

4	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
5	ラクテック輸液 5 0 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
6	生理食塩液 1 0 m L	1 S
	静注	

Day3

1	ラクテック輸液 5 0 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

weekly PTX+CBDCA

がん腫	卵巣がん、緊急申請（腔癌）
1 サイクルの日数	28

Day1, 8

1	デキサート注射液 6. 6 m g (*デ'カ'ロン)	1 瓶
	ガスター注射液 2 0 m g	1 A
	ポララミン注 5 m g	1 A
	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリジ	1 筒
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【112mL/h】	
2	パクリタキセル注 3 0 m g / 5 m L 「NK」	60 mg/m ²
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【260mL/h】	
3	カルボプラチン 50mg 「NK」 / 5 m L	AUC 2
	ブドウ糖注 5 % 2 5 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【250.2mL/h】	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	

PTX: 60mg/m²(D1,8,15) , CBDCA AUC=2(D1,8,15) / 4W 6 コース

Weekly パクリタキセル

がん腫	卵巣癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	生理食塩液 100 mL	1 ｷｯ
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 ｷｯ
	ファモチジン 20 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	点滴静注	
2	パクリタキセル	80 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 ｷｯ
	点滴静注	

Weekly パクリタキセル+アバスチン

がん腫	卵巣癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	ファモチジン 20 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	パクリタキセル	80 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
3	ベバシズマブ (アバスチン)	15 mg/kg
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day8, 15

1	生理食塩液 100 mL	1 キット
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	ファモチジン 20 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	点滴静注	
2	パクリタキセル	80 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

アバスチン維持療法

がん腫	卵巣癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	ベバシズマブ (アバスチン)	15 mg/kg
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

キイトルーダ+レンビマ (3週)

がん種	子宮体癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 100 mL	1 キット
	ペムブロリズマブ (キイトルーダ)	200 mg/body
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

レンビマ 20mg/日連日

キイトルーダ+レンビマ（6週）

がん種	子宮体癌
1 サイクルの日数	42

Day1

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 100 mL	1 キット
	ペムブロリズマブ（キイトルーダ）	400 mg/body
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

レンビマ 20mg /日連日

ドキシル

がん腫	卵巣癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	生理食塩液 250 mL 点滴静注	1 袋
2	グラニセトロン 1 mg デキサメタゾン 6.6 mg ファモチジン 20 mg 生理食塩液 50 mL 点滴静注	1 筒 3 瓶 1 A 1 瓶
3	ドキシルピシン塩酸塩 リポソーム注射剤 (ドキシル) 5%ブドウ糖液 250 mL 点滴静注	50 mg/m ² 1 瓶
4	ラクテック輸液 500 mL 点滴静注	1 瓶

ドキシル+アバスチン

がん腫	卵巣癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	3 瓶
	ファモチジン 2 0 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ドキシソルビシン塩酸塩 リポソーム注射剤 (ドキシル)	50 mg/m ²
	5 %ブドウ糖液 2 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	ベバシズマブ (アバスチン)	15 mg/kg
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

ドセタキセル療法

がん腫	子宮体癌、卵巣癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ドセタキセル	70 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

ノギテカン(産婦人科)

がん腫	卵巣癌
1 サイクルの日数	21

Day1, 2, 3, 4, 5

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 100 mL	1 キット
	ノギテカン (ハイカムチン)	1.5 mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

ノギテカン+アバスチン

がん腫	卵巣癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 100 mL	1 キット
	ノギテカン (ハイカムチン)	1.5 mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 100 mL	1 キット
	ベバシズマブ (アバスチン)	15 mg/kg
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day2, 3, 4, 5

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 100 mL	1 キット
	ノギテカン (ハイカムチン)	1.5 mg/m ²
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

ハラヴェン

がん腫	子宮肉腫
1 サイクルの日数	21

Day1, 8

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	エリブリン (ハラヴェン)	1.4 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

