

血液内科.....	8
ABVd.....	8
ALL202-O Induction A.....	9
ALL202-O Induction B.....	11
ALL202-O COURSE 1	13
ALL202-O COURSE 2A.....	14
ALL202-O COURSE 2B.....	15
ALL202-O COURSE 3	16
ALL202-O Maintenance.....	18
ALL202-U Induction	19
ALL202-U Consolidation.....	21
ALL202-U Sanctuary.....	23
ALL202-U Reinduction	24
ALL202-U Maintenance 1	25
ALL202-U Maintenance 2	26
ALL202-U Maintenance 4.....	27
AML201 Induction A.....	28
AML201 Induction B.....	29
AML201 Consolidation C	30
AML201 Consolidation D1.....	31
AML201 Consolidation D2.....	32
AML201 Consolidation D3.....	33
AML201 Consolidation D4.....	34
APL204 Induction.....	35
APL204 Consolidation 1	36
APL204 Consolidation 2.....	37
APL204 Consolidation 3.....	38
APL205R Induction	39
APL205R Consolidation	40
APL212 Induction(IDA+AraC).....	41
APL212 Consolidation 1, 3(ATO).....	43
APL212 Consolidation 2 (DNR+AraC)	44
APL212 Consolidation 4 (GO).....	46
AraC 大量療法 (R-MPV 後)	47
A-CHP	49
B-ALL213 寛解導入療法	50
B-ALL213 地固め療法 1(4)	52
B-ALL213 地固め療法 2(5)	54
B-ALL213 地固め療法 3	56

B-ALL213 維持療法.....	58
BEACOPP	59
BU+CY(造血幹細胞移植前処置).....	61
BU-THIO（造血幹細胞移植前処置）	63
Burkitt-ALL213 Regimen A (R-Hyper-CVAD) course 1, 7	65
Burkitt-ALL213 Regimen A (R-Hyper-CVAD) course 3, 5	67
Burkitt-ALL213 Regimen B (R-MTX/AraC) course 2, 4.....	70
Burkitt-ALL213 Regimen B (R-MTX/AraC) course 6, 8.....	74
CA+CY+TBI	77
CEOP.....	79
CHASE.....	80
CHOP	81
C-MOPP	82
COP	83
CY+BU（造血幹細胞移植前処置）	84
CY+TBI(造血幹細胞移植前処置).....	86
CY 大量療法(造血幹細胞採取)	87
DA-EPOCH Level 1	88
DA-EPOCH Level 2	90
DA-EPOCH Level 3	92
DA-EPOCH Level 4	94
DBd 療法（皮下） 1-3 コース目	96
DBd 療法（皮下） 4-8 コース目	97
DBd 療法（皮下） 9 コース目以降	98
DCd 療法 1 コース目	99
DCd 療法 2 コース目	103
DCd 療法 3-6 コース目.....	105
DCd 療法 7 コース目以降.....	107
DCEP 療法.....	109
DeVIC.....	110
DLd 療法（皮下） 1-2 コース目	112
DLd 療法（皮下） 3-6 コース目	113
DLd 療法（皮下） 7 コース目以降	114
DMPB 療法 1 コース目	115
DMPB 療法 1 コース目(分割投与).....	117
DMPB 療法 2-9 コース目	120
DMPB 療法 10 コース目以降	121
DCd 療法(皮下)1 コース目	122
DCd 療法(皮下)2 コース目	125
DCd 療法(皮下)3-6 コース目	128
DCd 療法(皮下)7 コース目以降	130

DMPB 療法（皮下）1 コース目.....	132
DMPB 療法（皮下）2-9 コース目	133
DMPB 療法（皮下）10 コース目以降	134
Epcoritamab 1 コース目.....	135
Epcoritamab 2-3 コース目	136
Epcoritamab 4-9 コース目	137
Epcoritamab 10 コース目以降	138
EPd(50kg 未満 1 コース目)	139
EPd(50kg 未満 2 コース目)	140
EPd(50kg 未満 3 コース目)	141
EPd(50kg 未満 4 コース目)	142
EPd(50-90kg 1 コース目)	143
EPd(50-90kg 2 コース目)	144
EPd(50-90kg 3 コース目)	145
EPd(50-90kg 4 コース目)	146
EPd(90kg 超 1 コース目)	147
EPd(90kg 超 2 コース目)	148
EPd(90kg 超 3 コース目)	149
EPd(90kg 超 4 コース目)	150
EPOCH.....	151
escalated BEACOPP.....	152
FC 療法	154
FluBu2.....	155
FluBu4.....	157
FLU+BU4+MEL	159
FLU+MEL+ATG(造血幹細胞移植前処置).....	161
FM140(造血幹細胞移植前処置)	163
Ful+CY+TBI2Gy.....	165
Ful+Mel+TBI(造血幹細胞移植前処置).....	166
GCP 療法	167
GDP 療法.....	168
GML200 Induction	170
GML200 Consolidation1.....	171
GML200 Consolidation2.....	172
GML200 Consolidation3.....	174
High-CHOP.....	175
hyper CVAD	176
ICE	178
iPAD	180
Isa+Kd 療法 Cycle1.....	181
Isa+Kd 療法 Cycle2-	185

Isa+Pd 療法（1 コース目）	187
Isa+Pd 療法（2 コース目以降）	188
Kd 療法(56 週 2)（初回）	189
Kd 療法(56 週 2)（2 コース目以降）	190
Kd 療法(70 週 1 1 コース目）	191
Kd 療法(70 週 1 2 コース目以降）	192
KRd Cycle1	193
KRd Cycle2-12.....	195
KRd Cycle13-.....	197
LEED(造血幹細胞移植前処置).....	198
L-PAM(造血幹細胞移植前処置).....	200
L-PAM+TBI(造血幹細胞移植前処置）	201
MEC.....	202
MDS200 Induction A.....	204
MDS200 Induction B.....	205
MDS200 Consolidation 1.....	206
MDS200 Consolidation 2.....	207
MDS200 Consolidation 3.....	209
MDS200 Maintenance 1	210
MDS200 Maintenance 2	211
MDS200 Maintenance 3	212
MDS200 Maintenance 4.....	214
MIT-COP	215
MIT+ロイスタチン	216
mLSG15.....	217
MMPP.....	219
MTX 大量療法	220
MTX 大量療法+Ara- C 大量療法	221
Pembrolizumab(200mg 3 週毎).....	223
Pembrolizumab(400mg 6 週毎).....	224
Ph+ALL202 Induction A	225
Ph+ALL202 Induction B	226
Ph+ALL202 Consolidation 1	227
Ph+ALL202 Maintenance	229
Ph+ALL208IMA Induction A.....	230
Ph+ALL208IMA Induction B.....	231
Ph+ALL208IMA Consolidation C1	232
Ph+ALL208IMA Consolidation C2.....	234
Ph+ALL208IMA Maintenance.....	235
Ph+ALL213 強化地固め療法 A	236
Ph+ALL213 強化地固め療法 B	238

Ph+ALL213 地固め療法 C1.....	240
Ph+ALL213 地固め療法 C2.....	243
Ph+ALL213 維持療法.....	244
Pola-BR(ポート留置) 1 コース目	245
Pola-BR(ポート留置) 2 コース目以降.....	248
Pola-BR(末梢) 1 コース目	250
Pola-BR(末梢) 2 コース目以降.....	252
POLA-CHP 初回	254
POLA-CHP2 回目以降.....	255
POLA-R-CHP2 回目以降.....	256
PTCY FLU+BU2.....	257
PTCY FLU+BU4 (造血幹細胞移植前処置)	260
PTCY FLU+TBI12Gy (造血幹細胞移植前処置)	262
R-CHOP	264
R-CODOX-M	265
R-COP	270
R-IVAC	271
ROAD	276
R-MPV 療法.....	277
S-HAM.....	279
SMILE.....	280
short term MTX.....	282
T-ALL-211-U HR3.....	283
T-ALL-211-U HR2.....	287
T-ALL-211-U HR1.....	293
T-ALL211-U 寛解導入療法	298
T-ALL211-U 早期強化療法	300
T-ALL211-U SR の強化療法	302
T-ALL211-U SR の再寛解導療法 A	304
T-ALL211-U SR の再寛解導療法 B	306
T-ALL213-O 寛解導入療法	308
T-ALL213-O 寛解導入療法 2	310
T-ALL2130-O 地固め療法 1 (4)	311
T-ALL213-O 地固め療法 2.....	312
T-ALL213-O 地固め療法 3.....	313
T-ALL213-O 地固め療法 5	315
T-ALL213-O 維持療法	317
THP-COP.....	318
VAD	319
VP-16 大量療法(造血幹細胞採取).....	320
VP 療法	321

VR-CAP	322
アドセトリス	324
エンドキサン 1000mg（免疫抑制）	325
イストダックス	326
エルレフィオ皮下注.....	327
ガザイバ(初回)	329
ガザイバ(2回目以降)	330
ガザイバ 1 コース目（4週間）	331
ガザイバ 1 コース目（3週間）	332
ガザイバ 2 コース目以降	333
シタラビン少量皮下注射（ベネトクラクス併用）	334
少量エトポシド	335
髄注 MTX+PSL	336
髄注 MTX+DEX	337
髄注 MTX+AraC+PSL	338
髄注 MTX+AraC+DEX	339
大量 AraC 療法(3日間)	340
ダリナパルシン療法.....	341
短時間 CHOP	342
短時間 COP	343
トレアキシシン 90（ポート留置）	344
トレアキシシン 90（末梢）	345
トレアキシシン 120（ポート留置）	346
トレアキシシン 120（末梢）	347
ネララビン	348
ビキセオス Induction 1.....	350
ビキセオス Induction 2.....	351
ビキセオス Consolidation.....	352
ビダーザ 皮下注射.....	353
ビダーザ 点滴静注.....	354
ビーリンサイト(45kg 未満 1 コース目)	355
ビーリンサイト(45kg 未満 2-5 コース目)	356
ビーリンサイト(45kg 未満 6-9 コース目)	357
ビーリンサイト(45kg 以上 1 コース目)	358
ビーリンサイト(45kg 以上 2-5 コース目)	360
ビーリンサイト(45kg 以上 6-9 コース目)	361
プララトレキサート療法	362
フルダラ	363
ベスポンサ 1 コース目.....	364
ベスポンサ 2 コース目以降（寛解）	365
ベスポンサ 2 コース目以降（非寛解）	366

ベスポンサ投与方法（ベスポンサ適正使用ガイドより）	367
ポテリジオ単剤.....	368
ボルテゾミブ皮下投与(週2回).....	369
ボルテゾミブ皮下投与(週1回).....	370
マイロターグ	371
ユルトミリス HI 40kg 以上 60kg 未満（初回）	372
ユルトミリス HI 40kg 以上 60kg 未満（2回目以降）	373
ユルトミリス HI 60kg 以上 100kg 未満（初回）	374
ユルトミリス HI 60kg 以上 100kg 未満（2回目以降）	375
リツキサン(CLL)（初回）	376
リツキサン(CLL)（2回目以降）	377
リツキサン(ITP)（初回).....	378
リツキサン(ITP)（2回目以降）	379
リツキサン(TTP)（初回）	380
リツキサン(TTP)（2回目以降）	381
リツキシマブ(初回).....	382
リツキシマブ(2回目以降).....	383
ロイスタチン	384
ロイスタチン 5日間	385

血液内科

ABVd

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	28

Day1, 14

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ソルデム 1 輸液 5 0 0 m L	500 mL
	点滴静注	
3	ビンブラスチン (エクザール)	6 mg/m ²
	生理食塩液 2 0 m L	10 mL
	静注	
4	ドキソルビシン	25 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	100 mL
	点滴静注	
5	ブレオマイシン (ブレオ)	9 mg/m ²
	ヒドロコルチゾン 1 0 0 m g	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	100 mL
	点滴静注	
6	ダカルバジン (ダカルバジン)	250 mg/m ²
	5 %ブドウ糖注 5 0 0 m L	500 mL
	点滴静注	

ALL202-O Induction A

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	30

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	
3	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	60 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	
4	シクロホスファミド (エンドキサン)	mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	

Day2, 3

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	
2	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	60 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	

Day8, 15, 22

1	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	

Day9, 11, 13, 16, 18, 20

1	L-アスパラギナーゼ (ロイナーゼ)	3000 U/m ²
	5 %ブドウ糖注 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

プレドニゾン：60mg/m²(day1-21)

ALL202-O Induction B

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	30

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	
3	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	30 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	
4	シクロホスファミド (エンドキサン)	800 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	

Day2, 3

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	
2	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	30 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	

Day8, 15, 22

1	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	

Day9, 11, 13, 16, 18, 20

1	L-アスパラギナーゼ (ロイナーゼ)	3000 U/m ²
	5 %ブドウ糖注 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

プレドニゾン：60mg/m²(day1-7)

ALL202-O COURSE 1

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	30

Day1-3

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	3 瓶
	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	シタラビン (キロサイド)	2000 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	エトポシド	100 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
4	デキサメタゾン 6. 6 m g	3 瓶
	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
5	シタラビン (キロサイド)	2000 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

ALL202-O COURSE 2A

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	30

Day1, 15

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	メトトレキサート (メソトレキセート)	3000 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

メルカプトプリン：25mg/m²(day1-21)

ALL202-O COURSE 2B

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	30

Day1, 15

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	メトトレキサート (メソトレキセート)	100 mg/m ²
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	点滴静注	
4	メトトレキサート (メソトレキセート)	400 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

メルカプトプリン：25mg/m²(day1-21)

ALL202-O COURSE 3

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	60

Day1, 8, 15

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	
3	ドキソルビシン	30 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	

Day29

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	
2	シタラビン (キロサイド)	75 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	
3	シクロホスファミド (エンドキサン)	1000 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	

Day30-33, 36-40

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	
2	シタラビン (キロサイド)	75 mg/m ²

	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	

デキサメタゾン：10mg/m²(day1-8,day15-22)

メルカプトプリン：60mg/m²(day29-42)

ALL202-O Maintenance

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	28

Day1

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

ALL202-U Induction

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	30

Day8

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.5 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	
3	ピラルビシン (ピノルビン)	25 mg/m ²
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	
4	デキサメタゾン 6. 6 m g	2 罎
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	

Day9

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	
2	ピラルビシン (ピノルビン)	25 mg/m ²
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	
3	デキサメタゾン 6. 6 m g	2 罎
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	

Day10

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	
2	シクロホスファミド (エンドキサン)	mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋

	点滴静注	
3	デキサメタゾン 6. 6 m g	2 瓶
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	

Day11-14

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	2 瓶
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	

Day15, 29

1	ビンクリスチン (オンコビン)	1.5 mg
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶/m ²
	点滴静注	
2	L-アスパラギナーゼ (ロイナーゼ)	6000 U/m ²
	5 %ブドウ糖注 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

Day17, 19, 21, 23, 25, 27

1	L-アスパラギナーゼ (ロイナーゼ)	6000 U/m ²
	5 %ブドウ糖注 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

Day22

1	ビンクリスチン (オンコビン)	1.5 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

プレドニゾロン：60mg/m²(day1-7)プレドニゾロン：40mg/m²(day15-28)

ALL202-U Consolidation

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	30

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	シタラビン (キロサイド)	75 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	ピラルビシン (ピノルビン)	25 mg/m ²
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
4	シクロホスファミド (エンドキサン)	750 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day2

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	シタラビン (キロサイド)	75 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	ピラルビシン (ピノルビン)	25 mg/m ²
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	

Day3-6, 9-13

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

2	シタラビン（キロサイド）	75 mg/m ²
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	

Day8

1	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	シタラビン（キロサイド）	75 mg/m ²
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
3	シクロホスファミド（エンドキサン）	750 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

メルカプトプリン：50mg/m²(day1-14)

ALL202-U Sanctuary

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	30

Day1, 8

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリンジ	1 筒
	デキサート注射液 6 . 6 m g (*デカトロン)	1 瓶
	点滴静注	
2	メトトレキサート (メソトレキセート)	3000 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

副作用対策:ロイコボリン

ALL202-U Reinduction

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	30

Day1, 8

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.5 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	ピラルビシン (ピノルビン)	25 mg/m ²
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	
4	シクロホスファミド (エンドキサン)	500 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day2, 4, 6, 9, 11, 13

1	L-アスパラギナーゼ (ロイナーゼ)	6000 U/m ²
	5 %ブドウ糖液 2 0 m L	2 瓶
	筋注	

Day15

1	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.5 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

ALL202-U Maintenance 1

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	30

Day1, 15, 29

1	メトトレキサート（メソトレキセート）	150 mg/m ²
	静注	

メルカプトプリン：50mg/m²(day1-28)

ALL202-U Maintenance 2

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	30

Day1, 15

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.5 mg/m ²
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	静注	

Day2, 9,16

1	L-アスパラギナーゼ (ロイナーゼ)	10000 U/m ²
	5%ブドウ糖液 20 mL	2 mL
	筋注	

Day8

1	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.5 mg/m ²
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	シクロホスファミド (エンドキサン)	600 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	静注	

プレドニゾロン：40mg/m²(day1-14)

ALL202-U Maintenance 4

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	30

Day1, 15

1	生理食塩液 50 mL	1 瓿
	静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.5 mg/m ²
	生理食塩液 50 mL	1 瓿
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓿
	静注	

Day8

1	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 50 mL	1 瓿
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.5 mg/m ²
	生理食塩液 50 mL	1 瓿
	点滴静注	
3	ピラルビシン (ピノルビン)	25 mg/m ²
	5%ブドウ糖液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓿
	静注	

Day2, 9, 16

1	L-アスパラギナーゼ (ロイナーゼ)	10000 U/m ²
	5%ブドウ糖液 20 mL	2 mL
	筋注	

プレドニゾロン：60mg/m²(day1-21)

AML201 Induction A

がん腫	AML(急性骨髄性白血病)
1 サイクルの日数	30

Day1-3

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	
4	イダルビシン (イダマイシン)	12 mg/m ²
	注射用水 20 mL	1 A
	生理食塩液 100 mL	100 mL
	点滴静注	
5	シタラビン (キロサイド)	100 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	
6	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day4-7

1	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	
2	シタラビン (キロサイド)	100 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	

Day8

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

AML201 Induction B

がん腫	AML(急性骨髄性白血病)
1 サイクルの日数	30

Day1-5

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	50 mg/m ²
	生理食塩液 100 mL	100 mL
	点滴静注	
3	シタラビン (キロサイド)	100 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	
4	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	
5	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
6	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day6-7

1	シタラビン (キロサイド)	100 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	

Day8

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

AML201 Consolidation C

がん腫	AML(急性骨髄性白血病)
1 サイクルの日数	30

Day1-5

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	メチルプレドニゾロン 1 2 5 m g	40 mg
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	シタラビン (キロサイド)	2000 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 ml
	点滴静注	
3	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	メチルプレドニゾロン 1 2 5 m g	40 mg
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	シタラビン (キロサイド)	2000 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 ml
	点滴静注	

AML201 Consolidation D1

がん腫	AML(急性骨髄性白血病)
1 サイクルの日数	30

Day1-3

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ミトキサントロン (ノバントロン)	7 mg/m ²
	生理食塩液 100 mL	100 mL
	点滴静注	
3	シタラビン (キロサイド)	200 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	
4	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	
5	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
6	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day4-5

1	シタラビン (キロサイド)	200 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	

Day6

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

AML201 Consolidation D2

がん腫	AML(急性骨髄性白血病)
1 サイクルの日数	30

Day1-3

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	シタラビン (キロサイド)	200 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	
3	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	50 mg/m ²
	生理食塩液 100 mL	100 mL
	点滴静注	
4	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	
5	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
6	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day4-5

1	シタラビン (キロサイド)	200 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	

Day6

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

AML201 Consolidation D3

がん腫	AML(急性骨髄性白血病)
1 サイクルの日数	30

Day1-5

1	アクリルビシン (アクリシノン)	20 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	100 ml/
	点滴静注	
2	シタラビン (キロサイド)	200 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 ml/
	点滴静注	
3	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
6	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day6

1	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

AML201 Consolidation D4

がん腫	AML(急性骨髄性白血病)
1 サイクルの日数	30

Day1-5

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	シタラビン (キロサイド)	200 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 ml
	点滴静注	
3	エトポシド	100 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 ml
	点滴静注	

Day8, 10

1	ビンクリスチン (オンコビン)	0.8 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

APL204 Induction

がん腫	APL(急性前骨髄球性白血病)
1 サイクルの日数	28

Day1-3

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	イダルビシン (イダマイシン)	12 mg/m ²
	注射用水 20 mL	1 A
	生理食塩液 100 mL	100 mL
	点滴静注	
4	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	
5	シタラビン (キロサイド)	100 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	
6	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day4-7

1	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	
2	シタラビン (キロサイド)	100 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	

Day8

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

ベサノイド：45mg/m² 分3

APL204 Consolidation 1

がん腫	APL(急性前骨髄球性白血病)
1 サイクルの日数	28

Day1-3

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	静注	
2	ミトキサントロン (ノバントロン)	7 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	100 ml
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
5	シタラビン (キロサイド)	200 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 ml
	点滴静注	
6	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day4-5

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	静注	
2	シタラビン (キロサイド)	200 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 ml
	点滴静注	

Day6

1	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

APL204 Consolidation 2

がん腫	APL(急性前骨髄球性白血病)
1 サイクルの日数	28

Day1-3

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	50 mg/m ²
	生理食塩液 100 mL	100 mL
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	
5	シタラビン (キロサイド)	200 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	
6	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day4-5

1	シタラビン (キロサイド)	200 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	

Day6

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

APL204 Consolidation 3

がん腫	APL(急性前骨髄球性白血病)
1 サイクルの日数	28

Day1-3

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	イダルビシン (イダマイシン)	12 mg/m ²
	注射用水 20 mL	1 A
	生理食塩液 100 mL	100 mL
	点滴静注	
3	シタラビン (キロサイド)	140 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	
4	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	
5	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
6	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day4-5

1	シタラビン (キロサイド)	140 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	

Day6

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

APL205R Induction

がん腫	APL(急性前骨髄球性白血病)
1 サイクルの日数	60

Day1-2

1	三酸化ニヒ素（トリセノックス）	0.15 mg/kg
	5 %ブドウ糖液 250 mL	250 mL
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 50 mL	1 筒
	点滴静注	
3	イダルビシン（イダマイシン）	12 mg/m ²
	注射用水 20 mL	1 A
	生理食塩液 100 mL	100 mL
	点滴静注	

Day3-60

1	三酸化ニヒ素（トリセノックス）	0.15 mg/kg
	5 %ブドウ糖液 250 mL	250 mL
	点滴静注	

APL205R Consolidation

がん腫	APL(急性前骨髄球性白血病)
1 サイクルの日数	30

Day1-30

1	三酸化二ヒ素（トリセノックス）	0.15 mg/kg
	5 %ブドウ糖液 250 mL	250 mL
	点滴静注	

APL212 Induction(IDA+AraC)

がん腫	APL(急性前骨髄球性白血病)
1 サイクルの日数	30

Day1

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	イダルビシン (イダマイシン)	12 mg/m ²
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	注射用水 20 mL	2 A
	点滴静注	
3	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	
4	シタラビン (キロサイド)	100 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
6	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day2, 3

1	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	イダルビシン (イダマイシン)	12 mg/m ²
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	注射用水 20 mL	2 A
	点滴静注	
4	シタラビン (キロサイド)	100 mg
	生理食塩液 500 mL	1 袋

	点滴静注	
5	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day4-7

1	シタラビン (キロサイド)	100 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	

Day8

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

ベサノイド 45mg/m² 分3

APL212 Consolidation 1, 3(ATO)

がん腫	APL(急性前骨髄球性白血病)
1 サイクルの日数	35

Day1-5, 8-12, 15-19, 22-26, 29-33

1	三酸化ニヒ素 (トリセノックス)	0.15 mg/kg
	5 %ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

APL212 Consolidation 2 (DNR+AraC)

がん腫	APL(急性前骨髄球性白血病)
1 サイクルの日数	30

Day1

1	シタラビン (キロサイド)	200 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	50 mg/m ²
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	
5	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
6	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	11:30

Day2-3

1	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	50 mg/m ²
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	シタラビン (キロサイド)	200 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

5	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	11:30

Day4-5

1	シタラビン (キロサイド)	200 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	

Day6

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

APL212 Consolidation 4 (GO)

がん腫	APL(急性前骨髄球性白血病)
1 サイクルの日数	28

Day1, 15

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	静注	
2	アセトアミノフェン 1 0 0 0 m g	1 袋
	ヒドロコルチゾン 1 0 0 m g	1 A
	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	点滴静注	
3	ゲムツズマブオゾガマイシン (マイロターグ)	4 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
5	ヒドロコルチゾン 1 0 0 m g	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	

AraC 大量療法（R-MPV 後）

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	30

Day1,2

1	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリンジ	1 筒
	ソル・メドロール静注用 1 2 5 m g	40 mg
	大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L	1 キット
	持続点滴（速度指定） mL/h 【202mL/h】	
2	キロサイドN注 1 g 5 0 m L	3000 mg
	テルモ生食 5 0 0 m L	300 mL
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【150mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	

AraC: 3000mg/m² (D1,2) 最大 6000mg

R-MPV 後の治療に使用

A-AVD

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	28

Day1, 15

1	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	ビンブラスチン (エクザール)	6 mg/m ²
	生理食塩液 20 mL	10 mL
	点滴静注	
4	ドキソルビシン	25 mg/m ²
	生理食塩液 100 mL	100 mL
	点滴静注	
5	ダカルバジン (ダカルバジン)	375 mg/m ²
	ブドウ糖注5% 500 mL	500 mL
	点滴静注	
6	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
7	ブレンツキシマブ ベドチン (アドセトリス)	1.2 mg/kg
	注射用水 20 mL	2 A
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
8	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

A-AVd の場合：DTIC が 250mg/m²、最大 6 サイクル

A-CHP

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	ブレンツキシマブ ペドチン (アドセトリス)	1.8 mg/kg
	注射用水 100 mL	1 瓶
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	ドキソルビシン	50 mg/m ²
	生理食塩液 100 mL	100 mL
	点滴静注	
6	シクロホスファミド (エンドキサン)	750 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	
7	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

PSL:100mg/day (d1-5)

B-ALL213 寛解導入療法

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	28

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	
3	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	45 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	
4	シクロホスファミド (エンドキサン)	mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	

Day2, 3

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	
2	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	45 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 キツ
	点滴静注	

Day7, 21

1	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	

Day8,10, 12, 14, 16, 18, 20,22

1	L-アスパラギナーゼ (ロイナーゼ)	5000 U/m ²
	5 %ブドウ糖注 5 0 0 m L	1 袋

	点滴静注	
--	------	--

Day15

1	ビンクリスチン（オンコビン）	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

プレドニゾロン：60mg/m² day-7～21、以降漸減し、7日間で中止。（45歳以上60歳未満はday14まで、60歳以上はday7まで）

B-ALL213 地固め療法 1(4)

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	28

Day1-3

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	5 ㍴
	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	シタラビン (キロサイド)	2000 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	エトポシド	100 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 ㍴
	点滴静注	
5	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍴
	点滴静注	
6	シタラビン (キロサイド)	2000 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

Day4

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 ㍴
	点滴静注	
2	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 ㍴
	点滴静注	
3	L-アスパラギナーゼ (ロイナーゼ)	10000 U/m ²
	5 %ブドウ糖注 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

B-ALL213 地固め療法 2(5)

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	28

Day1, 15

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	メトトレキサート (メソトレキセート)	3000 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

Day2, 16

1	ロイコボリン 3 m g	17 A
	静注	

Day3, 17

1	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	
2	L-アスパラギナーゼ (ロイナーゼ)	10000 U/m ²
	5 %ブドウ糖注 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	
4	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	
5	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	

Day4-6, 18-20

1	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	

2	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	
3	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	
4	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	

メルカプトプリン：25mg/m² day1－21

B-ALL213 地固め療法 3

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	56

Day1, 8, 15

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	45 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	

Day2, 4, 6, 9, 11, 13

1	L-アスパラギナーゼ (ロイナーゼ)	5000 U/m ²
	5 %ブドウ糖注 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

Day29

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	シタラビン (キロサイド)	75 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	
3	シクロホスファミド (エンドキサン)	mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day30-33, 36-40

1	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

2	シタラビン（キロサイド）	75 mg/m ²
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	

デキサメタゾン：8.25mg/m² day1-8,15-22

メルカプトプリン：60mg/m² day29-42

B-ALL213 維持療法

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	28

Day1

1	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	

プレドニゾン：60mg/m²(day1-5)

メトトレキサート：20mg/m²(day1,8,15,22)

メルカプトプリン：(day1-28)

BEACOPP

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	エトポシド	100 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 mL
	点滴静注	
3	ドキソルビシン	25 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	100 mL
	点滴静注	
4	シクロホスファミド (エンドキサン)	650 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 mL
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day2, 3

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	エトポシド	100 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 mL
	点滴静注	

Day8

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.4 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

3	ブレオマイシン（ブレオ）	10 mg/m ²
	ヒドロコルチゾン 100 mg	100 mg
	生理食塩液 100 mL	100 mL
	点滴静注	

プレドニゾン：40mg/m²(day1-14)

プロカルバジン：100mg/m²(day1-7)

BU+CY(造血幹細胞移植前処置)

がん腫	移植
1 サイクルの日数	7

Day1-4

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	
2	生理食塩液 5 0 m L	60 mg/kg
	点滴静注	500 mL
3	ブスルファン (ブスルフェクス)	3.2m,g/kg
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 筒
	点滴静注	1 キツ

Day6, 7

1	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリンジ	1 筒
	デキサート注射液 3. 3 m g (*デ'カ'ロン)	1 A
	大塚生食注2ポート 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴 (速度指定) mL/h 【204mL/h】	10:00
2	注射用エンドキサン 5 0 0 m g	60 mg/kg
	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【166.66mL/h】	10:30
3	ウロミテキサン注 4 0 0 m g	3 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【124mL/h】	10:30
4		
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴 (全開)	13:30
	ウロミテキサン注 4 0 0 m g	3 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【124mL/h】	14:30

	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シンジ	1 筒
	大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴（速度指定） mL/h 【202mL/h】	16:00
	ウロミテキサン注 4 0 0 m g	3 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【124mL/h】	18:30

BU-THIO（造血幹細胞移植前処置）

がん腫	移植
1 サイクルの日数	9

Day1-4

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	ブスルファン（ブスルフェクス）	3.2 mg/kg
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	点滴静注	
4	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day5-6

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	チオテパ（リサイオ）	5 mg/kg
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

5	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	静注	

Burkitt-ALL213 Regimen A (R-Hyper-CVAD) course 1, 7

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	28

Day1-3

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	5 ㍴
	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	シクロホスファミド (エンドキサン)	300 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍴
	点滴静注	
4	シクロホスファミド (エンドキサン)	300 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
5	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	静注	
6	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍴
	点滴静注	

Day4

1	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍴
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6. 6 m g	5 ㍴
	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	ビンクリスチン (オンコビン)	1.4 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍴
	点滴静注	

4	ドキソルビシン	50 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
6	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day5

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day11

1	デキサメタゾン 6.6 mg	5 瓶
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	ビンクリスチン（オンコビン）	1.4 mg/m ²
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day12-14

1	デキサメタゾン 6.6 mg	5 瓶
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	

Day1：髄注あり（コース3,5,7のみ）

Burkitt-ALL213 Regimen A (R-Hyper-CVAD) course 3, 5

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	21

Day1

1	ヒドロコルチゾン 100 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	リツキシマブ	375 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day2

1	デキサメタゾン 6.6 mg	5 瓶
	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	シクロホスファミド (エンドキサン)	300 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	シクロホスファミド (エンドキサン)	300 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
5	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	
6	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day3-5

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6.6 mg	5 瓶
	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
3	シクロホスファミド (エンドキサン)	300 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	シクロホスファミド (エンドキサン)	300 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
6	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	
7	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day6

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day8

1	ヒドロコルチゾン 100 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	リツキシマブ	375 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day12

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	5 瓶
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	ビンクリスチン（オンコビン）	1.4 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day13-15

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	5 瓶
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	

Day2：髄注あり（コース 3,5,7 のみ）

Burkitt-ALL213 Regimen B (R-MTX/AraC) course 2, 4

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	21

Day1

1	ヒドロコルチゾン 100 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
3	リツキシマブ	375 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day2

1	メチルプレドニゾロン 125 mg	50 mg
	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	メトトレキサート (メソトレキセート)	100 mg/m ²
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
3	メトトレキサート (メソトレキセート)	900 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	メチルプレドニゾロン 125 mg	50 mg
	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	

Day3

1	メチルプレドニゾロン 125 mg	50 mg
	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	

2	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	シタラビン (キロサイド)	2000 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	メチルプレドニゾロン 125 mg	50 mg
	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
6	ロイコボリン 3 mg	5 A
	静注	
7	シタラビン (キロサイド)	2000 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day4

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ロイコボリン 3 mg	5 A
	静注	
3	メチルプレドニゾロン 125 mg	50 mg
	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
4	ロイコボリン 3 mg	5 A
	静注	
5	シタラビン (キロサイド)	2000 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

6	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
7	ロイコボリン 3 mg	5 A
	静注	
8	メチルプレドニゾロン 125 mg	50 mg
	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
9	ロイコボリン 3 mg	5 A
	静注	
10	シタラビン (キロサイド)	2000 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day5

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ロイコボリン 3 mg	5 A
	静注	
3	ロイコボリン 3 mg	5 A
	静注	
4	ロイコボリン 3 mg	5 A
	静注	
5	ロイコボリン 3 mg	5 A
	静注	

Day6

1	ロイコボリン 3 mg	5 A
	静注	
2	ロイコボリン 3 mg	5 A
	静注	

3	ロイコボリン 3 m g	5 A
	静注	
4	ロイコボリン 3 m g	5 A
	静注	

Day8

1	ヒドロコルチゾン 1 0 0 m g	1 A
	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	リツキシマブ	375 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day2：髄注あり。

シタラビン：1g/m²/回に減量（60 歳以上）

Burkitt-ALL213 Regimen B (R-MTX/AraC) course 6, 8

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	21

Day1

1	メチルプレドニゾロン 1 2 5 m g	50 mg
	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	メトトレキサート (メソトレキセート)	100 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	メトトレキサート (メソトレキセート)	900 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
4	メチルプレドニゾロン 1 2 5 m g	50 mg
	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	

Day2

1	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	メチルプレドニゾロン 1 2 5 m g	50 mg
	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	シタラビン (キロサイド)	2000 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
5	メチルプレドニゾロン 1 2 5 m g	50 mg

	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	
6	ロイコボリン 3 m g	5 A
	静注	
7	シタラビン (キロサイド)	2000 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

Day3

1	生理食塩液 5 0 m L	1 瓿
	点滴静注	
2	ロイコボリン 3 m g	5 A
	静注	
3	メチルプレドニゾロン 1 2 5 m g	50 mg
	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	
4	シタラビン (キロサイド)	2000 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
5	ロイコボリン 3 m g	5 A
	静注	
6	生理食塩液 5 0 m L	1 瓿
	点滴静注	
7	ロイコボリン 3 m g	5 A
	静注	
8	メチルプレドニゾロン 1 2 5 m g	50 mg
	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	

9	シタラビン（キロサイド）	2000 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
10	ロイコボリン 3 mg	5 A
	静注	

Day4

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ロイコボリン 3 mg	5 A
	静注	
3	ロイコボリン 3 mg	5 A
	静注	
4	ロイコボリン 3 mg	5 A
	静注	
5	ロイコボリン 3 mg	5 A
	静注	

Day5

1	ロイコボリン 3 mg	5 A
	静注	
2	ロイコボリン 3 mg	5 A
	静注	
3	ロイコボリン 3 mg	5 A
	静注	
4	ロイコボリン 3 mg	5 A
	静注	

Day1：髄注あり。

シタラビン：1g/m²/回に減量（60歳以上）

CA+CY+TBI

がん腫	移植
1 サイクルの日数	4

Day1, 2

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	メチルプレドニゾロン 1 2 5 m g	40 mg
	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	
2	シタラビン (キロサイド)	3000 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	
4	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	メチルプレドニゾロン 1 2 5 m g	40 mg
	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	
5	シタラビン (キロサイド)	3000 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

Day3, 4

1	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	
3	シクロホスファミド (エンドキサン)	60 mg/kg
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 罎

	点滴静注	
5	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	

G-CSF(5ug/kg/day)を AraC 投与 12 時間前より投与

CEOP

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	テルモ生食 500 mL	1 袋
	点滴（速度指定） mL/h 【62.5mL/h】	化療①[23:31]
2	グラニセトン静注液 1 mg / 1 mL シリジ	1 筒
	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【204mL/h】	化療①[23:31]
3	オンコビン注射用 1 mg	1.4 mg/m ²
	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【200mL/h】	化療②[23:32]
4	注射用エンドキサン 500 mg	750 mg/m ²
	大塚生食注 250 mL	1 袋
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【250mL/h】	化療③[23:33]
5	エトポシド 点滴静注液 100mg/5mL「サント」(*ラステット)	50 mg/m ²
	テルモ生食 500 mL	1 袋
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【167.5mL/h】	化療④[23:34]
6	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	化療⑤[23:35]

VCR: 1.4mg/m²(day1), CPA: 750mg/m²(day1), ETP: 50mg/m²(day1), ETP(po): 100mg/m²(day2-3),

PSL100mg/day あるいは 60mg/m² (day1-5)

CHASE

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	6 ㊦
	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	エトポシド	100 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 mL
	点滴静注	
4	シクロホスファミド (エンドキサン)	mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 mL
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 ㊦
	点滴静注	

Day2, 3

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	6 ㊦
	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	エトポシド	100 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 mL
	点滴静注	
4	シタラビン (キロサイド)	2000 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 mL
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 ㊦
	点滴静注	

CHOP

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	ソルデム 1 輸液 5 0 0 m L	500 mL
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	ピンクリスチン (オンコビン)	1.4 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	ドキソルビシン	50 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	100 mL
	点滴静注	
5	シクロホスファミド (エンドキサン)	750 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 mL
	点滴静注	
6	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

プレドニゾン：100mg/day あるいは 60mg/m²(day1-5)

C-MOPP

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	28

Day1, 8

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ソルデム 1 輸液 5 0 0 m L	500 mL
	点滴静注	
3	ピンクリスチン (オンコビン)	1.4 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	シクロホスファミド (エンドキサン)	650 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 mL
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

プレドニゾロン：40mg/m² d1-14プロカルバジン：100mg/m² d1-14

COP

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 100 mL	100 mL
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 50 mL	1 筒
	点滴静注	
3	ピンクリスチン（オンコビン）	1.4 mg/m ²
	生理食塩液 50 mL	1 筒
	点滴静注	
4	シクロホスファミド（エンドキサン）	750 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	
5	生理食塩液 50 mL	1 筒
	点滴静注	

プレドニゾロン：100mg/day あるいは 60mg/m²(day1-5)

CY+BU（造血幹細胞移植前処置）

がん腫	移植
1 サイクルの日数	7

Day1-2

1	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリンジ	1 筒
	デキサート注射液 3. 3 m g (*デカトロン)	1 A
	大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L	1 キット
	点滴（速度指定） mL/h 【204mL/h】	
2	注射用エンドキサン 5 0 0 m g	60 mg/kg
	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【166.66mL/h】	
3	ウロミテキサン注 4 0 0 m g	3 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【124mL/h】	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	
5	ウロミテキサン注 4 0 0 m g	3 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【124mL/h】	
6	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリンジ	1 筒
	大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L	1 キット
	点滴（速度指定） mL/h 【202mL/h】	
7	ウロミテキサン注 4 0 0 m g	3 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【124mL/h】	

Day3-6

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	生理食塩液 5 0 m L	60 mg/kg

	点滴静注	500 ml/
3	ブスルファン（ブスルフェクス）	3.2m,g/kg
	生理食塩液 250 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 筒
	点滴静注	1 キット
4	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	

CY+TBI(造血幹細胞移植前処置)

がん腫	移植
1 サイクルの日数	2

Day1, 2

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	シクロホスファミド (エンドキサン)	60 mg/kg
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 ml
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	

CY 大量療法(造血幹細胞採取)

がん腫	移植
1 サイクルの日数	2

Day1-4

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	シクロホスファミド (エンドキサン)	2000 mg
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	

DA-EPOCH Level 1

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	エトポシド	50 mg/m ²
	ビンクリスチン (オンコビン)	0.4 mg/m ²
	ドキソルビシン	10 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day2, 3, 4

1	エトポシド	50 mg/m ²
	ビンクリスチン (オンコビン)	0.4 mg/m ²
	ドキソルビシン	10 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	

Day5

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
3	シクロホスファミド (エンドキサン)	750 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

PSL 60mg/m² (D1-5)

好中球減少：≧500→次コースで DoseUp (Level2 に)、<500 が 2 回まで→次回も同量

血小板 25000/μL が観察される場合：次のコースでは直前のコースのエトポシド、ドキソルビシン、エンドキサンを 20%減量する。

Drugs	Drug Doses per Dose Levels							
	-2	-1	1	2	3	4	5	6
Doxorubicin (mg/m ² /day)	10	10	10	12	14.4	17.3	20.7	24.8
Etoposide (mg/m ² /day)	50	50	50	60	72	86.4	103.7	124.4
Cyclophosphamide (mg/m ² /day)	480	600	750	900	1080	1296	1555	1866

DA-EPOCH Level 2

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	エトポシド	60 mg/m ²
	ビンクリスチン (オンコビン)	0.4 mg/m ²
	ドキソルビシン	12 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day2, 3, 4

1	エトポシド	60 mg/m ²
	ビンクリスチン (オンコビン)	0.4 mg/m ²
	ドキソルビシン	12 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	

Day5

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
3	シクロホスファミド (エンドキサン)	900 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

PSL 60mg/m² (D1-5)/21 日

好中球減少：≧500→次コースで DoseUp (Level3 に)、<500 が 2 回まで→次回も同量

血小板 25000/μL が観察される場合：次のコースでは直前のコースのエトポシド、ドキソルビシン、エンドキサンを 20%減量する。

Drugs	Drug Doses per Dose Levels							
	-2	-1	1	2	3	4	5	6
Doxorubicin (mg/m ² /day)	10	10	10	12	14.4	17.3	20.7	24.8
Etoposide (mg/m ² /day)	50	50	50	60	72	86.4	103.7	124.4
Cyclophosphamide (mg/m ² /day)	480	600	750	900	1080	1296	1555	1866

DA-EPOCH Level 3

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	
3	エトポシド	72 mg/m ²
	ビンクリスチン (オンコビン)	0.4 mg/m ²
	ドキソルビシン	14.4 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day2, 3, 4

1	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	
2	エトポシド	72 mg/m ²
	ビンクリスチン (オンコビン)	0.4 mg/m ²
	ドキソルビシン	14.4 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day5

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 100 mL	1 キツ
	点滴静注	
3	シクロホスファミド (エンドキサン)	1080 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

PSL 60mg/m² (D1-5)/21 日

好中球減少：≧500→次コースで DoseUp (Level4 に)、<500 が 2 回まで→次回も同量

血小板 25000/μL が観察される場合：次のコースでは直前のコースのエトポシド、ドキソルビシン、エンドキサンを 20%減量する。

Drugs	Drug Doses per Dose Levels							
	-2	-1	1	2	3	4	5	6
Doxorubicin (mg/m ² /day)	10	10	10	12	14.4	17.3	20.7	24.8
Etoposide (mg/m ² /day)	50	50	50	60	72	86.4	103.7	124.4
Cyclophosphamide (mg/m ² /day)	480	600	750	900	1080	1296	1555	1866

DA-EPOCH Level 4

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	エトポシド	86.4 mg/m ²
	ビンクリスチン（オンコビン）	0.4 mg/m ²
	ドキソルビシン	17.3 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	

Day2, 3, 4

1	エトポシド	86.4 mg/m ²
	ビンクリスチン（オンコビン）	0.4 mg/m ²
	ドキソルビシン	17.3 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	

Day5

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
3	シクロホスファミド（エンドキサン）	1296 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

PSL 60mg/m² (D1-5)/21 日

好中球減少：≧500→次コースで DoseUp (Level2 に)、<500 が 2 回まで→次回も同量

血小板 25000/μL が観察される場合：次のコースでは直前のコースのエトポシド、ドキソルビシン、エンドキサンを 20%減量する。

Drugs	Drug Doses per Dose Levels							
	-2	-1	1	2	3	4	5	6
Doxorubicin (mg/m ² /day)	10	10	10	12	14.4	17.3	20.7	24.8
Etoposide (mg/m ² /day)	50	50	50	60	72	86.4	103.7	124.4
Cyclophosphamide (mg/m ² /day)	480	600	750	900	1080	1296	1555	1866

DBd 療法（皮下） 1-3 コース目

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	21

Day1,8

1	ドラツムマブ（ダラキューロ）	1800mg（15mL）
	皮下注射（3～5 分）	
2	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 20 mL	0.8 mL
	皮下注射	

Day4,11

1	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 20 mL	0.8 mL
	皮下注射	

Day15

1	ドラツムマブ（ダラキューロ）	1800mg（15mL）
	皮下注射（3～5 分）	

デキサメタゾン（レナデックス）：20mg/body day2,4,5,9,11,12

ドラツムマブ初回投与の場合：輸血管理室（電話：3195）に ID と名前を伝える

DBd 療法（皮下） 4-8 コース目

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	ドラツムマブ（ダラキューロ）	1800mg（15mL）
	皮下注射（3～5 分）	
2	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 20 mL	0.8 mL
	皮下注射	

Day4,8,11

1	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 20 mL	0.8 mL
	皮下注射	

デキサメタゾン（レナデックス）：20mg/body day2,4,5,8,9,11,12

DBd 療法（皮下） 9 コース目以降

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	ドラツムマブ（ダラキューロ）	1800mg（15mL）
	皮下注射（3～5 分）	

DCd 療法 1 コース目

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1

1	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6. 6 m g	3 瓶
	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	アセトアミノフェン 1 0 0 0 m g	1 袋
	点滴静注	
3	カルフィルゾミブ (カイプロリス)	20 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	1 A
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
4	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
5	ドラツムマブ (ドラザレックス)	8 mg/kg
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
6	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day 2

1	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6. 6 m g	3 瓶
	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	アセトアミノフェン 1 0 0 0 m g	1 袋
	点滴静注	
3	カルフィルゾミブ (カイプロリス)	20 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	1 A
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット

	カルフィルゾミブ（カイプロリス）	
4	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
5	ドラツムマブ（ドラザレックス）	8 mg/kg
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
6	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day8

1	5%ブドウ糖液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6.6 mg	3 瓶
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	アセトアミノフェン 1000 mg	1 袋
	点滴静注	
3	カルフィルゾミブ（カイプロリス）	56 mg/m ²
	注射用水 100 mL	1 瓶
	5%ブドウ糖液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
4	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
5	ドラツムマブ（ドラザレックス）	16 mg/kg
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
6	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day9

1	5%ブドウ糖液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6.6 mg	3 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶

	点滴静注	
	カルフィルゾミブ（カイクロリス）	56 mg/m ²
3	注射用水 100 mL	1 瓶
	5%ブドウ糖液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day15

1	5%ブドウ糖液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6.6 mg	3 瓶
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	アセトアミノフェン 1000 mg	1 袋
	点滴静注	
3	カルフィルゾミブ（カイクロリス）	56 mg/m ²
	注射用水 100 mL	1 瓶
	5%ブドウ糖液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
4	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
5	ダラツムマブ（ダラザレックス）	16 mg/kg
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
6	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day16

1	5%ブドウ糖液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6.6 mg	3 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

	カルフィルゾミブ（カイプロリス）	56 mg/m ²
3	注射用水 100 mL	1 瓶
	5%ブドウ糖液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day22

1	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6.6 mg	3 瓶
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	アセトアミノフェン 1000 mg	1 袋
	点滴静注	
3	ドラツムマブ（ドラザレックス）	16 mg
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

ドラツムマブ初回投与の場合：輸血管理室（電話：3195）に ID と名前を伝える

DCd 療法 2 コース目

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1, 8, 15

1	5%ブドウ糖液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6. 6 mg	3 瓶
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	アセトアミノフェン 1000 mg	1 袋
	点滴静注	
3	カルフィルゾミブ (カイプロリス)	56 mg/m ²
	注射用水 100 mL	1 A
	5%ブドウ糖液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
4	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
5	ドラツムマブ (ドラザレックス)	16 mg/kg
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
6	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day 2, 9, 16

1	5%ブドウ糖液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6. 6 mg	3 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
	カルフィルゾミブ (カイプロリス)	56 mg/m ²
3	注射用水 100 mL	1 瓶
	5%ブドウ糖液 100 mL	1 キット
	点滴静注	

4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day22

1	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6.6 mg	3 瓶
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	アセトアミノフェン 1000 mg	1 袋
	点滴静注	
3	ドラツムマブ (ダラザレックス)	16 mg/kg
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
4	点滴 (全開)	

DCd 療法 3-6 コース目

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1, 15

1	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6. 6 m g	3 瓶
	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	アセトアミノフェン 1 0 0 0 m g	1 袋
	点滴静注	
3	カルフィルゾミブ (カイプロリス)	56 mg/m ²
	注射用水 1 0 0 m L	1 A
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
4	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
5	ドラツムマブ (ドラザレックス)	16 mg/kg
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
6	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day 2, 8, 9, 16

1	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6. 6 m g	3 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
	カルフィルゾミブ (カイプロリス)	56 mg/m ²
3	注射用水 1 0 0 m L	1 瓶
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	

4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

レナデックス 40mg(D22)

DCd 療法 7 コース目以降

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1

1	5%ブドウ糖液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6.6 mg	3 瓶
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	アセトアミノフェン 1000 mg	1 袋
	点滴静注	
3	カルフィルゾミブ (カイプロリス)	56 mg/m ²
	注射用水 100 mL	1 A
	5%ブドウ糖液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
4	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
5	ドラツムマブ (ドラザレックス)	16 mg/kg
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
6	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day 2, 8, 9, 15, 16

1	5%ブドウ糖液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6.6 mg	3 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
	カルフィルゾミブ (カイプロリス)	56 mg/m ²
3	注射用水 100 mL	1 瓶
	5%ブドウ糖液 100 mL	1 キット
	点滴静注	

4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

レナデックス 40mg(D22)

DCEP 療法

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	21 日（若年者）28 日（高齢者、骨髄抑制が高度）

Day1-4

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	グラニセトロン 1 m g	6 瓶
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	シクロホスファミド（エンドキサン）	400 mg/m ²
	エトポシド	40 mg/m ²
	シスプラチン	10 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

Day5

1	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

DeVIC

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	6 ㍻
	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	イホスファミド (イホマイド)	1.5 g/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 ㍺
	点滴静注	
3	メスナ 4 0 0 m g	1 A
	静注	
4	エトポシド	100 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 ㍺
	点滴静注	
5	カルボプラチン	300 mg/m ²
	5 %ブドウ糖液 2 5 0 m L	250 ㍺
	点滴静注	
6	メスナ 4 0 0 m g	1 A
	静注	
7	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍻
	点滴静注	
8	メスナ 4 0 0 m g	1 A
	静注	

Day2, 3

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	6 ㍻
	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	

2	イホスファミド（イホマイド）	1.5 g/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	
3	メスナ 400 mg	1 A
	静注	
4	エトポシド	100 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	
5	メスナ 400 mg	1 A
	静注	
6	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
7	メスナ 400 mg	1 A
	静注	

DLd 療法（皮下）1-2 コース目

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1, 8, 15, 22

1	ダラツムマブ（ダラキューロ）	1800 mg（15mL）
	皮下投与（3~5 分）	

アセトアミノフェン（カロナール）：800~1000mg/日 day1,8,15,22

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩（ポララミン）：2mg/日 day1,8,15,22

モンテルカスト 10mg：day1 に主治医判断で追加内服

レナリドミド（レブラミド）：day1-21

デキサメタゾン（レナデックス）：未治療あるいは再発・難治、年齢や全身状態により投与量・日数が異なる

ダラツムマブ初回投与の場合：輸血管理室（電話：3 1 9 5）に ID と名前を伝える

DLd 療法（皮下）3-6 コース目

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1, 15

1	ドラツムマブ（ダラキューロ）	1800 mg（15mL）
	皮下投与（3~5 分）	

アセトアミノフェン（カロナール）：800~1000mg/日 day1,15

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩（ポララミン）：2mg/日 day1,15

レナリドミド（レブラミド）：day1-21

デキサメタゾン（レナデックス）：未治療あるいは再発・難治、年齢や全身状態により投与量・日数が異なる

DLd 療法（皮下）7 コース目以降

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1

1	ドラツムマブ（ダラキューロ）	1800 mg（15mL）
	皮下投与（3~5 分）	

アセトアミノフェン（カロナール）：800~1000mg/日 day1,15

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩（ポララミン）：2mg/日 day1,15

レナリドミド（レブラミド）：day1-21

デキサメタゾン（レナデックス）：未治療あるいは再発・難治、年齢や全身状態により投与量・日数が異なる

DMPB 療法 1 コース目

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	42

Day1, 8, 22, 29

1	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6.6 mg	3 瓶
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	アセトアミノフェン 1000 mg	1 袋
	点滴静注	
3	ドラツムマブ (ダラザレックス)	16 mg/kg
	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 20 mL	0.8 mL
	皮下注射	

Day4, 25, 32

1	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 20 mL	0.8 mL
	皮下注射	

Day15, 36

1	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6.6 mg	3 瓶
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	アセトアミノフェン 1000 mg	1 袋
	点滴静注	
3	ドラツムマブ (ダラザレックス)	16 mg/kg
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

4	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

アルケラン 9mg/m² day1-4

プレドニゾン 60mg/m² day2-4

ダラツムマブ初回投与の場合：輸血管理室（電話：3 1 9 5）に ID と名前を伝える

DMPB 療法 1 コース目(分割投与)

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	42

Day1

1	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6.6 mg	3 瓶
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	アセトアミノフェン 1000 mg	1 袋
	点滴静注	
3	ドラツムマブ (ダラザレックス)	8 mg/kg
	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 20 mL	0.8 mL
	皮下注射	

Day2

1	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6.6 mg	3 瓶
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	アセトアミノフェン 1000 mg	1 袋
	点滴静注	
3	ドラツムマブ (ダラザレックス)	8 mg/kg
	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day4, 25, 32

1	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 20 mL	0.8 mL
	皮下注射	

Day8, 22, 29

1	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6.6 mg	3 瓶
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	アセトアミノフェン 1000 mg	1 袋
	点滴静注	
3	ドラツムマブ (ドラザレックス)	16 mg/kg
	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 20 mL	0.8 mL
	皮下注射	

Day15, 36

1	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6.6 mg	3 瓶
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	アセトアミノフェン 1000 mg	1 袋
	点滴静注	
3	ドラツムマブ (ドラザレックス)	16 mg/kg
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

アルケラン 9mg/m² day1-4プレドニゾロン 60mg/m² day2-4

DMPB 療法 2-9 コース目

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	42

Day1, 22

1	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6.6 mg	3 瓶
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	アセトアミノフェン 1000 mg	1 袋
	点滴静注	
3	ドラツムマブ (ダラザレックス)	16 mg/kg
	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 20 mL	0.8 mL
	皮下注射	

Day8, 29

1	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 20 mL	0.8 mL
	皮下注射	

アルケラン 9mg/m² day1-4プレドニゾン 60mg/m² day2-4

DMPB 療法 10 コース目以降

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	28

Day1, 22

1	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6. 6 m g	3 瓶
	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	アセトアミノフェン 1 0 0 0 m g	1 袋
	点滴静注	
3	ドラツムマブ (ドラザレックス)	16 mg/kg
	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

DCd 療法(皮下)1 コース目

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1

1	大塚糖液 5 % T N 1 0 0 m L	1 キット
	点滴（維持）	
2	デキサート注射液 6 . 6 m g (*デ'カ'ロン)	3 瓶
	ポララミン注 5 m g	1 A
	アセリオ静注液 1000mg バッグ／100mL	1 袋
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【428mL/h】	
3	カイプロリス点滴静注用 10mg	20 mg/㎡
	注射用水 2 0 m L	1 A
	大塚糖液 5 % T N 1 0 0 m L	1 キット
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【240mL/h】	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から静注	
5	ドラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL	1800 mg
	皮下注射	

Day2

1	大塚糖液 5 % T N 1 0 0 m L	1 キット
	点滴（維持）	
2	デキサート注射液 6 . 6 m g (*デ'カ'ロン)	3 瓶
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【224mL/h】	
3	カイプロリス点滴静注用 10mg	20 mg/㎡
	注射用水 2 0 m L	1 A
	大塚糖液 5 % T N 1 0 0 m L	1 キット
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【240mL/h】	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から静注	

Day8,15

1	大塚糖液 5 % T N 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴（維持）	
2	デキサート注射液 6 . 6 m g (*デ`カ`ロソ)	3 罎
	ポララミン注 5 m g	1 A
	アセリオ静注液 1000mg バッグ／100mL	1 袋
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【428mL/h】	
3	カイプロリス点滴静注用 10mg	56 mg/m ²
	注射用水 1 0 0 m L	1 罎
	大塚糖液 5 % T N 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【400mL/h】	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴の側管から静注	
5	ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL	1800 mg
	皮下注射	

Day9,16

1	大塚糖液 5 % T N 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴（維持）	
2	デキサート注射液 6 . 6 m g (*デ`カ`ロソ)	3 罎
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【224mL/h】	
3	カイプロリス点滴静注用 10mg	56 mg/m ²
	注射用水 1 0 0 m L	1 罎
	大塚糖液 5 % T N 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【400mL/h】	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴の側管から静注	

Day22

1	大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴（維持）	
2	デキサート注射液 6 . 6 m g (*デ`カ`ロソ)	6 罎
	ポララミン注 5 m g	1 A
	アセリオ静注液 1000mg バッグ／100mL	1 袋

	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【452mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から静注	
4	ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL	1800 mg
	皮下注射	

ダラキューロ：1800mg/body(D1,8,15,22)、カイプロリス：20mg/m² (D1,2), 56mg/m²(D8,9,15,16)、デキサメタゾン：19.8mg(D1,2,8,9,15,16)39.6mg(D22) / 28 日

ダラキューロ前投薬：主治医で判断でモンテルカスト 10mg 追加

ダラツムマブ初回投与の場合：輸血管理室（電話：3 1 9 5）に ID と名前を伝える

DCd 療法(皮下)2 コース目

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1

1	大塚糖液 5 % T N 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴（維持）	
2	デキサート注射液 6 . 6 m g (*デ'カ'ロン)	3 瓶
	ポララミン注 5 m g	1 A
	アセリオ静注液 1000mg バッグ／100mL	1 袋
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【428mL/h】	
3	カイプロリス点滴静注用 10mg	56 mg/ m ²
	注射用水 1 0 0 m L	1 瓶
	大塚糖液 5 % T N 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【400mL/h】	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から静注	
5	ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL	1800 mg
	皮下注射	

Day2

1	大塚糖液 5 % T N 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴（維持）	
2	デキサート注射液 6 . 6 m g (*デ'カ'ロン)	3 瓶
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【224mL/h】	
3	カイプロリス点滴静注用 10mg	56 mg/ m ²
	注射用水 1 0 0 m L	1 瓶
	大塚糖液 5 % T N 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【400mL/h】	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から静注	

Day8,15

1	大塚糖液 5 % T N 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴（維持）	
2	デキサート注射液 6 . 6 m g (*デ`カ`ロソ)	3 罎
	ポララミン注 5 m g	1 A
	アセリオ静注液 1000mg バッグ／100mL	1 袋
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【428mL/h】	
3	カイプロリス点滴静注用 10mg	56 mg/m ²
	注射用水 1 0 0 m L	1 罎
	大塚糖液 5 % T N 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【400mL/h】	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴の側管から静注	
5	ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL	1800 mg
	皮下注射	

Day9,16

1	大塚糖液 5 % T N 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴（維持）	
2	デキサート注射液 6 . 6 m g (*デ`カ`ロソ)	3 罎
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【224mL/h】	
3	カイプロリス点滴静注用 10mg	56 mg/m ²
	注射用水 1 0 0 m L	1 罎
	大塚糖液 5 % T N 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【400mL/h】	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴の側管から静注	

Day22

1	大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴（維持）	
2	デキサート注射液 6 . 6 m g (*デ`カ`ロソ)	6 罎
	ポララミン注 5 m g	1 A
	アセリオ静注液 1000mg バッグ／100mL	1 袋

	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【452mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から静注	
4	ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL	1800 mg
	皮下注射	

ダラキューロ：1800mg/body(D1,8,15,22)、カイプロリス：56mg/m²(D1,2,8,9,15,16)、デキサメタゾン：

19.8mg(D1,2,8,9,15,16),39.6mg(D22) / 28 日

ダラキューロ前投薬：主治医で判断でモンテルカスト 10mg 追加

DCd 療法(皮下)3-6 コース目

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1,15

1	大塚糖液 5 % T N 1 0 0 m L	1 キット
	点滴（維持）	
2	デキサート注射液 6 . 6 m g (*デ'カ'ロン)	3 瓶
	ポララミン注 5 m g	1 A
	アセリオ静注液 1000mg バッグ／100mL	1 袋
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【428mL/h】	
3	カイプロリス点滴静注用 10mg	56 mg/ m ²
	注射用水 1 0 0 m L	1 瓶
	大塚糖液 5 % T N 1 0 0 m L	1 キット
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【400mL/h】	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から静注	
5	ドラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL	1800 mg
	皮下注射	

Day2,8,9,16

1	大塚糖液 5 % T N 1 0 0 m L	1 キット
	点滴（維持）	
2	デキサート注射液 6 . 6 m g (*デ'カ'ロン)	3 瓶
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【224mL/h】	
3	カイプロリス点滴静注用 10mg	56 mg/ m ²
	注射用水 1 0 0 m L	1 瓶
	大塚糖液 5 % T N 1 0 0 m L	1 キット
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【400mL/h】	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から静注	

ダラキエーロ：1800mg/body(D1,15)、カイプロリス：56mg/m²(D1,2,8,9,15,16)、デキサメタゾン：
19.8mg(D1,2,8,9,15,16)、レナデックス 40mg(D22) / 28 日
ダラキエーロ前投薬：主治医で判断でモンテルカスト 10mg 追加

DCd 療法(皮下)7 コース目以降

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1

1	大塚糖液 5 % T N 1 0 0 m L	1 キット
	点滴（維持）	
2	デキサート注射液 6 . 6 m g (*デ'カ'ロン)	3 瓶
	ポララミン注 5 m g	1 A
	アセリオ静注液 1000mg バッグ／100mL	1 袋
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【428mL/h】	
3	カイプロリス点滴静注用 10mg	56 mg/ m ²
	注射用水 1 0 0 m L	1 瓶
	大塚糖液 5 % T N 1 0 0 m L	1 キット
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【400mL/h】	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から静注	
5	ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL	1800 mg
	皮下注射	

Day2,8,9,15,16

1	大塚糖液 5 % T N 1 0 0 m L	1 キット
	点滴（維持）	
2	デキサート注射液 6 . 6 m g (*デ'カ'ロン)	3 瓶
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【224mL/h】	
3	カイプロリス点滴静注用 10mg	56 mg/ m ²
	注射用水 1 0 0 m L	1 瓶
	大塚糖液 5 % T N 1 0 0 m L	1 キット
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【400mL/h】	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から静注	

ダラキエロ：1800mg/body(D1)、カイプロリス：56mg/m²(D1,2,8,9,15,16)、デキサメタゾン：
19.8mg(D1,2,8,9,15,16)、レナデックス 40mg(D22) / 28 日
ダラキエロ前投薬：主治医で判断でモンテルカスト 10mg 追加

DMPB 療法（皮下）1 コース目

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	42

Day1,8,22,29

1	ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL	1800 mg
	皮下注射	
2	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 20 mL	0.8 mL
	皮下注射	

Day4,11,25,32

1	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 20 mL	0.8 mL
	皮下注射	

Day15,36

1	ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL	1800 mg
	皮下注射	

2 コース目はレジメン変更

ダラキューロ 1800mg/body (D1, 8, 15, 22, 29, 36)、ボルテゾミブ 1.3mg/m²(D1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32)、アルケラン
PO9mg/m² day1-4、プレドニソン 60mg/m² day2-4

ダラキューロ前投薬：加ナール 800mg、ホララミン 2mg、レナデックス 20mg、主治医判断で Day1 モンテルカスト 10mg 追加

ダラツムマブ初回投与の場合：輸血管理室（電話：3195）に ID と名前を伝える

DMPB 療法（皮下）2-9 コース目

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	42

Day1,22

1	ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL	1800 mg
	皮下注射	
2	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 20 mL	1.2 mL
	皮下注射	

Day8,29

1	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 20 mL	1.2 mL
	皮下注射	

10 コース目はレジメン変更

ダラキューロ 1800mg/body (D1,22)、ボルテゾミブ 1.3mg/m²(D1,8,22,29)、アルケラン 9mg/m² day1-4、プレドニソ 60mg/m² day2-4

ダラキューロ前投薬：コナール 800mg、ホフラミン 2mg、レナデックス 20mg

DMPB 療法（皮下）10 コース目以降

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1

1	ダラキューロ 配合皮下注 1800mg/15mL	1800 mg
	皮下注射	

ダラキューロ 1800mg/body : D1

ダラキューロ前投薬：カロナール 800mg、ホララミン 2mg、レナデックス 20mg

Epcoritamab 1 コース目

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	28

Day1

1	エプキンリ皮下注	0.16mg
	皮下注射	

Day8

1	エプキンリ皮下注	0.8mg
	皮下注射	

Day15,22

1	エプキンリ皮下注	48mg
	皮下注射	

前投薬：プレドニン 100mg、カロナール 650-1000mg、ホウラミン 2mg

2コース目から別レジメン

Epcoritamab 2-3 コース目

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	28

Day1、8、15、22

1	エプキンリ皮下注	48mg
	皮下注射	

前投薬： 1 コース目で G2 以上の CRS が発現した場合、プレドニン 100mg（投与日－3 日後まで継続）

4 コース目から別レジメン

Epcoritamab 4-9 コース目

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	28

Day1、15

1	エプキンリ皮下注	48mg
	皮下注射	

前コースで G2 以上の CRS が発現した場合、プレドニン 100mg（投与日－3 日後まで継続）

10 コース目から別レジメン

Epcoritamab 10 コース目以降

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	28

Day1

1	エプキンリ皮下注	48mg
	皮下注射	

前コースで G2 以上の CRS が発現した場合、プレドニン 100mg（投与日－3 日後まで継続）

EPd(50kg 未満 1 コース目)

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1,8,15,22

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	ファモチジン 2 0 m g	1 A
	アセトアミノフェン	500 mg
	点滴静注	
2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	エロツズマブ (エムプリシティ)	10 mg/kg
	生理食塩液 2 5 0 m L	150 ml/
	注射用水 2 0 m L	2 A
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

デキサメサゾン 28mg (75 歳以上は 8mg) (d0,7,14,21 の眠前)

ポマリドミド 4mg/日 (Day1-21)

EPd(50kg 未満 2 コース目)

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1,8,15,22

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 兪
	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	ファモチジン 2 0 m g	1 A
	アセトアミノフェン	500 mg
	点滴静注	
2	生理食塩液 5 0 m L	1 兪
	点滴静注	
3	エロツズマブ (エムプリシティ)	10 mg/kg
	生理食塩液 2 5 0 m L	150 ml/
	注射用水 2 0 m L	2 A
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 兪
	点滴静注	

デキサメサゾン 28mg (75 歳以上は 8mg) (d0,7,14,21 の眠前)

ポマリドミド 4mg/日 (Day1-21)

EPd(50kg 未満 3 コース目)

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	ファモチジン 2 0 m g	1 A
	アセトアミノフェン	500 mg
	点滴静注	
2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	エロツズマブ (エムプリシティ)	20 mg/kg
	生理食塩液 2 5 0 m L	150 ml
	注射用水 1 0 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

デキサメサゾン 28mg(75 歳以上 8mg) (d0 の眠前)

デキサメサゾン 40mg(75 歳以上 20mg) (d7,14,21 の眠前)

ポマリドミド 4mg/日 (Day1-21)

EPd(50kg 未満 4 コース目)

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	ファモチジン 2 0 m g	1 A
	アセトアミノフェン	500 mg
	点滴静注	
2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	エロツズマブ (エムプリシティ)	20 mg/kg
	生理食塩液 2 5 0 m L	150 ml
	注射用水 1 0 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

デキサメサゾン 28mg(75 歳以上 8mg) (d0 の眠前)

デキサメサゾン 40mg(75 歳以上 20mg) (d7,14,21 の眠前)

ポマリドミド 4mg/日 (Day1-21)

EPd(50-90kg 1コース目)

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1,8,15,22

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	ファモチジン 2 0 m g	1 A
	アセトアミノフェン	1000 mg
	点滴静注	
2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	エロツズマブ (エムプリシティ)	10 mg/kg
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	注射用水 2 0 m L	2 A
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

デキサメサゾン 28mg (75 歳以上は 8mg) (d0,7,14,21 の眠前)

ポマリドミド 4mg/日 (Day1-21)

EPd(50-90kg 2コース目)

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1,8,15,22

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	ファモチジン 2 0 m g	1 A
	アセトアミノフェン	1000 mg
	点滴静注	
2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	エロツズマブ (エムプリシティ)	10 mg/kg
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	注射用水 2 0 m L	2 A
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

デキサメサゾン 28mg (75 歳以上は 8mg) (d0,7,14,21 の眠前)

ポマリドミド 4mg/日 (Day1-21)

EPd(50-90kg 3コース目)

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	ファモチジン 2 0 m g	1 A
	アセトアミノフェン	1000 mg
	点滴静注	
2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	エロツズマブ (エムプリシティ)	20 mg/kg
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	注射用水 1 0 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

デキサメサゾン 28mg(75 歳以上 8mg) (d0 の眠前)

デキサメサゾン 40mg(75 歳以上 20mg) (d7,14,21 の眠前)

ポマリドミド 4mg/日 (Day1-21)

EPd(50-90kg 4コース目)

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	ファモチジン 2 0 m g	1 A
	アセトアミノフェン	1000 mg
	点滴静注	
2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	エロツズマブ (エムプリシティ)	20 mg/kg
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	注射用水 1 0 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

デキサメサゾン 28mg(75 歳以上 8mg) (d0 の眠前)

デキサメサゾン 40mg(75 歳以上 20mg) (d7,14,21 の眠前)

ポマリドミド 4mg/日 (Day1-21)

EPd(90kg 超 1 コース目)

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1,8,15,22

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	ファモチジン 2 0 m g	1 A
	アセトアミノフェン	1000 mg
	点滴静注	
2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	エロツズマブ (エムプリシティ)	10 mg/kg
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 瓶
	注射用水 1 0 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

デキサメサゾン 28mg (75 歳以上は 8mg) (d0,7,14,21 の眠前)

ポマリドミド 4mg/日 (Day1-21)

EPd(90kg 超 2 コース目)

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1,8,15,22

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	ファモチジン 2 0 m g	1 A
	アセトアミノフェン	1000 mg
	点滴静注	
2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	エロツズマブ (エムプリシティ)	10 mg/kg
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 瓶
	注射用水 1 0 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

デキサメサゾン 28mg (75 歳以上は 8mg) (d0,7,14,21 の眠前)

ポマリドミド 4mg/日 (Day1-21)

EPd(90kg 超 3 コース目)

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	ファモチジン 2 0 m g	1 A
	アセトアミノフェン	1000 mg
	点滴静注	
2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	エロツズマブ (エムプリシティ)	20 mg/kg
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 瓶
	注射用水 1 0 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

デキサメサゾン 28mg(75 歳以上 8mg) (d0 の眠前)

デキサメサゾン 40mg(75 歳以上 20mg) (d7,14,21 の眠前)

ポマリドミド 4mg/日 (Day1-21)

EPd(90kg 超 4 コース目)

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	ファモチジン 2 0 m g	1 A
	アセトアミノフェン	1000 mg
	点滴静注	
2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	エロツズマブ (エムプリシティ)	20 mg/kg
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 瓶
	注射用水 1 0 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

デキサメサゾン 28mg(75 歳以上 8mg) (d0 の眠前)

デキサメサゾン 40mg(75 歳以上 20mg) (d7,14,21 の眠前)

ポマリドミド 4mg/日 (Day1-21)

EPOCH

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1, 2, 3, 4

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	エトポシド	50 mg/m ²
	ビンクリスチン (オンコビン)	0.4 mg/m ²
	ドキソルビシン	10 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

Day5

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	シクロホスファミド (エンドキサン)	750 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

プレドニゾン：60mg/m² (day1-5)

escalated BEACOPP

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍻
	点滴静注	
2	エトポシド	100 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 ㍻
	点滴静注	
3	ドキソルビシン	35 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	100 ㍻
	点滴静注	
4	シクロホスファミド (エンドキサン)	mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 ㍻
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍻
	点滴静注	
6	エトポシド	100 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 ㍻
	点滴静注	

Day2, 3

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍻
	点滴静注	
2	エトポシド	100 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 ㍻
	点滴静注	
3	エトポシド	100 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 ㍻
	点滴静注	

Day8

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.4 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	ブレオマイシン (ブレオ)	10 mg/m ²
	ヒドロコルチゾン 1 0 0 m g	100 mg
	生理食塩液 1 0 0 m L	100 mL
	点滴静注	

プレドニゾロン：40mg/m²(day1-14)

プロカルバジン：100mg/m²(day1-7)

FC 療法

がん腫	血液科その他
1 サイクルの日数	

Day1-3

1	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	フルダラビン (フルダラ)	25 mg/m ²
	注射用水 5 mL	1 A
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
4	シクロホスファミド (エンドキサン)	250 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

FluBu2

がん腫	移植
1 サイクルの日数	6

Day1, 2, 5, 6

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	フルダラビン (フルダラ)	30 mg/m ²
	注射用水 5 mL	1 A
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day3, 4

1	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 3.3 mg	1 A
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	フルダラビン (フルダラ)	30 mg/m ²
	注射用水 5 mL	1 A
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	ブスルファン (ブスルフェクス)	3.2 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
6	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	

FluBu4

がん腫	移植
1 サイクルの日数	6

Day1, 6

1	フルダラビン（フルダラ）	30 mg/m ²
	注射用水 5 m L	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day2-5

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	フルダラビン（フルダラ）	30 mg/m ²
	注射用水 5 m L	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	ブスルファン（ブスルフェクス）	3.2 mg/m ²
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
6	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	

FLU+BU4+MEL

がん腫	移植
1 サイクルの日数	6

Day1-4

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	フルダラビン (フルダラ)	30 mg/m ²
	注射用水 5 m L	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	ブスルファン (ブスルフェクス)	3.2 mg/kg
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
6	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	

Day5, 6

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	フルダラビン (フルダラ)	30 mg/m ²
	注射用水 5 m L	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	

3	メルファラン（アルケラン）	40 mg/m ²
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
6	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	

FLU+MEL+ATG(造血幹細胞移植前処置)

がん腫	移植
1 サイクルの日数	5

Day1

1	大塚生食注2ポート100mL	1 キット
	点滴（速度指定） mL/h【100mL/h】	
2	フルダラ静注用50mg	30 mg/m ²
	注射用水 5mL	1 A
	大塚生食注2ポート100mL	1 キット
	点滴（速度指定） mL/h【210mL/h】	
3	グラニセトロン静注液1mg/1mLシリンジ	1 筒
	点滴の側管から静注	
4	生理食塩液PL「フソー」 50mL	1 罎
	点滴（全開）	
5	ソル・メドロール静注用125mg	1 罎
	ポララミン注5mg	1 A
	生理食塩液PL「フソー」 50mL	1 罎
	点滴（速度指定） mL/h【102mL/h】	
6	サイモグロブリン（25）	2.5 mg/kg
	注射用水 100mL	1 罎
	テルモ生食 500mL	1 袋
	点滴（速度指定） mL/h【30mL/h】	
7	生理食塩液PL「フソー」 50mL	1 罎
	点滴（全開）	

Day2

1	生理食塩液PL「フソー」 50mL	1 罎
	点滴（全開）	
2	グラニセトロン静注液1mg/1mLシリンジ	1 筒
	点滴の側管から静注	
3	フルダラ静注用50mg	30 mg/m ²

	注射用水 5 m L	1 A
	大塚生食注2 ポート 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴（速度指定） mL/h 【210mL/h】	
4	ソル・メドロール静注用 1 2 5 m g	1 瓶
	ポララミン注 5 m g	1 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【102mL/h】	
5	サイモグロブリン（2 5）	2.5 mg/kg
	注射用水 1 0 0 m L	1 瓶
	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	点滴（速度指定） mL/h 【30mL/h】	
6	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	

Day3

1	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリジ	1 筒
	点滴の側管から静注	
2	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	
3	フルダラ静注用 5 0 m g	30 mg/m ²
	注射用水 5 m L	1 A
	大塚生食注2 ポート 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴（速度指定） mL/h 【210mL/h】	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	
5	アルケラン静注用 5 0 m g	70 mg/m ²
	大塚生食注2 ポート 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴（速度指定） mL/h 【228mL/h】	
6	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	

Day4

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	

2	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリンジ	1 筒
	点滴の側管から静注	
3	フルダラ静注用 5 0 m g	30 mg/m ²
	注射用水 5 m L	1 A
	大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L	1 キット
	点滴（速度指定） mL/h 【210mL/h】	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	
5	アルケラン静注用 5 0 m g	70 mg/m ²
	大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L	1 キット
	点滴（速度指定） mL/h 【228mL/h】	
6	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	

Day5

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	
2	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリンジ	1 筒
	点滴の側管から静注	
3	フルダラ静注用 5 0 m g	30 mg/m ²
	注射用水 5 m L	1 A
	大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L	1 キット
	点滴（速度指定） mL/h 【210mL/h】	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	

FM140(造血幹細胞移植前処置)

がん腫	移植
1 サイクルの日数	7

Day1-5

1	フルダラビン（フルダラ）	25 mg/m ²
	注射用水 5 m L	1 A
	生理食塩液 100 m L	1 キット
	点滴静注	

Day6, 7

1	メルファラン（アルケラン）	70 mg/m ²
	生理食塩液 100 m L	1 キット
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 m L	1 瓶
	点滴静注	

Ful+CY+TBI2Gy

がん腫	移植
1 サイクルの日数	3

Day1, 2

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	フルダラビン (フルダラ)	30 mg/m ²
	注射用水 5 m L	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day3

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	フルダラビン (フルダラ)	30 mg/m ²
	注射用水 5 m L	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	シクロホスファミド (エンドキサン)	2000 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
5	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	

Ful+Mel+TBI(造血幹細胞移植前処置)

がん腫	移植
1 サイクルの日数	7

Day1-5

1	フルダラビン (フルダラ)	25 mg/m ²
	注射用水 5 m L	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	

Day6, 7

1	メルファラン (アルケラン)	40 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

GCP 療法

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	6 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	10:00
2	ゲムシタビン	1000 mg/m ²
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	10:30
3	カルボプラチン	AUC5
	5 %ブドウ糖液 2 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	12:00

Day2, 3, 4

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	6 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	10:00

Day8

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	10:00
2	ゲムシタビン	1000 mg/m ²
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	10:30
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	12:00

アプレピタント併用

GDP 療法

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 100 mL	1 袋
	点滴静注	

Day 2

1	ソルデム 3 A 輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	硫酸Mg 補正液 1 mEq/mL 20 mL	1 A
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	6 瓶
	点滴静注	
5	5%ブドウ糖液 100 mL	1 キット
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²
	点滴静注	
6	生理食塩液 500 mL	500 mL
	シスプラチン	75 mg/m ²
	点滴静注	
7	15%マンニトールS注射液 300 mL	1 瓶
	点滴静注	
8	ソルデム 3 A 輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
9	フロセミド 20 mg	1 A
	静注	

10	ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
11	生理食塩液 1 0 m L	1 S
	静注	

Day3, 4, 5

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	6 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 1 0 m L	1 S
	静注	

Day9

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

GML200 Induction

がん腫	AML(急性骨髄性白血病) 高齢者
1 サイクルの日数	28

Day1-3, 8, 9, 11, 12

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	エノシタビン (サンラビン)	200 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	2 A
	5 %ブドウ糖液 2 5 0 m L	250 ml
	点滴静注	
3	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	40 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	100 ml
	点滴静注	

Day4-7, 10

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	エノシタビン (サンラビン)	200 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	2 A
	5 %ブドウ糖液 2 5 0 m L	250 ml

GML200 Consolidation1

がん腫	AML(急性骨髄性白血病) 高齢者
1 サイクルの日数	28

Day1-3

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	エノシタビン (サンラビン)	200 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	2 A
	5 %ブドウ糖液 2 5 0 m L	250 ml
	点滴静注	
3	ミトキサントロン (ノバントロン)	7 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	100 ml
	点滴静注	

Day4-5

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	エノシタビン (サンラビン)	200 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	2 A
	5 %ブドウ糖液 2 5 0 m L	250 ml
	点滴静注	

GML200 Consolidation2

がん腫	AML(急性骨髄性白血病) 高齢者
1 サイクルの日数	28

Day1, 2

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	30 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	100 mL
	点滴静注	
3	エノシタビン (サンラビン)	200 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	2 A
	5 %ブドウ糖液 2 5 0 m L	250 mL
	点滴静注	
4	エトポシド	100 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 mL
	点滴静注	

Day3

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	エノシタビン (サンラビン)	200 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	2 A
	5 %ブドウ糖液 2 5 0 m L	250 mL
	点滴静注	
3	エトポシド	100 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 mL
	点滴静注	

Day4, 5

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

2	エノシタビン（サンラビン）	200 mg/m ²
	注射用水 20 mL	2 A
	5 %ブドウ糖液 250 mL	250 mL
	点滴静注	

GML200 Consolidation3

がん腫	AML(急性骨髄性白血病) 高齢者
1 サイクルの日数	28

Day1-5

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	エノシタビン (サンラビン)	200 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	2 A
	5 %ブドウ糖液 2 5 0 m L	250 ml/
	点滴静注	
3	アクリルビシン (アクラシノン)	14 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	100 ml/
	点滴静注	

High-CHOP

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ソルデム 1 輸液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	ピンクリスチン (オンコビン)	1.5 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	
	点滴静注	
4	ドキソルビシン	75 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
5	シクロホスファミド (エンドキサン)	1500 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
6	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

プレドニゾロン：100mg/day (day1-5)

hyper CVAD

がん腫	血液科その他
1 サイクルの日数	21

Day1-3

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6. 6 m g	6 瓶
	生理食塩液 1 0 0 m L	100 ml
	点滴静注	
3	シクロホスファミド (エンドキサン)	300 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 ml
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
6	シクロホスファミド (エンドキサン)	300 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 ml
	点滴静注	

Day4

1	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	デキサメタゾン 6. 6 m g	6 瓶
	生理食塩液 1 0 0 m L	100 ml
	点滴静注	
4	ビンクリスチン (オンコビン)	1.4 mg/m ²

	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
6	ドキソルビシン	50 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	
7	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day5

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day11

1	デキサメタゾン 6.6 mg	6 瓶
	生理食塩液 100 mL	100 mL
	点滴静注	

ICE

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	グラニセトロン静注液 1 mg / 1 mL シリンジ	1 筒
	デキサート注射液 6. 6 mg (*デカドロン)	1 瓶
	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴 (速度指定) mL/h 【106mL/h】	
2	エトポシド点滴静注液 100mg/5mL「サント」(*ラステット)	100 mg/m ²
	テルモ生食 500 mL	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【336.66mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴 (全開)	

Day2

1	グラニセトロン静注液 1 mg / 1 mL シリンジ	1 筒
	デキサート注射液 6. 6 mg (*デカドロン)	1 瓶
	デキサート注射液 3. 3 mg (*デカドロン)	1 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴 (速度指定) mL/h 【108mL/h】	
2	カルボプラチン 50mg 「NK」 / 5 mL	AUC 5 mg
	ブドウ糖注 5 % 250 mL	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【167mL/h】	
3	エトポシド点滴静注液 100mg/5mL「サント」(*ラステット)	100 mg/m ²
	テルモ生食 500 mL	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【336.66mL/h】	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴 (全開)	
5	注射用イホマイド 1 g	5 g/m ²
	ウロミテキサン注 400 mg	5 g/m ²
	テルモ生食 500 mL	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【24.16mL/h】	

6	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	

Day3

1	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリンジ	1 筒
	デキサート注射液 6 . 6 m g （*デカトロン）	1 瓶
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【106mL/h】	
2	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	
4	エトポシド点滴静注液 100mg/5mL「サント」(*ラステット)	100 mg/m ²
	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【336.66mL/h】	
5	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	

ETP: 100mg/m²(D1-3), CBDCA:AUC=5(D2, max800mg), IFM: 5g/m²(D2), メサ: 5g/m²(D2) /3W

G-CSF: Day5～、アプレキタ併用

メサ: IFM とほぼ同量に修正されていることを確認する。(レジメンは 8000mg で作成)

iPAD

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	21

Day1, 4

1	ボルテゾミブ	1 mg/m ²
	生理食塩液 20 mL	0.8 mL
	皮下注射	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
3	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
4	ドキソルビシン	9 mg/m ²
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	

Day2, 3

1	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
3	ドキソルビシン	9 mg/m ²
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	

Day8, 11

1	ボルテゾミブ	1 mg/m ²
	生理食塩液 20 mL	0.8 mL
	皮下注射	

デキサメタゾン（レナデックス）：20mg 内服(day1,2,4,5,8,9,11,12)

Isa+Kd 療法 Cycle1

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1

1	大塚糖液 5 % プラボトル 1 0 0 m L	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【20mL/h】	化療①[23:31]
2	ポララミン注 5 m g	1 A
	ガスター注射液 2 0 m g / 2 m L	1 A
	アセリオ静注液 1000mg バッグ / 100mL	1000 mg
	デキサート注射液 3 . 3 m g （*デ`カ`ロソ）	6 A
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【218mL/h】	化療②[23:32]
3	サークリサ点滴静注 5 0 0 m g / 2 5 m L	10 mg/kg
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴の側管から点滴 mL/h 【25mL/h】	化療③[23:33]
4	大塚糖液 5 % プラボトル 1 0 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【1200mL/h】	化療④[23:34]
5	カイプロリス点滴静注用 10mg	20 mg/m2
	注射用水 2 0 m L	1 A
	大塚糖液 5 % プラボトル 1 0 0 m L	1 瓶
	化学療法 点滴の側管から点滴 mL/h 【240mL/h】	化療⑤[23:35]
6	大塚糖液 5 % プラボトル 1 0 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【1200mL/h】	化療⑥[23:36]

Day2

1	大塚糖液 5 % プラボトル 1 0 0 m L	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【20mL/h】	化療①[23:31]
2	デキサート注射液 3 . 3 m g （*デ`カ`ロソ）	6 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【224mL/h】	化療②[23:32]
3	大塚糖液 5 % プラボトル 1 0 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【1200mL/h】	化療③[23:33]

4	カイプロリス点滴静注用 10mg	20 mg/m ²
	注射用水 20 mL	1 A
	大塚糖液 5% プラボトル 100 mL	1 瓶
	化学療法 点滴の側管から点滴 mL/h 【240mL/h】	化療④[23:34]
5	大塚糖液 5% プラボトル 100 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【1200mL/h】	化療⑤[23:35]

Day8

1	大塚糖液 5% プラボトル 100 mL	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【20mL/h】	化療①[23:31]
2	ポララミン注 5 mg	1 A
	ガスター注射液 20 mg / 2 mL	1 A
	アセリオ静注液 1000mg バッグ / 100mL	1000 mg
	デキサート注射液 3.3 mg (*デ'カ'ロン)	6 A
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【218mL/h】	化療②[23:32]
3	サークリサ点滴静注 500 mg / 25 mL	10 mg/kg
	大塚生食注 250 mL	1 袋
	化学療法 点滴の側管から点滴 mL/h 【25mL/h】	化療③[23:33]
4	大塚糖液 5% プラボトル 100 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【1200mL/h】	化療④[23:34]
5	カイプロリス点滴静注用 10mg	56 mg/m ²
	注射用水 100 mL	1 瓶
	大塚糖液 5% プラボトル 100 mL	1 瓶
	化学療法 点滴の側管から点滴 mL/h 【400mL/h】	化療⑤[23:35]
6	大塚糖液 5% プラボトル 100 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【1200mL/h】	化療⑥[23:36]

Day9,16

1	大塚糖液 5% プラボトル 100 mL	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【20mL/h】	
2	デキサート注射液 3.3 mg (*デ'カ'ロン)	6 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【224mL/h】	
3	大塚糖液 5% プラボトル 100 mL	1 瓶

	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【1200mL/h】	
4	カイプロリス点滴静注用 10mg	56 mg/m ²
	注射用水 100 mL	1 瓶
	大塚糖液 5 % プラボトル 100 mL	1 瓶
	化学療法 点滴の側管から点滴 mL/h 【400mL/h】	
5	大塚糖液 5 % プラボトル 100 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【1200mL/h】	

Day15

1	大塚糖液 5 % プラボトル 100 mL	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【20mL/h】	化療①[23:31]
2	ポララミン注 5 mg	1 A
	ガスター注射液 20 mg / 2 mL	1 A
	アセリオ静注液 1000mg バッグ / 100mL	1000 mg
	デキサート注射液 3.3 mg (*デ'カ'ロ'ン)	6 A
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【218mL/h】	化療②[23:32]
3	サークリサ点滴静注 500 mg / 25 mL	10 mg/kg
	大塚生食注 250 mL	1 袋
	化学療法 点滴の側管から点滴 mL/h 【200mL/h】	化療③[23:33]
4	大塚糖液 5 % プラボトル 100 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【1200mL/h】	化療④[23:34]
5	カイプロリス点滴静注用 10mg	56 mg/m ²
	注射用水 100 mL	1 瓶
	大塚糖液 5 % プラボトル 100 mL	1 瓶
	化学療法 点滴の側管から点滴 mL/h 【400mL/h】	化療⑤[23:35]
6	大塚糖液 5 % プラボトル 100 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【1200mL/h】	化療⑥[23:36]

Day22

1	大塚糖液 5 % プラボトル 100 mL	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【20mL/h】	化療①[23:31]
2	ポララミン注 5 mg	1 A
	ガスター注射液 20 mg / 2 mL	1 A
	アセリオ静注液 1000mg バッグ / 100mL	1000 mg

	デキサート注射液 3. 3 mg (*デ'カ'ロン)	6 A
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【218mL/h】	化療②[23:32]
3	サークリサ点滴静注 5 0 0 mg / 2 5 mL	10 mg/kg
	大塚生食注 2 5 0 mL	1 袋
	化学療法 点滴の側管から点滴 mL/h 【200mL/h】	化療③[23:33]
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	化療④[23:34]

要処方：レナデックス(day23)

サークリサ: 10mg/kg(d1,8,15,22), カイ'ロ'リス: 20mg/m²(d1,2), 56mg/m²(d8,9,15,16), DEX 20mg/body

(d1,2,8,9,15,16,22,23(d23 のみ内服)) / 28d

サークリサ前投薬 ガ'スター: 腎障害時でも 20mg/回、アセリオ: 50kg 以上は 1000mg/回に増量可

点滴時間：米国を参考にした

DEX:投与量は適正使用が'ド'参照、サークリサ初回投与の場合：輸血管理室（電話：3 1 9 5）に ID と名前を伝える

カルフィルゾミブ及びデキサメタゾンとの併用 (IsaKd療法)

対象：2nd line以降の患者^{注)}

■ 前投薬 本剤投与開始15～60分前に、デキサメタゾン、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤及びH₂受容体拮抗剤を投与すること

デキサメタゾン	解熱鎮痛剤	抗ヒスタミン剤	H ₂ 受容体拮抗剤	
20mg 本剤又はカルフィルゾミブ 投与日に静脈内投与、及び その他の日に経口投与*	[試験時の例*] アセトアミノフェン 650～1,000mg 経口投与	[試験時の例*] ジフェンヒドラミン 25～50mg 静脈内又は経口投与**	シメチジン等 経口又は静脈内投与	*社内資料：国際共同第3相 (EFC15246/IKEMA) 試験 [承認時評価資料] **少なくとも最初の4回の投与は静脈内投与が 望ましい

■ 1サイクル目

1サイクル：28日間

Day	1	2	第1週	8	9	第2週	15	16	第3週	22	23	第4週
サークリサ (10mg/kg)												
カルフィルゾミブ (20mg [*] 又は56mg/m ²)	※	※										
デキサメタゾン (20mg)												

国際共同第3相 (EFC15246/IKEMA) 試験の治療スケジュール参照

カルフィルゾミブの用法及び用量：28日間を1サイクルとし、1、2、8、9、15、16日目に静脈内投与した。サイクル1の1、2日目は20mg/m²の用量を投与し、その後の投与は56mg/m²に増量した。

低用量デキサメタゾンの用法及び用量：週に2回 (各週の最初の2日間)、20mgを静脈内又は経口投与した。

■ 2サイクル目以降

Day	1	2	第1週	8	9	第2週	15	16	第3週	22	23	第4週
サークリサ (10mg/kg)												
カルフィルゾミブ (56mg/m ²)												
デキサメタゾン (20mg)												

Isa+Kd 療法 Cycle2-

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1,15

1	大塚糖液 5 % プラボトル 1 0 0 m L	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【20mL/h】	化療①[23:31]
2	ポララミン注 5 m g	1 A
	ガスター注射液 2 0 m g / 2 m L	1 A
	アセリオ静注液 1000mg バッグ / 100mL	1000 mg
	デキサート注射液 3 . 3 m g （*デ`カ`ロソ）	6 A
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【218mL/h】	化療②[23:32]
3	サークリサ点滴静注 5 0 0 m g / 2 5 m L	10 mg/kg
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴の側管から点滴 mL/h 【200mL/h】	化療③[23:33]
4	大塚糖液 5 % プラボトル 1 0 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【1200mL/h】	化療④[23:34]
5	カイプロリス点滴静注用 10mg	56 mg/m2
	注射用水 1 0 0 m L	1 瓶
	大塚糖液 5 % プラボトル 1 0 0 m L	1 瓶
	化学療法 点滴の側管から点滴 mL/h 【400mL/h】	化療⑤[23:35]
6	大塚糖液 5 % プラボトル 1 0 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【1200mL/h】	化療⑥[23:36]

Day2,8,9,16

1	大塚糖液 5 % プラボトル 1 0 0 m L	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【20mL/h】	化療①[23:31]
2	デキサート注射液 3 . 3 m g （*デ`カ`ロソ）	6 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【224mL/h】	化療②[23:32]
3	大塚糖液 5 % プラボトル 1 0 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【1200mL/h】	化療③[23:33]

4	カイプロリス点滴静注用 10mg	56 mg/m ²
	注射用水 100 mL	1 瓶
	大塚糖液 5% プラボトル 100 mL	1 瓶
	化学療法 点滴の側管から点滴 mL/h 【400mL/h】	化療④[23:34]
5	大塚糖液 5% プラボトル 100 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【1200mL/h】	化療⑤[23:35]

要処方：レナデックス(day22,23)

サークリサ: 10mg/kg(d1,15), カイプロリス: 56mg/m²(d1,2,8,9,15,16), DEX 20mg/body(d1,2,8,9,15,16,22,23(d22,23 は内服)) / 28d

サークリサ前投薬 ガスター: 腎障害時でも 20mg/回、アセリオ: 50kg 以上は 1000mg/回に増量可

点滴時間：米国を参考にした

カルフィルゾミブ及びデキサメタゾンとの併用 (IsaKd療法)

対象：2nd line以降の患者^{注)}

■ 前投薬 本剤投与開始15～60分前に、デキサメタゾン、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤及びH₂受容体拮抗剤を投与すること

デキサメタゾン	解熱鎮痛剤	抗ヒスタミン剤	H ₂ 受容体拮抗剤	
20mg 本剤又はカルフィルゾミブ 投与日に静脈内投与、及び その他の日に経口投与*	[治験時の例*] アセトアミノフェン 650～1,000mg 経口投与	[治験時の例*] ジフェンヒドラミン 25～50mg 静脈内又は経口投与**	シメチジン等 経口又は静脈内投与	*社内資料：国際共同第3相 (EFC15246/IKEMA) 試験 [承認時評価資料] **少なくとも最初の4回の投与は静脈内投与が 望ましい

■ 1サイクル目

1サイクル：28日間

Day	1	2	第1週	8	9	第2週	15	16	第3週	22	23	第4週
サークリサ (10mg/kg)												
カルフィルゾミブ (20mg [※] 又は56mg/m ²)	※	※										
デキサメタゾン (20mg)												

国際共同第3相 (EFC15246/IKEMA) 試験の治療スケジュール参照

カルフィルゾミブの用法及び用量：28日間を1サイクルとし、1、2、8、9、15、16日目に静脈内投与した。サイクル1の1、2日目は20mg/m²の用量を投与し、その後の投与は56mg/m²に増量した。

低用量デキサメタゾンの用法及び用量：週に2回 (各週の最初の2日間)、20mgを静脈内又は経口投与した。

■ 2サイクル目以降

Day	1	2	第1週	8	9	第2週	15	16	第3週	22	23	第4週
サークリサ (10mg/kg)												
カルフィルゾミブ (56mg/m ²)												
デキサメタゾン (20mg)												

Isa+Pd 療法（1 コース目）

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1, 8, 15, 22

1	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	ファモチジン 20 m g	1 A
	アセトアミノフェン	1000 mg
	デキサメタゾン 6. 6 m g	3 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 100 m L	1 キット
	点滴静注	
3	イサツキシマブ（サークリサ）	10 mg/kg
	生理食塩液 250 m L	1 袋
	点滴静注	

ボマリスト 4mg QD（Day1-21）

サークリサ初回投与の場合：輸血管理室（電話：3195）に ID と名前を伝える

Isa+Pd 療法（2 コース目以降）

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1, 15

1	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	ファモチジン 2 0 m g	1 A
	アセトアミノフェン	1000 mg
	デキサメタゾン 6 . 6 m g	3 瓶
	点滴静注	
3	イサツキシマブ（サークリサ）	10 mg/kg
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	点滴静注	

ボマリスト 4mg QD（Day1-21）

Kd 療法(56 週 2) (初回)

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1, 2

1	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	カルフィルゾミブ (カイプロリス)	20 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	1 A
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day8, 9, 15, 16

1	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	カルフィルゾミブ (カイプロリス)	56 mg/m ²
	注射用水 1 0 0 m L	1 瓶
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

デキサメサゾン (レナデックス) : 20mg (Day1,2,8,9,15,16,22,23)

Kd 療法(56 週 2) (2 コース目以降)

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1, 2, 8, 9, 15, 16

1	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	カルフィルゾミブ (カイプロリス)	56 mg/m ²
	注射用水 1 0 0 m L	1 瓶
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

デキサメサゾン (レナデックス) : 20mg (Day1,2,8,9,15,16,22,23)

Kd 療法(70 週 1 1 コース目)

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1

1	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	デキサメタゾン 6 . 6 m g	6 瓶
	点滴静注	
	カルフィルゾミブ (カイプロリス)	20 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	1 A
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day8,15

1	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	デキサメタゾン 6 . 6 m g	6 瓶
	点滴静注	
	カルフィルゾミブ (カイプロリス)	70 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	1 瓶
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

デキサメサゾン (レナデックス) : 20mg (Day22)

Kd 療法(70 週 1 2 コース目以降)

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1,8,15

1	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	デキサメタゾン 6 . 6 m g	6 瓶
	点滴静注	
	カルフィルゾミブ (カイプロリス)	70 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	1 瓶
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

デキサメサゾン (レナデックス) : 20mg (Day22)

KRd Cycle1

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	6 錠
	生理食塩液 5 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	カルフィルゾミブ (カイプロリス)	20 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	1 A
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 錠
	点滴静注	

Day2

1	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	カルフィルゾミブ (カイプロリス)	20 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	1 A
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 錠
	点滴静注	

Day8, 15

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	6 錠
	生理食塩液 5 0 m L	1 キット
	点滴静注	

2	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	カルフィルゾミブ (カイプロリス)	27 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	2 A
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day9, 16

1	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	カルフィルゾミブ (カイプロリス)	27 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	2 A
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day22

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	6 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 キット
	点滴静注	

レナリドミド (レブラミド) : 25mg/日(day1-21)

KRd Cycle2-12

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1, 8, 15

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	6 ㊦
	生理食塩液 5 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	カルフィルゾミブ (カイプロリス)	27 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	2 A
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 ㊦
	点滴静注	

Day2, 9, 16

1	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	カルフィルゾミブ (カイプロリス)	27 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	2 A
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 ㊦
	点滴静注	

Day22

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	6 ㊦
	生理食塩液 5 0 m L	1 キット
	点滴静注	

レナリドミド（レブラミド）：25mg/日(day1-21)

KRd Cycle13-

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1, 15

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	6 ㊦
	生理食塩液 5 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	カルフィルゾミブ (カイプロリス)	27 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	2 A
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 ㊦
	点滴静注	

Day2, 16

1	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	カルフィルゾミブ (カイプロリス)	27 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	2 A
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 ㊦
	点滴静注	

レナリドミド (レブラミド) : 25mg/日(day1-21)

LEED(造血幹細胞移植前処置)

がん腫	移植
1 サイクルの日数	4

Day1-3

1	生理食塩液 100 mL	6 ㍺
		1 筒
		1 キット
	点滴静注	
2	エトポシド	250 mg/m ²
	静注	
3	シクロホスファミド (エンドキサン)	60 mg/kg
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 20 mL	1 A
	静注	
5	生理食塩液 50 mL	1 ㍺
	点滴静注	
6	エトポシド	250 mg/m ²
	静注	
7	生理食塩液 20 mL	1 A
	静注	

Day4

1	デキサメタゾン 6.6 mg	6 ㍺
	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 ㍺
	点滴静注	
3	メルファラン (アルケラン)	130 mg/m ²
	生理食塩液 100 mL	1 キット

	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

L-PAM(造血幹細胞移植前処置)

がん腫	移植
1 サイクルの日数	2

Day1, 2

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	メルファラン (アルケラン)	100 mg/m ²
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

L-PAM+TBI(造血幹細胞移植前処置)

がん腫	移植
1 サイクルの日数	3

Day1-3

1	メルファラン (アルケラン)	60 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

MEC

がん腫	AML(急性骨髄性白血病)
1 サイクルの日数	30

Day1-3

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ミトキサントロン (ノバントロン)	8 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	シタラビン (キロサイド)	100 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
4	エトポシド	100 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

Day4, 5

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	シタラビン (キロサイド)	100 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	エトポシド	100 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

Day6, 7

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	シタラビン (キロサイド)	100 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋

	点滴静注	
--	------	--

MDS200 Induction A

がん腫	MDS(骨髄異形成症候群)
1 サイクルの日数	28

Day1-3

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	
4	シタラビン (キロサイド)	100 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	
5	イダルビシン (イダマイシン)	12 mg/m ²
	注射用水 20 mL	1 A
	生理食塩液 100 mL	100 mL
	点滴静注	

Day4-7

1	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	
2	シタラビン (キロサイド)	100 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	

Day8

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

60 歳以上は 80%、70 歳以上は 60%に減量

MDS200 Induction B

がん腫	MDS(骨髄異形成症候群)
1 サイクルの日数	28

Day1-4

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	シタラビン (キロサイド)	20 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	
3	アクリルピシン (アクリシノン)	14 mg/m ²
	生理食塩液 100 mL	100 mL
	点滴静注	
4	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	
5	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
6	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day5-14

1	シタラビン (キロサイド)	20 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	

Day15

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

MDS200 Consolidation 1

がん腫	MDS(骨髄異形成症候群)
1 サイクルの日数	28

Day1-3

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	シタラビン (キロサイド)	200 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	
3	ミトキサントロン (ノバントロン)	7 mg/m ²
	生理食塩液 100 mL	100 mL
	点滴静注	
4	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	
5	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
6	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day4, 5

1	シタラビン (キロサイド)	200 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	

Day6

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

MDS200 Consolidation 2

がん腫	MDS(骨髄異形成症候群)
1 サイクルの日数	28

Day1-3

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	50 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	100 mL
	点滴静注	
3	エノシタビン (サンラビン)	200 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	2 A
	5 %ブドウ糖液 2 5 0 m L	250 mL
	点滴静注	
4	エトポシド	100 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 mL
	点滴静注	

Day4, 5

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	エノシタビン (サンラビン)	200 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	2 A
	5 %ブドウ糖液 2 5 0 m L	250 mL
	点滴静注	
3	エトポシド	100 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 mL
	点滴静注	

Day6, 7

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

2	エノシタビン（サンラビン）	200 mg/m ²
	注射用水 20 mL	2 A
	5 %ブドウ糖液 250 mL	250 mL
	点滴静注	

メルカプトプリン：70mg/m² 分2(day1-7)

MDS200 Consolidation 3

がん腫	MDS(骨髄異形成症候群)
1 サイクルの日数	28

Day1-3

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	エノシタビン (サンラビン)	200 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	2 A
	5 %ブドウ糖液 2 5 0 m L	250 ml
	点滴静注	
3	アクリルビシン (アクラシノン)	14 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	100 ml
	点滴静注	

MDS200 Maintenance 1

がん腫	MDS(骨髄異形成症候群)
1 サイクルの日数	60

Day1, 4

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍻
	点滴静注	
2	エノシタビン (サンラビン)	170 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	2 A
	5 %ブドウ糖液 2 5 0 m L	250 ㍺
	点滴静注	
3	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	30 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	100 ㍺
	点滴静注	

Day2, 3, 5

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍻
	点滴静注	
2	エノシタビン (サンラビン)	170 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	2 A
	5 %ブドウ糖液 2 5 0 m L	250 ㍺
	点滴静注	

メルカプトプリン：70mg/m² 分 2(day1-7)

MDS200 Maintenance 2

がん腫	MDS(骨髄異形成症候群)
1 サイクルの日数	60

Day1, 2

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	エノシタビン (サンラビン)	170 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	2 A
	5 %ブドウ糖液 2 5 0 m L	250 ml
	点滴静注	
3	ミトキサントロン (ノバントロン)	5 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	100 ml
	点滴静注	

Day3-5

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	エノシタビン (サンラビン)	170 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	2 A
	5 %ブドウ糖液 2 5 0 m L	250 ml
	点滴静注	

MDS200 Maintenance 3

がん腫	MDS(骨髄異形成症候群)
1 サイクルの日数	60

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	エノシタビン (サンラビン)	170 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	2 A
	5 %ブドウ糖液 2 5 0 m L	250 ml/
	点滴静注	
3	ビンデシン (フィルデシン)	2 mg/m ²
	生理食塩液 2 0 m L	20 ml/
	静注	
4	エトポシド	80 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 ml/
	点滴静注	

Day2, 4

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	エノシタビン (サンラビン)	170 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	2 A
	5 %ブドウ糖液 2 5 0 m L	250 ml/
	点滴静注	

Day3, 5

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	エノシタビン (サンラビン)	170 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	2 A
	5 %ブドウ糖液 2 5 0 m L	250 ml/
	点滴静注	

3	エトポシド	80 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	

Day8

1	ビンデシン（フィルデシン）	2 mg/m ²
	生理食塩液 20 mL	20 mL
	静注	

MDS200 Maintenance 4

がん腫	MDS(骨髄異形成症候群)
1 サイクルの日数	60

Day1-4

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	
2	エノシタビン (サンラビン)	170 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	2 A
	5 %ブドウ糖液 2 5 0 m L	250 ㍺
	点滴静注	
3	アクリラルビシン (アクラシノン)	14 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	100 ㍺
	点滴静注	

Day5

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	
2	エノシタビン (サンラビン)	170 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	2 A
	5 %ブドウ糖液 2 5 0 m L	250 ㍺
	点滴静注	

メルカプトプリン：70mg/m² 分 2(day1-7)

MIT-COP

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2		
	ソルデム 1 輸液 5 0 0 m L	500 mL
	点滴静注	
3	ピンクリスチン (オンコビン)	1.4 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	ミトキサントロン (ノバントロン)	12 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	100 mL
	点滴静注	
5	シクロホスファミド (エンドキサン)	750 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 mL
	点滴静注	
6	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

プレドニゾロン：100mg/day あるいは 60mg/m²(day1-5)

MIT+ロイスタチン

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	28

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	クラドリビン (ロイスタチン)	5 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	ミトキサントロン (ノバントロン)	12 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	

Day2, 3

1	クラドリビン (ロイスタチン)	5 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

mLSG15

がん腫	血液科その他
1 サイクルの日数	28

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	ドキソルビシン	40 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	
4	シクロホスファミド (エンドキサン)	350 mg/m ²
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	点滴静注	
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day8

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	シタラビン (キロサイド)	30 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	
3	グラニセトロン 1 m g	60 mg
	生理食塩液 5 0 m L	1 キツ
	点滴静注	

Day15

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

2	ビンデシン（フィルデシン）	2.4 mg/m ²
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	エトポシド	100 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
4	カルボプラチン	250 mg/m ²
	5 %ブドウ糖液 2 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day16, 17

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	エトポシド	100 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

プレドニゾン：40mg/m²(day1,8,15-17)

MMPP

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	21

Day1, 2, 3, 4

1	ラニムスチン (サイメリン)	33 mg/m ²
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

メルファラン：4mg/m²プロカルバジン：66mg/m²プレドニゾロン：30mg/m²(day1-4)

MTX 大量療法

がん腫	血液科その他
1 サイクルの日数	14

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	メトトレキサート (メソトレキセート)	3500 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 mL
	点滴静注	

Day2

1	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	
2	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	
3	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	

Day3-6

1	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	
2	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	
3	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	
4	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	

MTX 大量療法+Ara-C大量療法

がん腫	血液科その他
1 サイクルの日数	21

Day1

1	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリジ	1 筒
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【102mL/h】	10:30
2	注射用メソトレキセート 5 m g	500 mg/m ²
	大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L	100 mL
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【400mL/h】	11:00
3	注射用メソトレキセート 5 m g	3000 mg/m ²
	テルモ生食 5 0 0 m L	300 mL
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【167mL/h】	11:15
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	14:15

Day2, 3

1	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリジ	1 筒
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【102mL/h】	10:30
2	ロイコボリン注 3 m g 1 m L	10 A
	静注	11:00
3	キロサイド N 注 1 g 5 0 m L	2000 mg/m ²
	テルモ生食 5 0 0 m L	300 mL
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【167mL/h】	11:00
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	14:00
5	ロイコボリン注 3 m g 1 m L	10 A
	静注	17:00
6	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリジ	1 筒
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶

	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【102mL/h】	22:30
7	キロサイドN注 1 g 50 mL	2000 mg/m ²
	テルモ生食 500 mL	300 mL
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【167mL/h】	23:00
8	ロイコボリン注 3 mg 1 mL	10 A
	静注	23:00

Pembrolizumab(200mg 3 週毎)

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴（全開）	化療①[23:31]
2	大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L	1 キット
	キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g 4 m L	200 mg
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【216mL/h】	化療②[23:32]
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴（全開）	化療③[23:33]

ペンブ ロス マブ :200mg/body(D1)/3W

Pembrolizumab(400mg 6 週毎)

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	42

Day1-5

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴（全開）	化療①[23:31]
2	大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L	1 キット
	キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g 4 m L	400 mg
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【216mL/h】	化療②[23:32]
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴（全開）	化療③[23:33]

Pembro: 400mg /6 週

Ph+ALL202 Induction A

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	28

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	
3	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	60 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	
4	シクロホスファミド (エンドキサン)	mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	

Day2, 3

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	
2	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	60 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	

Day8, 15, 22

1	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	

プレドニゾロン：60mg/m²(day1-21)

グリベック 600mg/body(day8-63)

Ph+ALL202 Induction B

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	28

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	
3	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	30 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	
4	シクロホスファミド (エンドキサン)	800 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	

Day2, 3

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	
2	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	30 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	

Day8, 15, 22

1	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	

Ph+ALL202 Consolidation 1

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	28

Day1

1	メチルプレドニゾロン 1 2 5 m g	50 mg
	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	メトトレキサート (メソトレキセート)	100 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	メトトレキサート (メソトレキセート)	900 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
4	メチルプレドニゾロン 1 2 5 m g	50 mg
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	

Day2, 3

1	メチルプレドニゾロン 1 2 5 m g	50 mg
	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	シタラビン (キロサイド)	2000 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	メチルプレドニゾロン 1 2 5 m g	50 mg
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
4	シタラビン (キロサイド)	2000 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

Ph+ALL202 Maintenance

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	28

Day1

1	ビンクリスチン（オンコビン）	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	

プレドニゾン：60mg/m²(day1-5)

グリベック 600mg/body(day1-28)

Ph+ALL208IMA Induction A

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	28

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 罍
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 罍
	点滴静注	
3	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	60 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	
4	シクロホスファミド (エンドキサン)	mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 罍
	点滴静注	

Day2, 3

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 罍
	点滴静注	
2	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	60 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	

Day8, 15, 22

1	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 罍
	点滴静注	

プレドニゾロン：60mg/m²(day1-21)

グリベック 600mg/body(day8-42)

Ph+ALL208IMA Induction B

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	28

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	
3	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	30 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	
4	シクロホスファミド (エンドキサン)	800 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	

Day2, 3

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	
2	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	30 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	

Day8, 15, 22

1	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	

プレドニゾロン：60mg/m²(day1-7)

グリベック 600mg/body(day8-42)

Ph+ALL208IMA Consolidation C1

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	28

Day1

1	メチルプレドニゾロン 125 mg	50 mg
	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	メトトレキサート (メソトレキセート)	100 mg/m ²
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
3	メトトレキサート (メソトレキセート)	900 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	メチルプレドニゾロン 125 mg	50 mg
	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	

Day2, 3

1	メチルプレドニゾロン 125 mg	50 mg
	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	シタラビン (キロサイド)	2000 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
3	メチルプレドニゾロン 125 mg	50 mg
	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
4	シタラビン (キロサイド)	2000 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋

	点滴静注	
--	------	--

グリベック 600mg/body(day4-21)

Ph+ALL208IMA Consolidation C2

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	28

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	60 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	
4	シクロホスファミド (エンドキサン)	mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

プレドニゾン：60mg/m²(day1-7)

グリベック 600mg/body(day2-21)

Ph+ALL208IMA Maintenance

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	28

Day1

1	ビンクリスチン（オンコビン）	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	

プレドニゾン：60mg/m²(day1-5)

グリベック 600mg/body(day1-28)

Ph+ALL213 強化地固め療法 A

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	31

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	
3	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	45 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	
4	シクロホスファミド (エンドキサン)	1200 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	

Day2,3

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	
2	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	45 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	

Day8,15,22

1	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg/m ²

	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

プレドニゾロン：60mg/m²(po,D1-21&tapering)

ダサチニブ：100mg(po D4-31)

Ph+ALL213 強化地固め療法 B

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	31

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	
3	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	30 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	
4	シクロホスファミド (エンドキサン)	900 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	

Day2,3

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	
2	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	30 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	

Day8,15,22

1	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg/m ²

	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

プレドニゾロン：45mg/m² (po,D1-21&tapering)

ダサチニブ：100mg(po D4-31)

Ph+ALL213 地固め療法 C1

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	28

Day1

1	メチルプレドニゾロン 125mg	50mg
	グラニセトロン 1mg	1筒
	生理食塩液 100mL	1キット
	点滴静注	
2	メトトレキサート (メソトレキセート)	100mg/m ²
	生理食塩液 100mL	1キット
	点滴静注	
3	メトトレキサート (メソトレキセート)	900mg/m ²
	生理食塩液 500mL	1袋
	点滴静注	
4	メチルプレドニゾロン 125mg	50mg
	グラニセトロン 1mg	1筒
	生理食塩液 100mL	1キット
	点滴静注	

Day2

1	メチルプレドニゾロン 125mg	50mg
	グラニセトロン 1mg	1筒
	生理食塩液 100mL	1キット
	点滴静注	
2	シタラビン (キロサイド)	2000mg/m ²
	生理食塩液 500mL	1袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 50mL	1瓶
	点滴静注	
4	メチルプレドニゾロン 125mg	50mg
	グラニセトロン 1mg	1筒
	生理食塩液 100mL	1キット
	点滴静注	

5	ロイコボリン 3 m g	5 A
	静注	
6	シタラビン (キロサイド)	2000 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

Day3

1	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ロイコボリン 3 m g	5 A
	静注	
3	メチルプレドニゾロン 1 2 5 m g	50 mg
	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
4	ロイコボリン 3 m g	5 A
	静注	
5	シタラビン (キロサイド)	2000 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
6	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
7	ロイコボリン 3 m g	5 A
	静注	
8	メチルプレドニゾロン 1 2 5 m g	50 mg
	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
9	ロイコボリン 3 m g	5 A
	静注	

10	シタラビン（キロサイド）	2000 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day4

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ロイコボリン 3 mg	5 A
	静注	
3	ロイコボリン 3 mg	5 A
	静注	
4	ロイコボリン 3 mg	5 A
	静注	
5	ロイコボリン 3 mg	5 A
	静注	

Day5

1	ロイコボリン 3 mg	5 A
	静注	
2	ロイコボリン 3 mg	5 A
	静注	
3	ロイコボリン 3 mg	5 A
	静注	

ダサチニブ：100mg(po D4-24)

Ph+ALL213 地固め療法 C2

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	28

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	
3	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	45 mg
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	
4	シクロホスファミド (エンドキサン)	1200 mg
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	

プレドニゾン：60mg/m²(po,D1-7&tapering)

ダサチニブ：100mg(po,D2-22)

Ph+ALL213 維持療法

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	28

Day1

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

プレドニゾロン：60mg/m²(po,D1-7&tapering)

ダサチニブ：100mg(po,D1-28)

Pola-BR(ポート留置) 1 コース目

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	ヒト [®] ロコチゾ [®] リン酸エステル Na 静注液 100mg(*クレイトン)	1 A
	ポララミン注 5 m g	1 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【106mL/h】	
2	生理食塩液 2 0 m L	1 A
	投与前フラッシュ [®] レフィル [®]	
3	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	点滴 (維持)	
4	リツキマブ [®] BS 点滴静注 100mg「KHK」/10mL(*リツキサン)	375 mg/m ²
	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【25mL/h】	
5	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	
6	生理食塩液 2 0 m L	1 A
	投与後フラッシュ [®] レフィル [®]	

Day2

1	デキサート注射液 3. 3 m g (*デ [®] カ [®] ロン)	1 A
	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリンジ [®]	1 筒
	ポララミン注 5 m g	1 A
	アセリオ静注液 1000mg バッグ / 100mL	1 袋
	点滴 (速度指定) mL/h 【206mL/h】	
2	生理食塩液 2 0 m L	1 A
	投与前フラッシュ [®] レフィル [®]	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴 (全開)	
4	ポライビー点滴静注用 3 0 m g	1.8 mg/kg

	注射用水 20 mL	1 A
	大塚生食注2 ポート 100 mL	1 キツ
	点滴（速度指定） mL/h 【80mL/h】	
5	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 罎
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	
6	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 罎
	点滴（維持）	
7	トレアキシ点点滴静注用 100 mg	90 mg/m ²
	注射用水 100 mL	1 罎
	大塚生食注2 50 mL	1 袋
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【250mL/h】	
8	生理食塩液 20 mL	1 A
	投与後フラッシュアップ レフィルド	
9	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 罎
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	

Day3

1	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 罎
	点滴（維持）	
2	生理食塩液 20 mL	1 A
	投与前フラッシュアップ レフィルド	
3	デキサート注射液 3. 3 mg （*デカロン）	1 A
	グラニセトロン静注液 1 mg / 1 mL シリンジ	1 筒
	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 罎
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【104mL/h】	
4	トレアキシ点点滴静注用 100 mg	90 mg/m ²
	注射用水 100 mL	1 罎
	大塚生食注2 50 mL	1 袋
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【250mL/h】	
5	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 罎
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	

6	生理食塩液 20 mL	1 A
	投与後フラッシュアップ [®] レフィル [®]	

★ボライビー:72mg 未満の場合、希釈液を生食 50mL に変更（疑義照会不要）

Pola-BR(ポート留置) 2 コース目以降

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	デキサート注射液 3. 3 m g (*デ'カ'ロン)	1 A
	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリジ'	1 筒
	ポララミン注 5 m g	1 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【106mL/h】	
2	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴 (維持)	
3	生理食塩液 2 0 m L	1 A
	投与前フラッシュアップ レフィル'	
4	リツキシマブ BS 点滴静注 100mg「KHK」/10mL(*リツキサン)	375 mg/m ²
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【50mL/h】	
5	トレアキシシン点滴静注用 1 0 0 m g	90 mg/m ²
	注射用水 1 0 0 m L	1 罎
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【250mL/h】	
6	生理食塩液 2 0 m L	1 A
	投与後フラッシュアップ レフィル'	
7	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	

Day2

1	デキサート注射液 3. 3 m g (*デ'カ'ロン)	1 A
	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリジ'	1 筒
	ポララミン注 5 m g	1 A
	アセリオ静注液 1000mg バッグ / 100mL	1 袋
	点滴 (速度指定) mL/h 【206mL/h】	
2	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎

	点滴（全開）	
3	生理食塩液 20 mL	1 A
	投与前フラッシュアップレフィルド	
4	ポライビー点滴静注用 30 mg	1.8 mg/kg
	注射用水 20 mL	1 A
	大塚生食注2ポート 100 mL	1 キット
	点滴（速度指定） mL/h 【240mL/h】	
5	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴（維持）	
6	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	
7	トレアキシン点滴静注用 100 mg	90 mg/m ²
	注射用水 100 mL	1 瓶
	大塚生食注 2 50 mL	1 袋
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【250mL/h】	
8	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	
9	生理食塩液 20 mL	1 A
	投与後フラッシュアップレフィルド	

★ポライビー:72mg 未満の場合、希釈液を生食 50mL に変更（疑義照会不要）

Pola-BR(末梢) 1 コース目

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	ヒド [®] ロコチゾ [®] ソリン酸エステル Na 静注液 100mg(*クレイトン)	1 A
	ポララミン注 5 m g	1 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【106mL/h】	
2	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	点滴（維持）	
3	生理食塩液 2 0 m L	1 A
	投与前フラッシュアップ [®] レフィル [®]	
4	リツキマブ [®] BS 点滴静注 100mg「KHK」/10mL(*リツキサン)	375 mg/m ²
	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【25mL/h】	
5	生理食塩液 2 0 m L	1 A
	投与後フラッシュアップ [®] レフィル [®]	
6	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	

Day2

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 罎
	点滴（全開）	
2	デキサート注射液 3. 3 m g (*デ [®] カ [®] ロン)	1 A
	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリジ [®]	1 筒
	ポララミン注 5 m g	1 A
	アセリオ静注液 1000mg バッグ／100mL	1 袋
	点滴（速度指定） mL/h 【206mL/h】	
3	ポライビー点滴静注用 3 0 m g	1.8 mg/kg
	注射用水 2 0 m L	1 A
	大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L	1 キット
	点滴（速度指定） mL/h 【80mL/h】	

4	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 罎
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	
5	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 罎
	点滴（維持）	
6	トレアキシシン点滴静注用 100 mg	90 mg/m ²
	注射用水 100 mL	1 罎
	テルモ生食 500 mL	1 袋
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【250mL/h】	
7	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 罎
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	

Day3

1	デキサート注射液 3. 3 mg (*デカトロン)	1 A
	グラニセトロン静注液 1 mg / 1 mL シリンジ	1 筒
	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 罎
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【104mL/h】	
2	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 罎
	点滴（維持）	
3	生理食塩液 20 mL	1 A
	投与前フラッシュアップレフィルト	
4	トレアキシシン点滴静注用 100 mg	90 mg/m ²
	注射用水 100 mL	1 罎
	テルモ生食 500 mL	1 袋
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【250mL/h】	
5	生理食塩液 20 mL	1 A
	投与後フラッシュアップレフィルト	
6	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 罎
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	

★ポライビー:72mg 未満の場合、希釈液を生食 50mL に変更（疑義照会不要）

Pola-BR(末梢) 2 コース目以降

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（維持）	
	デキサート注射液 3. 3 m g （*デ'カ'ロン）	1 A
	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリジ	1 筒
	ポララミン注 5 m g	1 A
2	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【106mL/h】	
3	生理食塩液 2 0 m L	1 A
	投与前フラッシュアップレフィルド	
4	リツキシマブ BS 点滴静注 100mg「KHK」/10mL(*リツキサン)	375 mg/m ²
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【50mL/h】	
5	トレアキシシン点滴静注用 1 0 0 m g	90 mg/m ²
	注射用水 1 0 0 m L	1 瓶
	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【250mL/h】	
6	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から静注	

Day2

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	
2	デキサート注射液 3. 3 m g （*デ'カ'ロン）	1 A
	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリジ	1 筒
	ポララミン注 5 m g	1 A
	アセリオ静注液 1000mg バッグ／100mL	1 袋
	点滴（速度指定） mL/h 【206mL/h】	
3	ポライビー点滴静注用 3 0 m g	1.8 mg/kg

	注射用水 20 mL	1 A
	大塚生食注2ポート 100 mL	1 キット
	点滴（速度指定） mL/h 【240mL/h】	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	
5	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴（維持）	
6	トレアキシン点滴静注用 100 mg	90 mg/m ²
	注射用水 100 mL	1 瓶
	テルモ生食 500 mL	1 袋
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【250mL/h】	
7	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	

★ボライビー:72mg 未満の場合、希釈液を生食 50mL に変更（疑義照会不要）

POLA-CHP 初回

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	1

Day1-5

1	ヒド [®] ロコチゾ [®] ソリン酸エステル Na 静注液 100mg(*クレイトン)	1 A
	ポララミン注 5 m g	1 A
	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリジ [®]	1 筒
	アセリオ静注液 1000mg バッグ / 100mL	1000 mg
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【208mL/h】	
2	大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L	1 キット
	点滴（維持）	
3	ポライビー点滴静注用 3 0 m g	1.8 mg/kg
	注射用水 2 0 m L	1 A
	大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L	1 キット
	化学療法 点滴の側管から点滴（閉鎖式）mL/h 【80mL/h】	
4	ド [®] キルビ [®] シン塩酸塩注射用 10mg「NK」(*アド [®] リアシン)	50 mg/m ²
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	化学療法 点滴の側管から点滴（閉鎖式）mL/h 【200mL/h】	
5	注射用エンドキサン 5 0 0 m g	750 mg/m ²
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴の側管から点滴（閉鎖式）mL/h 【250mL/h】	
6	大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L	1 キット
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	

内服プレドニゾロン処方、リツキシマブ 併用必要

"Pola: 1.8mg/kg(D1), ADR:50mg/m²(D1), CPA:750mg/m²(D1), PSL100mg/day(or 60mg/m²)(D1-5),

Ritu:375mg/m² /3w (Ritu は別レジメン)

☐ 前後にリツキシマブレジメンの入力がある

ポライビー:72mg 未満の場合、希釈液を生食 50mL に変更（疑義照会不要）"

POLA-CHP2 回目以降

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	1

Day1-5

1	大塚生食注2 ポート 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴（維持）	
2	ヒト [®] ロコルチゾ [®] リン酸エステル Na 静注液 100mg(*クレイトン)	1 A
	ポララミン注 5 m g	1 A
	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリンジ	1 筒
	アセリオ静注液 1000mg バッグ／100mL	1000 mg
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【208mL/h】	
3	ポライビー点滴静注用 3 0 m g	1.8 mg/kg
	注射用水 2 0 m L	1 A
	大塚生食注2 ポート 1 0 0 m L	1 キツ
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【240mL/h】	
4	ト [®] キルビ [®] シン塩酸塩注射用 10mg「NK」(*アド [®] リアシン)	50 mg/m ²
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【200mL/h】	
5	注射用エンドキサン 5 0 0 m g	750 mg/m ²
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【250mL/h】	
6	大塚生食注2 ポート 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	

内服プレドニゾロン処方、リツキシマブ 併用必要

Pola: 1.8mg/kg(D1), ADR:50mg/m²(D1), CPA:750mg/m²(D1), PSL100mg/day(or 60mg/m²)(D1-5),

Ritu:375mg/m² /3w (Ritu は別レジメン)

☐ 前後にリツキシマブレジメンの入力がある

ポライビー:72mg 未満の場合、希釈液を生食 50mL に変更（疑義照会不要）

POLA-R-CHP2 回目以降

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1-5

1	ヒド [®] ロコチゾ [®] ソリン酸エステル Na 静注液 100mg(*クレイトン)	1 A
	ポララミン注 5 m g	1 A
	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリンジ	1 筒
	アセリオ静注液 1000mg バッグ / 100mL	1000 mg
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【208mL/h】	
2	大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L	1 キット
	点滴 (維持)	
3	リツキシマ [®] BS 点滴静注 100mg「KHK」/10mL(*リツキサン)	375 mg/m ²
	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴の側管から点滴 mL/h 【100mL/h】	
4	ポライビー点滴静注用 3 0 m g	1.8 mg/kg
	注射用水 2 0 m L	1 A
	大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L	1 キット
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【240mL/h】	
5	ト [®] キヨルビ [®] シン塩酸塩注射用 10mg「NK」(*アド [®] リアシン)	50 mg/m ²
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【200mL/h】	
6	注射用エンドキサン 5 0 0 m g	750 mg/m ²
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【250mL/h】	
7	大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L	1 キット
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	

内服[®] レド[®] ニゾ[®] の処方

Pola: 1.8mg/kg(D1), ADR:50mg/m²(D1), CPA:750mg/m²(D1), PSL100mg/day(or 60mg/m²)(D1-5),

Ritu:375mg/m²(D1) /3w

ポライビー:72mg 未満の場合、希釈液を生食 50mL に変更 (疑義照会不要)

PTCY FLU+BU2

がん腫	移植
1 サイクルの日数	∞

Day-6, -5

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	フルダラビン (フルダラ)	30 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	静注	

Day-4, -3

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	フルダラビン (フルダラ)	30 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	ブスルファン (ブスルフェクス)	3.2 mg/kg
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶

	点滴静注	
6	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	静注	

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	フルダラビン (フルダラ)	30 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	静注	

Day3, 4

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	シクロホスファミド (エンドキサン)	50 mg/kg
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	ウロミテキサン注 4 0 0 m g	3 A
	点滴の側管から静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
5	ウロミテキサン注 4 0 0 m g	3 A
	静注	
6	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	静注	

7	ウロミテキサン注 4 0 0 m g	3 A
	静注	

イーケプラ、アプレピタント (Day3-)併用

BU：300mg 以上 320mg 未満；溶媒 300ml にする。

BU：320mg 以上；溶媒 500ml から適宜破棄して、投与量の 10 倍量で希釈するようにする。

PTCY FLU+BU4（造血幹細胞移植前処置）

がん腫	移植
1 サイクルの日数	11

Day -6 ～ -3

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	フルダラビン（フルダラ）	30 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	ブスルファン（ブスルフェクス）	3.2 mg/kg
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
6	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	静注	

Day -2 ～ -1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	フルダラ静注用 5 0 m g	30 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶

	点滴（全開）	
4	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	静注	

Day 3～4

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	シクロホスファミド（エンドキサン）	50 mg/kg
	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	ウロミテキサン注 4 0 0 m g	3 A
	静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
5	ウロミテキサン注 4 0 0 m g	3 A
	静注	
6	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	静注	
7	ウロミテキサン注 4 0 0 m g	3 A
	静注	

BU：300mg 以上 320mg 未満；溶媒 300ml にする。

BU：320mg 以上；溶媒 500ml から適宜破棄して、投与量の 10 倍量で希釈するようにする。

血縁者間半合致末梢血造血幹細胞移植

PTCY FLU+TBI12Gy（造血幹細胞移植前処置）

がん腫	移植
1 サイクルの日数	11

Day -6 ～ -3

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	
2	フルダラビン（フルダラ）	30 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	

Day 3～4

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	
2	シクロホスファミド（エンドキサン）	50 mg/kg
	テルモ生食 5 0 0 m L	500mL
	点滴静注	
3	ウロミテキサン注 4 0 0 m g	3 A
	静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	
5	ウロミテキサン注 4 0 0 m g	3 A
	静注	
6	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	静注	
7	ウロミテキサン注 4 0 0 m g	3 A

	静注	
--	----	--

血縁者間半合致末梢血造血幹細胞移植

Day-3～-1 に TBI12Gy を併用する

移植片輸注時～day-2 まではステロイドを原則として使用しない

Day5～GVHD 予防としてタクロリムス 0.02-0.03mg/kg iv、ミコフェノール酸モフェチル 15mg/kgq8h po を併用する

R-CHOP

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	ヒドロコルチゾン 100 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	リツキシマブ	375 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	ビンクリスチン（オンコビン）	1.4 mg/m ²
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
6	ドキソルビシン	50 mg/m ²
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
7	シクロホスファミド（エンドキサン）	750 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
8	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

プレドニゾロン：100mg/day あるいは 60mg/m² day1-5

R-CODOX-M

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.5 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	シタラビン (クロサイド)	2 A
	水溶性プレドニン 2 0 m g	1 A
	生理食塩液 2 0 m L	1 mℓ
	髄注	
4	ドキソルビシン	40 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
5	シクロホスファミド (エンドキサン)	800 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
6	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day2

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	シクロホスファミド (エンドキサン)	200 mg/m ²
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day3

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	シクロホスファミド (エンドキサン)	200 mg/m ²
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	シタラビン (キロサイド)	2 A
	水溶性プレドニン 2 0 m g	1 A
	生理食塩液 2 0 m L	1 mL
	髄注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day4

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	シクロホスファミド (エンドキサン)	200 mg/m ²
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day5

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	シタラビン (キロサイド)	2 A
	水溶性プレドニン 2 0 m g	1 A
	生理食塩液 2 0 m L	1 mL
	髄注	
3	シクロホスファミド (エンドキサン)	200 mg/m ²
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	点滴静注	

4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day6

1	ヒドロコルチゾン 100 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	リツキシマブ	375 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day8

1	ビンクリスチン（オンコビン）	1.5 mg/m ²
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day10

1	メトトレキサート（メソトレキセート）	300 mg/m ²
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	メトトレキサート（メソトレキセート）	2700 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day11

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ロイコボリン 3 mg	10 A
	静注	

Day12

1	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	
2	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	
3	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	
4	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	
5	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	
6	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	

Day13, 14

1	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	
2	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	
3	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	
4	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	

Day15

1	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	
2	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	
3	メトトレキサート (メソトレキセート)	3 錠
	水溶性プレドニン 1 0 m g	1 A
	生理食塩液 2 0 m L	1 mℓ
	髄注	

4	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	
5	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	

Day17

1	メトトレキサート (メソトレキセート)	3 錠
	水溶性プレドニン 1 0 m g	1 A
	生理食塩液 2 0 m L	1 ml
	髄注	

[R-IVAC 療法](#)と交互に施行

R-COP

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	ヒドロコルチゾン 100 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	リツキシマブ	375 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	ビンクリスチン（オンコビン）	1.4 mg/m ²
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
6	シクロホスファミド（エンドキサン）	750 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
7	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

プレドニゾン：100mg/day あるいは 60mg/m² day1-5

R-IVAC

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	ヒドロコルチゾン 1 0 0 m g	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	シタラビン (キロサイド)	2000 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
	イホスファミド (イホマイド)	1.5 g/m ²
3	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
4	メスナ 4 0 0 m g	1 A
	静注	
5	エトポシド	60 mg/m ²
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	点滴静注	
6	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
7	メスナ 4 0 0 m g	1 A
	静注	
8	メスナ 4 0 0 m g	1 A
	静注	
9	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	ヒドロコルチゾン 1 0 0 m g	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	

10	シタラビン（キロサイド）	2000 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day2

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	ヒドロコルチゾン 100 mg	1 A
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
3	シタラビン（キロサイド）	2000 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	メスナ 400 mg	1 A
	静注	
5	イホスファミド（イホマイド）	1.5 g/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
	エトポシド	60 mg/m ²
6	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
7	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
8	メスナ 400 mg	1 A
	静注	
9	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	ヒドロコルチゾン 100 mg	1 A
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
10	メスナ 400 mg	1 A
	静注	

11	シタラビン（キロサイド）	2000 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day3

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	ヒドロコルチゾン 100 mg	1 A
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
3	イホスファミド（イホマイド）	1.5 g/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	メスナ 400 mg	1 A
	静注	
5	エトポシド	60 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
6	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
7	メスナ 400 mg	1 A
	静注	
8	メスナ 400 mg	1 A
	静注	

Day4

1	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	ヒドロコルチゾン 100 mg	1 A
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	イホスファミド（イホマイド）	1.5 g/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋

	点滴静注	
3	メスナ 400 mg	1 A
	静注	
4	エトポシド	60 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
6	メスナ 400 mg	1 A
	静注	
7	メスナ 400 mg	1 A
	静注	

Day5

1	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	ヒドロコルチゾン 100 mg	1 A
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	イホスファミド（イホマイド）	1.5 g/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
3	メスナ 400 mg	1 A
	静注	
4	メトトレキサート（メソトレキセート）	3 瓶
	水溶性プレドニン 10 mg	1 A
	生理食塩液 20 mL	1 瓶
	髄注	
5	エトポシド	60 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
6	生理食塩液 50 mL	1 瓶

	点滴静注	
7	メスナ 400 mg	1 A
	静注	
8	メスナ 400 mg	1 A
	静注	

Day6

7	ヒドロコルチゾン 100 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	リツキシマブ	375 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day7, 9

1	メトトレキサート（メソトレキセート）	3 錠
	水溶性プレドニン 10 mg	1 A
	生理食塩液 20 mL	1 mL
	髄注	

[R-CODOX-M 療法](#)と交互に施行

ROAD

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	6 ㍻
	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	100 ㍺
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.2 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍻
	点滴静注	
3	ラニムスチン (サイメリン)	40 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	100 ㍺
	点滴静注	

Day2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	6 ㍻
	生理食塩液 1 0 0 m L	100 ㍺
	点滴静注	

メルファラン：8mg/m²(day1-6)

R-MPV 療法

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	14

Day1

1	ヒドロコルチゾン 100 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	リツキシマブ	375 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day2

1	デキサメタゾン 3.3 mg	1 A
	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.4 mg/m ²
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	メトトレキサート (メソトレキセート)	3500 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day3

1	ロイコボリン 3 mg	10 A
	静注	
2	ロイコボリン 3 mg	10 A
	静注	
3	ロイコボリン 3 mg	10 A
	静注	

Day4, 5, 6, 7

1	ロイコボリン 3 mg	10 A
	静注	

2	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	
3	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	
4	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	

プロカルバジン 100mg/m² 7 日内服（奇数コース）

S-HAM

がん腫	AML(急性骨髄性白血病)
1 サイクルの日数	30

Day1, 2, 8, 9

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	シタラビン (キロサイド)	2000 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	シタラビン (キロサイド)	2000 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

Day3, 4, 10, 11

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ミトキサントロン (ノバントロン)	10 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	

SMILE

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	28

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	メトトレキサート (メソトレキセート)	2000 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

Day2, 3, 4

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	6 瓶
	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	イホスファミド (イホマイド)	1.5 g/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	メスナ 4 0 0 m g	2 A
	静注	
4	エトポシド	100 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
6	メスナ 4 0 0 m g	2 A
	静注	
7	ロイコボリン 3 m g	5 A
	静注	
8	メスナ 4 0 0 m g	2 A

	静注	
9	ロイコボリン 3 m g	5 A
	静注	

Day5

1	ロイコボリン 3 m g	5 A
	静注	
2	ロイコボリン 3 m g	5 A
	静注	

Day8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	L-アスパラギナーゼ (ロイナーゼ)	6000 U/m ²
	5 %ブドウ糖注 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

short term MTX

がん腫	移植
1 サイクルの日数	11

Day1

1	メトトレキサート（メソトレキセート）	15 mg/m ²
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day3, 6, 11

1	メトトレキサート（メソトレキセート）	10 mg/m ²
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

ドナー条件により減量を考慮すること

T-ALL-211-U HR3

がん腫	ALL
1 サイクルの日数	21

Day1

1	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリンジ	1 筒
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【51mL/h】	
2	キロサイドN注 1 g 5 0 m L	2000 mg/m ²
	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【200mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	
4	キロサイドN注 1 g 5 0 m L	2000 mg/m ²
	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【200mL/h】	
5	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	

Day2

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	
2	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリンジ	1 筒
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【51mL/h】	
3	キロサイドN注 1 g 5 0 m L	2000 mg/m ²
	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【200mL/h】	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	
5	キロサイドN注 1 g 5 0 m L	2000 mg/m ²
	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋

	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【200mL/h】	
6	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴 (全開)	

Day3

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴 (全開)	
2	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリジ	1 筒
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴 (速度指定) mL/h 【51mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴 (全開)	
4	エトポシド 点滴静注液 100mg/5mL「サント」(*ラステット)	100 mg/m ²
	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【252.5mL/h】	

Day4

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴 (全開)	
2	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリジ	1 筒
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴 (速度指定) mL/h 【51mL/h】	
3	エトポシド 点滴静注液 100mg/5mL「サント」(*ラステット)	100 mg/m ²
	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【252.5mL/h】	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴 (全開)	
5	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴 (全開)	
6	エトポシド 点滴静注液 100mg/5mL「サント」(*ラステット)	100 mg/m ²
	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【252.5mL/h】	

Day5

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	
2	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリンジ	1 筒
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【51mL/h】	
3	エト [®] シ [®] 点滴静注液 100mg/5mL「サント [®] 」(*ラステット)	100 mg/m ²
	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【252.5mL/h】	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	
5	エト [®] シ [®] 点滴静注液 100mg/5mL「サント [®] 」(*ラステット)	100 mg/m ²
	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【252.5mL/h】	

Day6

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	
2	ヒト [®] ロコチゾ [®] ソリン酸エステル Na 静注液 100mg(*クレイトン)	100 mg/m ²
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【52mL/h】	
3	ロイナーゼ注用 5 0 0 0 単位	25000 U/m ²
	ブドウ糖注射液 5 % 2 0 m L	1 A
	筋注	

Day11

1	ヒト [®] ロコチゾ [®] ソリン酸エステル Na 静注液 100mg(*クレイトン)	100 mg
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【52mL/h】	
2	ロイナーゼ注用 5 0 0 0 単位	25000 U/m ²
	ブドウ糖注射液 5 % 2 0 m L	1 A
	筋注	

"DEX: 20mg/m² po 分 3(Day1-5), AraC: 2000mg/m²(Day1-2), ETP: 100m/m²(Day3-5), L-ASP: 25000IU/m²(day6,11), 髄注(Day5)

DEX:注射の場合は変換係数 0.825 を掛けて注射剤投与量とする

NEL→T-ALL-211-U HR3→HR2→HR1→NEL→T-ALL-211-U HR3→HR2→HR1 で終了"

T-ALL-211-U HR2

がん腫	ALL
1 サイクルの日数	21

Day1

1	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリンジ	1 筒
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【102mL/h】	
2	注射用フィルデシン 3 m g	3 mg/m ²
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【100mL/h】	
3	注射用メソトレキセート 5 m g	500 mg/m ²
	大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L	70 mL
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【70mL/h】	
4	注射用メソトレキセート 5 m g	4500 mg/m ²
	テルモ生食 5 0 0 m L	300 mL
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【13.04mL/h】	

Day2

1	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリンジ	1 筒
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【102mL/h】	
2	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	
3	ウロミテキサン注 4 0 0 m g	1 A
	静注	
4	注射用イホマイド 1 g	0.8 g/m ²
	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【250mL/h】	
5	ロイコボリン注 3 m g 1 m L	30 mg
	静注	

Day3

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
---	-------------------------	-----

	点滴（全開）	
2	ロイコボリン注 3 m g 1 m L	30 mg
	静注	
3	ウロミテキサン注 4 0 0 m g	1 A
	静注	
4	ロイコボリン注 3 m g 1 m L	30 mg
	静注	
5	ウロミテキサン注 4 0 0 m g	1 A
	静注	
6	ロイコボリン注 3 m g 1 m L	30 mg
	静注	
7	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリジ [*]	1 筒
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【102mL/h】	
8	ロイコボリン注 3 m g 1 m L	30 mg
	静注	
9	注射用イホマイド 1 g	0.8 g/m ²
	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【250mL/h】	
10	ウロミテキサン注 4 0 0 m g	1 A
	静注	
11	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	
12	ウロミテキサン注 4 0 0 m g	1 A
	静注	
13	ロイコボリン注 3 m g 1 m L	30 mg
	静注	

14	ウロミテキサン注400mg	1A
	静注	
15	ウロミテキサン注400mg	1A
	静注	
16	ロイコボリン注3mg 1mL	30mg
	静注	
17	注射用イホマイド1g	0.8g/m ²
	テルモ生食 500mL	1袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h【250mL/h】	
18	生理食塩液PL「フソー」 50mL	1瓶
	点滴（全開）	

Day4

1	生理食塩液PL「フソー」 50mL	1瓶
	点滴（全開）	
2	ウロミテキサン注400mg	1A
	静注	
3	ロイコボリン注3mg 1mL	30mg
	静注	
4	ウロミテキサン注400mg	1A
	静注	
5	グラニセترون静注液1mg/1mLシリンジ	1筒
	生理食塩液PL「フソー」 50mL	1瓶
	点滴（速度指定） mL/h【102mL/h】	
6	注射用イホマイド1g	0.8g/m ²
	テルモ生食 500mL	1袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h【250mL/h】	
7	ロイコボリン注3mg 1mL	30mg
	静注	
8	ウロミテキサン注400mg	1A

	静注	
9	生理食塩液P L「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	
10	ウロミテキサン注4 0 0 m g	1 A
	静注	
11	ロイコボリン注3 m g 1 m L	30 mg
	静注	
12	ウロミテキサン注4 0 0 m g	1 A
	静注	
13	ウロミテキサン注4 0 0 m g	1 A
	静注	
14	注射用イホマイト1 g	0.8 g/m ²
	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【250mL/h】	
15	生理食塩液P L「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	
16	ロイコボリン注3 m g 1 m L	30 mg
	静注	

Day5

1	生理食塩液P L「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	
2	ウロミテキサン注4 0 0 m g	1 A
	静注	
3	ロイコボリン注3 m g 1 m L	30 mg
	静注	
4	ウロミテキサン注4 0 0 m g	1 A
	静注	
5	グラニセترون静注液1 m g / 1 m Lシシジ	1 筒

	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【102mL/h】	
6	ロイコボリン注 3 m g 1 m L	30 mg
	静注	
7	ダウノマイシン静注用 2 0 m g	30 mg/m ²
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【10.41mL/h】	
8	ロイコボリン注 3 m g 1 m L	30 mg
	静注	
9	ロイコボリン注 3 m g 1 m L	30 mg
	静注	

Day6

1	ロイコボリン注 3 m g 1 m L	30 mg
	静注	
2	注射用フィルデシン 3 m g	3 mg/m ²
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【100mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	
4	ロイコボリン注 3 m g 1 m L	30 mg
	静注	
5	ヒド'ロコチゾ'ンリン酸エステル Na 静注液 100mg(*クレイトン)	1 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【104mL/h】	
6	ロイナーゼ注用 5 0 0 0 単位	25000 U/m ²
	ブドウ糖注射液 5 % 2 0 m L	1 A
	化学療法 筋注	
7	ロイコボリン注 3 m g 1 m L	30 mg
	静注	

8	ロイコポリン注 3 m g 1 m L	30 mg
	静注	

Day11

1	ヒド'ロコルゾ'ンリン酸エステル Na 静注液 100mg(*クレイトン)	1 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【104mL/h】	
2	ロイナーゼ注用 5 0 0 0 単位	25000 U/m ²
	ブドウ糖注射液 5 % 2 0 m L	1 A
	化学療法 筋注	

"DEX: 20mg/m² po 分 3(Day1-5), VDS: 3mg/m²(max: 5mg) (Day1, 6), MTX: 0.5g/m²+4.5g/m²(Day1), IFM: 800mg/m²×2 (day2-4, day2 は 1 回のみ) , DNR: 30mg/2(day5), L-ASP: 25000U/m²(Day6,11), 髄注: Day1(CNS2or3 は Day5 に追加)

デキサメタゾンを処方 注射の場合は変換係数 0.825 を掛けて注射剤投与量とする

NEL→T-ALL-211-U HR3→HR2→HR1→NEL→T-ALL-211-U HR3→HR2→HR1 で終了

"

T-ALL-211-U HR1

がん腫	ALL
1 サイクルの日数	21

Day1

	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリンジ	1 筒
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【102mL/h】	
2	オンコビン注射用 1 m g	1.5 mg/m ² /m ²
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【100mL/h】	
3	注射用メソトレキセート 5 m g	500 mg
	大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L	70 mL
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【70mL/h】	
4	注射用メソトレキセート 5 m g	4500 mg/m ²
	テルモ生食 5 0 0 m L	300 mL
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【13.04mL/h】	

Day2

1	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリンジ	1 筒
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【102mL/h】	
2	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	
3	ロイコボリン注 3 m g 1 m L	30 mg
	静注	
4	注射用エンドキサン 5 0 0 m g	200 mg/m ²
	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【250mL/h】	

Day3

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	
2	ロイコボリン注 3 m g 1 m L	30 mg

	静注	
3	ロイコボリン注 3 m g 1 m L	30 mg
	静注	
4	ロイコボリン注 3 m g 1 m L	30 mg
	静注	
5	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリジ	1 筒
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【102mL/h】	
6	注射用エンドキサン 5 0 0 m g	200 mg/m ²
	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【250mL/h】	
7	ロイコボリン注 3 m g 1 m L	30 mg
	静注	
8	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	
9	ロイコボリン注 3 m g 1 m L	30 mg
	静注	
10	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	
11	ロイコボリン注 3 m g 1 m L	30 mg
	静注	
12	注射用エンドキサン 5 0 0 m g	200 mg/m ²
	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【250mL/h】	

Day4

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	
2	ロイコボリン注 3 m g 1 m L	30 mg
	静注	

3	グラニセトロン静注液 1 mg / 1 mL シリンジ	1 筒
	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【102mL/h】	
4	注射用エンドキサン 500 mg	200 mg/m ²
	テルモ生食 500 mL	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【250mL/h】	
5	ロイコボリン注 3 mg 1 mL	30 mg
	静注	
6	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴（全開）	
7	ロイコボリン注 3 mg 1 mL	30 mg
	静注	
8	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴（全開）	
9	注射用エンドキサン 500 mg	200 mg/m ²
	テルモ生食 500 mL	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【250mL/h】	
10	ロイコボリン注 3 mg 1 mL	30 mg
	静注	

Day5

1	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴（全開）	
2	ロイコボリン注 3 mg 1 mL	30 mg
	静注	
3	グラニセトロン静注液 1 mg / 1 mL シリンジ	1 筒
	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【102mL/h】	
	ロイコボリン注 3 mg 1 mL	30 mg
	静注	

4	キロサイドN注 1 g 50 mL	2000 mg/m ²
	テルモ生食 500 mL	300 mL
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【133.33mL/h】	
5	生理食塩液P L「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴（全開）	
6	ロイコボリン注 3 mg 1 mL	30 mg
	静注	
7	生理食塩液P L「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴（全開）	
8	ロイコボリン注 3 mg 1 mL	30 mg
	静注	
9	キロサイドN注 1 g 50 mL	2000 mg/m ²
	テルモ生食 500 mL	300 mL
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【133.33mL/h】	

Day6

1	生理食塩液P L「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴（全開）	
2	ロイコボリン注 3 mg 1 mL	30 mg
	静注	
3	オンコビン注射用 1 mg	1.5 mg/m ²
	生理食塩液P L「フソー」 50 mL	1 瓶
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【100mL/h】	
4	生理食塩液P L「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴（全開）	
5	ヒド・ロルチゾンリン酸エステル Na 静注液 100mg(*クレイトン)	1 A
	生理食塩液P L「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【104mL/h】	
6	ロイナーゼ注用 5000 単位	25000 U/m ²
	ブドウ糖注射液 5 % 20 mL	1 A

	化学療法 筋注	
7	ロイコボリン注 3 m g 1 m L	30 mg
	静注	
8	ロイコボリン注 3 m g 1 m L	30 mg
	静注	
9	ロイコボリン注 3 m g 1 m L	30 mg
	静注	

Day11

1	ヒド [®] ロコチゾ [®] ソリン酸エステル Na 静注液 100mg(*クレイトン)	1 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【104mL/h】	
2	ロイナーゼ注用 5 0 0 0 単位	25000 U/m ²
	ブドウ糖注射液 5 % 2 0 m L	1 A
	化学療法 筋注	

"DEX: 20mg/m² 分 3 po (Day1-5), VCR: 1.5mg/m²(max: 2mg) (Day1,6), MTX: 0.5g/m²+4.5g/m²(Day1), CPA: 200mg/m²×2(Day2-4, Day2 は 1 回のみ), AraC: 2000mg/m²(day5), L-ASP: 25000U/m²(Day6, 11), 髄注(Day1)

デキサメタゾンを処方 注射の場合は変換係数 0.825 を掛けて注射剤投与量とする

NEL→T-ALL-211-U HR3→HR2→HR1→NEL→T-ALL-211-U HR3→HR2→HR1 で終了

"

T-ALL211-U 寛解導入療法

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	30

Day1, 15, 22

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.5 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	
3	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	30 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	

Day5, 9,11, 14, 17, 20, 23, 26

1	L-アスパラギナーゼ (ロイナーゼ)	5000 U/m ²
	5 %ブドウ糖液 2 0 m L	1 A
	筋注	

Day8

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.5 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	
3	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	30 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	

デキサメタゾン：10mg/m²/D d1-7, 15-21 5→2.5→1.25mg/m²/D d(漸減中止)

T-ALL211-U 早期強化療法

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	30

Day1, 29

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	メスナ 4 0 0 m g	2 A
	静注	
3	シクロホスファミド (エンドキサン)	1000 mg/m ²
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
5	メスナ 4 0 0 m g	2 A
	静注	
6	メスナ 4 0 0 m g	2 A
	静注	

Day3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27

1	ヒドロコルチゾン 1 0 0 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	L-アスパラギナーゼ (ロイナーゼ)	5000 U/m ²
	5 %ブドウ糖液 2 0 m L	1 A
	筋注	
3	シタラビン (キロサイド)	75 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day4, 5, 11, 10, 18, 19, 25, 26

1	シタラビン（キロサイド）	75 mg/m ²
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

メルカプトプリン併用(Day1-28)

T-ALL211-U SR の強化療法

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	56

Day8, 22, 36, 50

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	メトトレキサート (メソトレキセート)	500 mg/m ²
	生理食塩液 2 0 m L	2 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	メトトレキサート (メソトレキセート)	4500 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

Day9, 23, 37, 51

1	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ロイコボリン 3 m g	20 A
	静注	

Day10, 24, 38, 52

1	ロイコボリン 3 m g	20 A
	静注	
2	ヒドロコルチゾン 1 0 0 m g	100 mg
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	L-アスパラギナーゼ (ロイナーゼ)	12500 U/m ²
	5 %ブドウ糖液 2 0 m L	1 A
	筋注	
4	ロイコボリン 3 m g	20 A
	静注	
5	ロイコボリン 3 m g	20 A

	静注	
6	ロイコボリン 3 m g	20 A
	静注	

メルカプトプリン：(内服)分1：寝る前 day1-56

T-ALL211-U SR の再寛解導療法 A

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	30

Day8, 15

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍻
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.5 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍻
	点滴静注	
3	ドキソルビシン	30 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍻
	点滴静注	

Day9,11, 16,18,

1	L-アスパラギナーゼ (ロイナーゼ)	10000 U/m ²
	5 %ブドウ糖液 2 0 m L	1 A
	筋注	

Day22, 29

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍻
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.5 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍻
	点滴静注	
3	ドキソルビシン	30 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍻
	点滴静注	

デキサメサゾン：10mg/m²(D1-7,15-21),5→2.5→1.25mg/m²(D22以降漸減)

T-ALL211-U SR の再寛解導療法 B

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	14

Day1

	ヒドロコルチゾン 1 0 0 m g	1 A
	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	
	L-アスパラギナーゼ (ロイナーゼ)	10000 U/m ²
	5 %ブドウ糖液 2 0 m L	1 A
	筋注	
	シクロホスファミド (エンドキサン)	1000 mg/m ²
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	点滴静注	
	ウロミテキサン注 4 0 0 m g	800 mg
	静注	
	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	
	ウロミテキサン注 4 0 0 m g	800 mg
	静注	
	ウロミテキサン注 4 0 0 m g	800 mg
	静注	

Day3, 5, 6, 10, 12, 13

	シタラビン (キロサイド)	75 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	
	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	
	生理食塩液 5 0 m L	1 罎
	点滴静注	

Day4, 11

	L-アスパラギナーゼ（ロイナーゼ）	10000 U/m ²
	5 %ブドウ糖液 20 mL	1 A
	筋注	
	ヒドロコルチゾン 100 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
	シタラビン（キロサイド）	75 mg/m ²
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day8

	L-アスパラギナーゼ（ロイナーゼ）	10000 U/m ²
	5 %ブドウ糖液 20 mL	1 A
	筋注	
	ヒドロコルチゾン 100 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

メルプトプリン：60mg/m²(D1-14 内服) / 14 日

T-ALL213-O 寛解導入療法

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	28

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	
3	ダウノルビシン (ダウノマイシン)	45 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	
4	シクロホスファミド (エンドキサン)	mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	

Day2, 3

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	45 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 キツ
	点滴静注	

Day8, 22

1	ビンクリスチン (オンコビン)	1 筒/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍺
	点滴静注	
2	L-アスパラギナーゼ (ロイナーゼ)	45 mg/m ²
	5 %ブドウ糖注 5 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	

Day10, 12, 14, 16, 18, 20

1	L-アスパラギナーゼ（ロイナーゼ）	5000 U/m ²
	5 %ブドウ糖注 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

Day15

1	ビンクリスチン（オンコビン）	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

プレドニゾロン：60mg/m² day-7～21、以降漸減し、7 日間で中止。（45 歳以上 60 歳未満は day14 まで、60 歳以上は day7 まで）

T-ALL213-O 寛解導入療法 2

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	28

Day1, 3, 5

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ネララビン (アラノンジ)	1500 mg/m ²
	点滴静注	

Day8

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	シタラビン (キロサイド)	75 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	シクロホスファミド (エンドキサン)	1000 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day9--19

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	シタラビン (キロサイド)	75 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	

メルカプトプリン：60mg/m² day8-21

T-ALL2130-O 地固め療法 1 (4)

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	28

Day1-3

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	5 ㍴
	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	シタラビン (キロサイド)	2000 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	エトポシド	100 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
4	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 ㍴
	点滴静注	
5	シタラビン (キロサイド)	2000 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

T-ALL213-O 地固め療法 2

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	28

Day1, 15

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	メトトレキサート (メソトレキセート)	3000 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

Day2, 16

1	ロイコボリン 3 m g	17 A
	静注	

Day3-6, 17-20

1	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	
3	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	
3	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	
4	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	

メルカプトプリン：25mg/m² day1-21

T-ALL213-O 地固め療法 3

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	56

Day1, 8, 15

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	ドキソルビシン	30 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	

Day29, 31, 33

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ネララビン (アラノンジ)	1500 mg
	点滴静注	

Day36

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	シタラビン (キロサイド)	75 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キツ
	点滴静注	
3	シクロホスファミド (エンドキサン)	mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day37-40, 43-47

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	シタラビン (キロサイド)	75 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	

デキサメサゾン：8.25mg/m²(day1-8, 15-22)

メルカプトプリン：60mg/m²(day36-49)

T-ALL213-O 地固め療法 5

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	56

Day1, 15

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	メトトレキサート (メソトレキセート)	3000 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	

Day2, 16

1	ロイコボリン 3 m g	50 mg
	静注	

Day3-6, 17-20

1	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	
2	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	
3	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	
4	ロイコボリン 3 m g	10 A
	静注	

Day29, 31, 33

1	ネララビン (アラノンジ)	1500 mg/m ²
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

メルカプトプリン：25mg/m² day1－21

T-ALL213-O 維持療法

がん腫	ALL(急性リンパ性白血病)
1 サイクルの日数	28

Day1

1	ビンクリスチン (オンコビン)	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	

プレドニゾロン：60mg/m²(day1-5)

メトトレキサート：20mg/m²(day1,8,15,22)

メルカプトプリン：(day1-28)

THP-COP

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	ソルデム 1 輸液 5 0 0 m L	500 mL
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	ピンクリスチン (オンコビン)	1.4 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	ピラルビシン (ピノルビン)	50 mg/m ²
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	100 mL
	点滴静注	
5	シクロホスファミド (エンドキサン)	750 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 mL
	点滴静注	
6	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

プレドニゾン：100mg/day あるいは 60mg/m²(day1-5)

VAD

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	21

Day1, 2, 3, 4

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	6 錠
	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	ビンクリスチン (オンコビン)	0.4 mg/body
	ドキソルビシン	10 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	500 mL
	点滴静注	

VP-16 大量療法(造血幹細胞採取)

がん腫	移植
1 サイクルの日数	4

Day1-4

1	エトポシド	500 mg/m ²
	静注	
2	生理食塩液 20 mL	1 A
	静注	

VP 療法

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	7

Day1

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ビンクリスチン（オンコビン）	1.4 mg/m ²
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

プレドニゾロン：100mg/day or 60mg/m²,d1-5

VR-CAP

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1-5

1	生理食塩液 500 mL	1 キット
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	ドキソルビシン	50 mg/m ²
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	シクロホスファミド (エンドキサン)	750 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
6	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
7	ボルテゾミブ (ベルケイド)	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 20 mL	1.2 mL
	皮下注射	

Day2

1	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	ヒドロコルチゾン 100 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	リツキシマブ	375 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

PSL100mg/day day1-5

Day4, 8, 11

1	ボルテゾミブ（ベルケイド）	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 20 mL	1.2 mL
	皮下注射	

PSL100mg/day day1-5

アドセトリス

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	ブレンツキシマブ ベドチン（アドセトリス）	1.8 mg/kg
	注射用水 100 mL	1 瓶
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

エンドキサン 1000mg（免疫抑制）

がん腫	免疫抑制
1 サイクルの日数	投与間隔：4 週未満は疑義照会

Day1-5

1	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	点滴（維持）	
2	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリンジ	1 筒
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【204mL/h】	
3	注射用エンドキサン 5 0 0 m g	1000 mg/body
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【250mL/h】	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	

CPA: 1000mg/body

投与間隔：4 週未満は疑義照会

イストダックス

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	28

Day1, 8, 15

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
2	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	ロミデプシン (イストダックス)	14 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

エルレフィオ皮下注

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	投与スケジュールは下記参照

1 回目

1	エルレフィオ皮下注	12 mg
	化学療法 皮下注射	化療①[23:31]

2 回目

1	エルレフィオ皮下注	32 mg
	化学療法 皮下注射	化療①[23:31]

3 回目以降

1	エルレフィオ皮下注	76 mg
	化学療法 皮下注射	化療①[23:31]

前投薬：コロナール 4 錠、レナデックス 5 錠、ポララミン 2mg（レナデックスが適宜減量あり）

24 週間以上投与し、奏効が認められている場合は、投与間隔を 2 週間間隔とすること。


投与スケジュール

本剤投与による CRS 及び ICANS の発現及び重症化リスクを軽減させるために、下図に示す投与スケジュールで本剤を投与してください。Q&A の Q2 (p.42) もご参照ください。




本剤の休薬後の再開方法について


①休薬直前の用量：12mg



②休薬直前の用量：32mg



③休薬直前の用量：76mg



前投与
本剤投与開始の約1時間前に、以下の薬剤を投与すること：
・解熱鎮痛剤
・副腎皮質ホルモン剤
・抗ヒスタミン剤

※1 24週間以上投与し、奏効が認められている場合は、投与間隔を2週間間隔とすること
※2 前投与は必須ではない

エルレフィオ®皮下注 電子添文「7. 用法及び用量に関連する注意」第1版(2024年3月作成)

ガザイバ(初回)

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	下部参照

Day1, 8, 15

1	アセトアミノフェン 1 0 0 0 m g	1 袋
	デキサメタゾン 6. 6 m g	3 瓶
	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	点滴静注	
2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
3	オビスツズマブ (ガザイバ)	1000 mg
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

50kg 未満はアセリオ 500mg に減量。

2 回目以降でインフュージョンリアクション出現時は初回レジメンを繰り返す。

1 サイクル目は Day1,8,15

2 サイクル目以降は Day1 のみ

ベンダムスチン併用：4 週毎×6 回、CHOP 併用：3 週毎×8 回、維持療法：2 ヶ月毎（最長 2 年）

ガザイバ(2回目以降)

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	下部参照

Day1,

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	アセトアミノフェン 1000 mg	1 袋
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	点滴静注	
3	生理食塩液 250 mL	1 袋
	オビヌツズマブ (ガザイバ)	1000 mg
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

50kg 未満はアセリオ 500mg に減量。

2回目以降でインフュージョンリアクション出現時は初回レジメンを繰り返す。

1 サイクル目は Day1,8,15

2 サイクル目以降は Day1 のみ

ベンダムスチン併用：4 週毎×6 回、CHOP 併用：3 週毎×8 回、維持療法：2 ヶ月毎（最長 2 年）

ガザイバ1 コース目（4 週間）

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	28

Day1

1	アセリオ静注液 1000mg バッグ／100mL	1 袋
	デキサート注射液 6. 6 m g （*デ'カ'ロン）	3 瓶
	ポララミン注 5 m g	1 A
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【400mL/h】	
2	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（維持）	
3	ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g ／ 4 0 m L	1000 mg
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【13mL/h】	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	

Day8,15

1	アセリオ静注液 1000mg バッグ／100mL	1 袋
	デキサート注射液 6. 6 m g （*デ'カ'ロン）	3 瓶
	ポララミン注 5 m g	1 A
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【400mL/h】	
2	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（維持）	
3	ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g ／ 4 0 m L	1000 mg
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【25mL/h】	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	

50kg 未満はアセリオ 500mg に減量。

ベンダムスチン併用：4 週毎×6 回、CHOP 併用：3 週毎×8 回、維持療法：2 ヶ月毎（最長 2 年）

ガザイバ1 コース目 (3 週間)

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	アセリオ静注液 1000mg バッグ／100mL	1 袋
	デキサート注射液 6. 6 m g (*デ'カ'ロン)	3 瓶
	ポララミン注 5 m g	1 A
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【400mL/h】	
2	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴 (維持)	
3	ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g ／ 4 0 m L	1000 mg
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【13mL/h】	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	

Day8,15

1	アセリオ静注液 1000mg バッグ／100mL	1 袋
	デキサート注射液 6. 6 m g (*デ'カ'ロン)	3 瓶
	ポララミン注 5 m g	1 A
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【400mL/h】	
2	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴 (維持)	
3	ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g ／ 4 0 m L	1000 mg
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【25mL/h】	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	

50kg 未満はアセリオ 500mg に減量。

ベンダムスチン併用：4 週毎×6 回、CHOP 併用：3 週毎×8 回、維持療法：2 ヶ月毎 (最長 2 年)

ガザイバ2 コース目以降

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	下部参照

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（維持）	
	アセリオ静注液 1000mg バッグ／100mL	1 袋
	デキサート注射液 6. 6 m g （*デ`カト`ロン）	3 瓶
2	ポララミン注 5 m g	1 A
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【400mL/h】	
3	ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g ／ 4 0 m L	1000 mg
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【25mL/h】	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	

50kg 未満はアセリオ 500mg に減量。

ベンダムスチン併用：4 週毎×6 回、CHOP 併用：3 週毎×8 回、維持療法：2 ヶ月毎（最長 2 年）

シタラビン少量皮下注射（ベネトクラクス併用）

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	28

Day1-10

1	キロサイドN注 1 g 50 mL	20 mg/m ²
	化学療法 皮下注射	

ベネトクラクス：100mg(day1), 200mg(day2), 400mg(day3), 600mg(day4-), AraC：20mg/m²(day1-10)

シリンジで払出

希釈なし

少量エトポシド

がん腫	移植
1 サイクルの日数	

Day1

1	エトポシド	50 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	

髄注 MTX+PSL

がん腫	悪性リンパ腫（白血病、悪性リンパ腫）
1 サイクルの日数	3

Day1

1	メソトレキセート	15mg
	水様性プレドニン	20mg
	生理食塩水	5mL
	化学療法 脳脊髄腔(腰椎)	

全量 5 mL に調製

週に最大 1 回の投与を原則とし、単独もしくはレジメンとともに実施。髄注の間隔は最低でも中 2 日はあける。

レジメン登録はしないがセット処方（科セット）で運用する。（13-90-00001）

髄注 MTX+DEX

がん腫	悪性リンパ腫（白血病、悪性リンパ腫）
1 サイクルの日数	3

Day1

1	メソトレキセート	15mg
	デキサート	3.3mg
	生理食塩水	4mL
	化学療法 脳脊髄腔(腰椎)	

全量 5 mL に調製

週に最大 1 回の投与を原則とし、単独もしくはレジメンとともに実施。髄注の間隔は最低でも中 2 日はあける。

レジメン登録はしないがセット処方（科セット）で運用する。（13-90-00002）

髄注 MTX+AraC+PSL

がん腫	悪性リンパ腫（白血病、悪性リンパ腫）
1 サイクルの日数	3

Day1

1	メソトレキセート	15mg
	キロサイド	40mg
	水様性プレドニン	20mg
	生理食塩水	3mL
	化学療法 脳脊髄腔(腰椎)	

全量 5 mL に調製

週に最大 1 回の投与を原則とし、単独もしくはレジメンとともに実施。髄注の間隔は最低でも中 2 日はあける。

レジメン登録はしないがセット処方（科セット）で運用する。（13-90-0011）

髄注 MTX+AraC+DEX

がん腫	悪性リンパ腫（白血病、悪性リンパ腫）
1 サイクルの日数	3

Day1

1	メソトレキセート	15mg
	キロサイド	40mg
	デキサート	3.3mg
	生理食塩水	2mL
	化学療法 脳脊髄腔(腰椎)	

全量 5 mL に調製

週に最大 1 回の投与を原則とし、単独もしくはレジメンとともに実施。髄注の間隔は最低でも中 2 日はあける。

レジメン登録はしないがセット処方（科セット）で運用する。（13-90-0012）

大量 AraC 療法(3 日間)

がん腫	AML
1 サイクルの日数	28

Day1,3,5

1	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリンジ	1 筒
	ソル・メドロール静注用 1 2 5 m g	40 mg
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【102mL/h】	
2	キロサイド N 注 1 g 5 0 m L	3000 mg/m ²
	テルモ生食 5 0 0 m L	300 mL
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【150mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	
4	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリンジ	1 筒
	ソル・メドロール静注用 1 2 5 m g	40 mg
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【102mL/h】	
5	キロサイド N 注 1 g 5 0 m L	3000 mg/m ²
	テルモ生食 5 0 0 m L	300 mL
6	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	

Ara-C: 3000mg/m²*2/day(Day1,3,5)

最大 3 コース s

ダリナパルシン療法

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1-5

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 ㍺
	点滴（全開）	化療①[23:31]
2	ダルビアス点滴静注用（1 3 5）	300 mg/m ²
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	注射用水 2 0 m L	1 A
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【270mL/h】	化療②[23:32]
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 ㍺
	点滴（全開）	化療③[23:33]

ダリナパルシン: 300mg/m²(D1-5) / 21D

中心静脈からの投与が望ましい

短時間 CHOP

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
	グラニセトロン 1 m g	1 筒
2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	ピンクリスチン (オンコビン)	1.4 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	ドキソルビシン	50 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
5	シクロホスファミド (エンドキサン)	750 mg/m ²
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	点滴静注	
6	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

プレドニゾン：100mg/day あるいは 60mg/m² day1-5

短時間 COP

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
	グラニセトロン 1 m g	1 筒
2	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	ピンクリスチン (オンコビン)	1.4 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	シクロホスファミド (エンドキサン)	750 mg/m ²
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

プレドニゾロン：100mg/day あるいは 60mg/m² day1-5

トレアキシン 90（ポート留置）

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	28

Day1, 2

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ベンダムスチン（トレアキシン）	90 mg/m ²
	注射用水 1 0 0 m L	1 瓶
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

リツキシマブ併用

トレアキシン 90（末梢）

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	28

Day1, 2

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ベンダムスチン（トレアキシン）	90 mg/m ²
	注射用水 1 0 0 m L	1 瓶
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

リツキシマブ併用

トレアキシン 120（ポート留置）

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1, 2

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ベンダムスチン（トレアキシン）	120 mg/m ²
	注射用水 1 0 0 m L	1 瓶
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

トレアキシン 120（末梢）

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	21

Day1, 2

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ベンダムスチン（トレアキシン）	120 mg/m ²
	注射用水 1 0 0 m L	1 瓶
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

ネララビン

がん腫	ALL
1 サイクルの日数	7

Day1-5

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	
2	アラノンジー静注用 2 5 0 m g / 5 0 m L	650 mg/m ²
	大塚生食注 2 5 0 m L	0.1 mL
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【130.1mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	

ネララビン：650mg/m²(Day1-5) / 7Days

Grade2 以上の神経毒性で中止

NEL→T-ALL-211-U HR3→HR2→HR1→

NEL→T-ALL-211-U HR3→HR2→HR1 で終了

医師向けコメント

最終 G-CSF 投与後 2 日以上経過して好中球数 500/mcl 以上

かつ最終の血小板輸血から 3 日間以上経過して血小板数 50,000/mcl 以上

であることを確認する。

アラノンジー：空の生食ボトルに混注

ビキセオス Induction 1

がん腫	AML
1 サイクルの日数	14

Day1, 3, 5

1	大塚生食注2ポート 100 mL	1 キット
	点滴（速度指定） mL/h 【50mL/h】	
2	グラニセトロン静注液 1 mg / 1 mL シリジ	1 筒
	点滴の側管から静注	
3	生理食塩液 PL「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	
4	ビキセオス配合静注用（100）	100 U/m ²
	注射用水 100 mL	1 瓶
	テルモ生食 500 mL	1 袋
	化学療法 点滴の側管から点滴（閉鎖式）mL/h 【400mL/h】	
5	生理食塩液 PL「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	

ビキセオス：100U/m²（D1,3,5）

寛解導入療法：1 サイクル目として本剤を 1、3、5 日目に点滴静注する。1 サイクル目の投与開始から 2～5 週間後に、2 サイクル目として本剤を 1、3 日目に点滴静注する。

ビキセオス Induction 2

がん腫	AML
1 サイクルの日数	35

Day1, 3

1	大塚生食注2ポート 100 mL	1 キット
	点滴（速度指定） mL/h 【50mL/h】	
2	グラニセトン静注液 1 mg / 1 mL シリジ	1 筒
	点滴の側管から静注	
3	生理食塩液 PL「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	
4	ビキセオス配合静注用（100）	100 U/m ²
	注射用水 100 mL	1 瓶
	テルモ生食 500 mL	1 袋
	化学療法 点滴の側管から点滴（閉鎖式）mL/h 【400mL/h】	
5	生理食塩液 PL「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	

ビキセオス：100U/m²（D1,3）

寛解導入療法：1 サイクル目として本剤を 1、3、5 日目に点滴静注する。1 サイクル目の投与開始から 2～5 週間後に、2 サイクル目として本剤を 1、3 日目に点滴静注する。

ビキセオス Consolidation

がん腫	AML
1 サイクルの日数	35

Day1, 3

1	大塚生食注2ポート 100 mL	1 キット
	点滴（速度指定） mL/h 【50mL/h】	
2	グラニセトロン静注液 1 mg / 1 mL シリジ	1 筒
	点滴の側管から静注	
3	生理食塩液 PL「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	
4	ビキセオス配合静注用（100）	65 U/m ²
	注射用水 100 mL	1 瓶
	テルモ生食 500 mL	1 袋
	化学療法 点滴の側管から点滴（閉鎖式）mL/h 【400mL/h】	
5	生理食塩液 PL「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	

ビキセオス：65U/m² (D1,3)

最後の寛解導入療法開始から5～8週間後に、1サイクル目として本剤を1、3日目に点滴静注する。1サイクル目の地固め療法開始から5～8週間後に、2サイクル目として本剤を1、3日目に点滴静注する。

ビダーザ 皮下注射

がん腫	MDS(骨髄異形成症候群)
1 サイクルの日数	28

Day1-7

1	アザシチジン（ビダーザ）	75 mg/m ²
	注射用水 20 mL	20 mL
	皮下注射	

ビダーザ 点滴静注

がん腫	MDS(骨髄異形成症候群)
1 サイクルの日数	28

Day1-7

1	アザシチジン (ビダーザ)	75 mg/m ²
	注射用水 20 mL	20 mL
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

ビーリンサイト(45kg 未満 1 コース目)

がん腫	ALL
1 サイクルの日数	42

Day1

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	3 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ブリナツモマブ (ビーリンサイト)	5 $\mu\text{g}/\text{m}^2$
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	生理食塩液 2 0 m L	15 mL
	注射用水 2 0 m L	1 A
	点滴静注	

Day2-7

1	ブリナツモマブ (ビーリンサイト)	5 $\mu\text{g}/\text{m}^2$
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	生理食塩液 2 0 m L	15 mL
	注射用水 2 0 m L	1 A
	点滴静注	

Day8

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	3 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ブリナツモマブ (ビーリンサイト)	15 $\mu\text{g}/\text{m}^2$
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	生理食塩液 2 0 m L	15 mL
	注射用水 2 0 m L	1 A
	点滴静注	

Day9-28

1	ブリナツモマブ (ビーリンサイト)	15 $\mu\text{g}/\text{m}^2$
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	生理食塩液 2 0 m L	15 mL
	注射用水 2 0 m L	1 A
	点滴静注	

ビーリンサイト(45kg 未満 2-5 コース目)

がん腫	ALL
1 サイクルの日数	42

Day1

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	3 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ブリナツモマブ (ビーリンサイト)	15 $\mu\text{g}/\text{m}^2$
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	生理食塩液 2 0 m L	15 mL
	注射用水 2 0 m L	1 A
	点滴静注	

Day2-28

1	ブリナツモマブ (ビーリンサイト)	15 $\mu\text{g}/\text{m}^2$
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	生理食塩液 2 0 m L	15 mL
	注射用水 2 0 m L	1 A
	点滴静注	

ビーリンサイト(45kg 未満 6-9 コース目)

がん腫	ALL
1 サイクルの日数	84

Day1

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	3 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ブリナツモマブ (ビーリンサイト)	15 $\mu\text{g}/\text{m}^2$
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	生理食塩液 2 0 m L	15 mL
	注射用水 2 0 m L	1 A
	点滴静注	

Day2-28

1	ブリナツモマブ (ビーリンサイト)	15 $\mu\text{g}/\text{m}^2$
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	生理食塩液 2 0 m L	15 mL
	注射用水 2 0 m L	1 A
	点滴静注	

ビーリンサイト(45kg 以上 1 コース目)

がん腫	ALL
1 サイクルの日数	42

Day1

1	デキサート注射液 6. 6 m g (*デ ⁺ カ ⁺ ロソ)	3 瓶
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴 (速度指定) mL/h 【112mL/h】	10:30
2	ビーリンサイト点滴静注用 3 5 μ g	27 μg/body
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	生理食塩液 2 0 m L	9 mL
	注射用水 2 0 m L	3mL
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【3.3mL/h】	11:00

Day4

1	ビーリンサイト点滴静注用 3 5 μ g	27 μg/body
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	生理食塩液 2 0 m L	9 mL
	注射用水 2 0 m L	3mL
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【3.3mL/h】	11:00

Day7

1	ビーリンサイト点滴静注用 3 5 μ g	27 μg/body
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	生理食塩液 2 0 m L	9 mL
	注射用水 2 0 m L	3mL
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【3.3mL/h】	11:00

Day8

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	3 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ビーリンサイト点滴静注用 3 5 μ g	28 μg
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	生理食塩液 2 0 m L	9 mL
	注射用水 2 0 m L	3mL
	点滴静注	

Day9-28

1	ビーリンサイト点滴静注用 3 5 μ g	28 μg
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋

	生理食塩液 20 mL	9 mL
	注射用水 20 mL	3mL
	点滴静注	

Day29

1	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【50mL/h】	

ビリンサト：27ug/3day（Day1,4），ビリンサト：27ug/3day（Day7 24 時間経過後破棄するため、投与量は 9ug/day），
 ビリンサト 28ug/day(Day8-28)/42 日

生食 250 mL には 261 mL 充填されているとのことで、9 mL を追加して 270 mL とすることとした

ビーリンサイト(45kg 以上 2-5 コース目)

がん腫	ALL
1 サイクルの日数	42

Day1

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	3 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ブリナツモマブ (ビーリンサイト)	28 μ g
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	生理食塩液 2 0 m L	15 mL
	注射用水 2 0 m L	1 A
	点滴静注	

Day2-28

1	ブリナツモマブ (ビーリンサイト)	28 μ g
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	生理食塩液 2 0 m L	15 mL
	注射用水 2 0 m L	1 A
	点滴静注	

ビーリンサイト(45kg 以上 6-9 コース目)

がん腫	ALL
1 サイクルの日数	84

Day1

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	3 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ブリナツモマブ (ビーリンサイト)	28 μ g
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	生理食塩液 2 0 m L	15 mL
	注射用水 2 0 m L	1 A
	点滴静注	

Day2-28

1	ブリナツモマブ (ビーリンサイト)	28 μ g
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	生理食塩液 2 0 m L	15 mL
	注射用水 2 0 m L	1 A
	点滴静注	

プラトトレキサート療法

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	49

Day1,8,15,22,29,36

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注（維持）	
2	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	プラトトレキサート（ジフォルタ）	30 mg/m ²
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注（維持）	

- 治療開始の 10 日以上前から、フォリアミン錠 5mg を連日内服（治療終了後 30 日間まで）
- 治療開始の 10 日以上前から、シアノコバラミン注 1000 μ g 皮下注（8～10 週ごとに）
- ジフォルタ投与 24 時間後から、ロイコボリン錠 25mg/回を 8 時間ごとに 6 回服用

2 週目以降：

前回のジフォルタ投与後、口内炎あり：25mg/回

前回のジフォルタ投与後、口内炎なし：15mg/回

フルダラ

がん腫	血液科その他
1 サイクルの日数	28

Day1-5

1	フルダラビン（フルダラ）	20 mg/m ²
	注射用水 5 m L	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	100 mℓ
	点滴静注	

ベスポンサ 1 コース目

がん腫	A L L
1 サイクルの日数	21

Day1

1	ヒド`ロコチゾ`ンリン酸エステル Na 静注液 100mg(*クレイトン)	1 A
	ポララミン注 5 m g	1 A
	アセリオ静注液 1000mg バッグ／100mL	1 袋
	点滴（速度指定） mL/h 【206mL/h】	
2	ベスポンサ点滴静注用（1）	0.8 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	1 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【70mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	

Day8,15

1	ヒド`ロコチゾ`ンリン酸エステル Na 静注液 100mg(*クレイトン)	1 A
	ポララミン注 5 m g	1 A
	アセリオ静注液 1000mg バッグ／100mL	1 袋
	点滴（速度指定） mL/h 【206mL/h】	
2	ベスポンサ点滴静注用（1）	0.5 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	1 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【70mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	

ベスポンサ：0.8mg/m²(D1)、0.5mg/m²(D8,15)/21 日

アセリオ：50kg 未満は 500mg に減量

☐CD22 抗原陽性

[投与方法](#)

ベスポンサ 2 コース目以降（寛解）

がん腫	A L L
1 サイクルの日数	28

Day1,8,15

1	ヒト ^α ロコチゾ ^β リン酸エステル Na 静注液 100mg(*クレイトン)	1 A
	ポララミン注 5 m g	1 A
	アセリオ静注液 1000mg バッグ／100mL	1 袋
2	点滴（速度指定） mL/h 【206mL/h】	
	ベスポンサ点滴静注用（1）	0.5 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	1 A
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【70mL/h】	
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	

ベスポンサ：0.5mg/m²(D1,8,15)/28 日

アセリオ：50kg 未満は 500mg に減量

☐造血幹細胞移植予定：3 サイクルまで ☐造血幹細胞移植予定なし：6 サイクルまで

[投与方法](#)

ベスポンサ 2 コース目以降（非寛解）

がん腫	A L L
1 サイクルの日数	28

Day1

1	ヒド・ロコチゾ・ソリン酸エステル Na 静注液 100mg(*クレイトン)	1 A
	ポララミン注 5 m g	1 A
	アセリオ静注液 1000mg バッグ／100mL	1 袋
	点滴（速度指定） mL/h 【206mL/h】	
2	ベスポンサ点滴静注用（1）	0.8 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	1 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【70mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	

Day8,15

1	ヒド・ロコチゾ・ソリン酸エステル Na 静注液 100mg(*クレイトン)	1 A
	ポララミン注 5 m g	1 A
	アセリオ静注液 1000mg バッグ／100mL	1 袋
	点滴（速度指定） mL/h 【206mL/h】	
2	ベスポンサ点滴静注用（1）	0.5 mg/m ²
	注射用水 2 0 m L	1 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（速度指定） mL/h 【70mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	

"ベ" ス"ンサ：0.8mg/m²(D1)、0.5mg/m²(D8,15)/28 日


アセリオ：50kg 未満は 500mg に減量

☐造血幹細胞移植予定：3 サイクルまで ☐造血幹細胞移植予定なし：6 サイクルまで"

[投与方法](#)

1 用法及び用量

通常、成人にはイノツズマブ オゾガマイシン（遺伝子組換え）として1日目は $0.8\text{mg}/\text{m}^2$ （体表面積）、8及び15日目は $0.5\text{mg}/\text{m}^2$ （体表面積）を1日1回、1時間以上かけて点滴静脈内投与した後、休薬します。1サイクル目は21～28日間、2サイクル目以降は28日間を1サイクルとし、投与を繰り返します。投与サイクル数は造血幹細胞移植（HSCT）の施行予定を考慮して決定します。なお、患者の状態により適宜減量します。



ポテリジオ単剤

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	7

Day1

1	大塚生食注2 ポート 1 0 0 m L	1 キット
	点滴（速度指定） mL/h 【33.33mL/h】	
2	水溶性ハイドロコートン注射液 100mg 2mL	1 瓶
	ポララミン注 5 m g	1 A
	アセリオ静注液 1000mg バッグ／100mL	1 袋
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【412mL/h】	
3	ポテリジオ点滴静注 2 0 m g 5 m L	1 mg/kg
	大塚生食注 2 5 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴の側管から点滴 mL/h 【125.12mL/h】	
4	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	

ポテリジオ 1mg/kg(day1) 最大 8 回

☐CCR4 陽性を確認

アセリオ：50kg 未満は 500mg に減量

ボルテゾミブ皮下投与(週 2 回)

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	21

Day1, 4, 8, 11

1	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 20 mL	0.8 mL
	皮下注射	

デキサメタゾン（レナデックス）：20mg/body（1-2 コース：day2,5,9,12 3-8 コース：day2,5）

ボルテゾミブ皮下投与(週 1 回)

がん腫	多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	35

Day1, 8, 15, 22

1	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²
	生理食塩液 20 mL	0.8 mL
	皮下注射	

デキサメタゾン（レナデックス）：20mg/body (day2-4)

マイロターゲット

がん腫	AML(急性骨髄性白血病)
1 サイクルの日数	28

Day1, 15

1	ゲムツズマブオゾガマイシン (マイロターゲット)	9 mg/m ²
	注射用水 20 mL	1 A
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	

ユルトミリス HI 40kg 以上 60kg 未満（初回）

がん腫	血液科その他
1 サイクルの日数	14

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	
2	ユルトミリス H I （300,1100）	2400 mg
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	24 mL
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【64mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	

ユルトミリス HI 40kg 以上 60kg 未満（2 回目以降）

がん腫	血液科その他
1 サイクルの日数	56

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	
2	ユルトミリス H I （300,1100）	3000 mg
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	30 mL
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【65mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	

ユルトミリス HI 60kg 以上 100kg 未満（初回）

がん腫	血液科その他
1 サイクルの日数	14

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	
2	ユルトミリス H I （300,1100）	2700 mg
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	27 ㎖
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【92mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	

ユルトミリス HI 60kg 以上 100kg 未満（2 回目以降）

がん腫	血液科その他
1 サイクルの日数	56

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	
2	ユルトミリス H I （300,1100）	3300 mg
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	33 ㎖
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【98mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	

リツキサン(CLL) (初回)

がん腫	血液科その他
1 サイクルの日数	7

Day1

1	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	ヒドロコルチゾン 100 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	リツキサン	375 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	
4	生理食塩液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	

最大投与回数：6 回

リツキサン(CLL) (2回目以降)

がん腫	血液科その他
1 サイクルの日数	7

Day1

1	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	ヒドロコルチゾン 100 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	リツキサン	500 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	
4	生理食塩液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	

最大投与回数：6回

リツキサン(ITP) (初回)

がん腫	血液科その他
1 サイクルの日数	7

Day1

1	ヒドロコルチゾン 100 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
3	リツキサン	375 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

リツキサン(ITP) (2回目以降)

がん腫	血液科その他
1 サイクルの日数	7

Day1

1	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	ヒドロコルチゾン 100 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	リツキサン	375 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

リツキサン(TTP) (初回)

がん腫	血液科その他
1 サイクルの日数	7

Day1

1	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	ヒドロコルチゾン 100 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	リツキサン	375 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	
4	生理食塩液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	

最大投与回数：4 回

リツキサン(TTP) (2回目以降)

がん腫	血液科その他
1 サイクルの日数	7

Day1

1	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	ヒドロコルチゾン 100 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	リツキサン	375 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	
4	生理食塩液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	

最大投与回数：4回

リツキシマブ(初回)

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	7~21

Day1

1	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	ヒドロコルチゾン 100 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 ㍺
	点滴静注	
3	リツキシマブ	375 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 ㍺
	点滴静注	

リツキシマブ(2回目以降)

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	7

Day1

1	生理食塩液 100 mL	100 mL
	点滴静注	
2	ヒドロコルチゾン 100 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 ㍲
	点滴静注	
3	リツキシマブ	375 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	250 mL
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 ㍲
	点滴静注	

ロイスタチン

がん腫	血液科その他
1 サイクルの日数	21

Day1-7

1	クラドリビン（ロイスタチン）	0.09 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	500 mL
	点滴静注	

ロイスタチン5日間

がん腫	悪性リンパ腫
1 サイクルの日数	28

Day1-5

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	クラドリビン（ロイスタチン）	0.12 mg/kg
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

