

泌尿器科.....	3
BEP .....	3
CDDP(放射線併用).....	5
EP.....	6
GC.....	8
GEM 単剤 .....	10
GEM+CBDCA.....	11
GEM+PTX .....	12
MMC 膀胱注入 .....	13
Nivolumab.....	14
Nivolumab (480mg 4週毎).....	15
THP-ADM 膀胱注入.....	16
THP-ADM 膀胱注入(手術室) .....	17
オブジーボ アジュバント 2週間.....	18
オブジーボ アジュバント 4週間.....	19
オブジーボ+カボザンチニブ 2週間(腎癌) .....	20
オブジーボ+カボザンチニブ 4週間(腎癌) .....	21
カバジタキセル .....	22
キイトルーダ .....	23
キイトルーダ アジュバント(200mg 3週毎).....	24
キイトルーダ アジュバント(400mg 6週毎).....	25
キイトルーダ+アキシチニブ .....	26
キイトルーダ(400mg 6週毎) .....	27
キイトルーダ(400mg 6週毎)+アキシチニブ.....	28
キイトルーダ+レンバチニブ 3週間(腎癌) .....	29
キイトルーダ+レンバチニブ 6週間(腎癌) .....	30
ゴナックス(初回).....	31
ゴナックス維持(2回目以降) .....	32
ゴナックス維持(3ヶ月製剤) .....	33
ゾラデックス 泌尿器.....	34
ゾラデックス LA(3ヶ月毎) 泌尿器.....	35
ドセタキセル .....	36
パドセブ.....	37
バベンチオ+インライタ .....	38
バベンチオ維持療法.....	39
リュープリンSR 泌尿器 .....	40
リュープロレリン(月1回) 泌尿器 .....	41
リュープリンPRO(6ヶ月1回) 泌尿器.....	42



## 泌尿器科

BEP

がん腫	胚細胞腫瘍
1 サイクルの日数	21

Day1

1	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリンジ	1 筒
	デキサート注射液 6. 6 m g (*デカドロン)	1 瓶
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴 (速度指定) mL/h 【212mL/h】	09:45
2	ブレオ注射用 5 m g	30 mg/m <sup>2</sup>
	大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L	1 瓶
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【200mL/h】	10:00
3	エポシド点滴静注液 100mg/5mL「サント」(*ラステット)	100 mg/m <sup>2</sup>
	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【126.25mL/h】	11:00
4	シスプラチン点滴静注 1 0 m g 2 0 m L	20 mg/m <sup>2</sup>
	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【270mL/h】	15:00
5	ソルデム 1 輸液 5 0 0 m L (*ソラタ T1)	1 袋
	プリンペラン注射液 10mg 2mL	1 A
	点滴 (速度指定) mL/h 【100.4mL/h】	19:00

Day2, 3, 4, 5

1	ラクテック注 5 0 0 m L	1 瓶
	点滴 (速度指定) mL/h 【51.28mL/h】	00:00
2	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリンジ	1 筒
	デキサート注射液 6. 6 m g (*デカドロン)	1 瓶
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴 (速度指定) mL/h 【212mL/h】	09:45
3	エポシド点滴静注液 100mg/5mL「サント」(*ラステット)	100 mg/m <sup>2</sup>
	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【126.25mL/h】	10:00

4	シスプラチン点滴静注 10 mg 20 mL	20 mg/m <sup>2</sup>
	テルモ生食 500 mL	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【270mL/h】	14:00
5	ソルデム1輸液 500 mL (*ツタT1)	1 袋
	プリンペラン注射液 10mg 2mL	1 A
	点滴 (速度指定) mL/h 【83.66mL/h】	18:00

## Day6

1	ラクテック注 500 mL	1 瓶
	点滴 (速度指定) mL/h 【100mL/h】	00:00
2	ソルデム1輸液 500 mL (*ツタT1)	1 袋
	プリンペラン注射液 10mg 2mL	1 A
	点滴 (速度指定) mL/h 【100mL/h】	05:00

## Day8, 15

1	生理食塩液 PL 「フソー」 50 mL	1 瓶
	デキサート注射液 6.6 mg (*デカトロン)	1 瓶
	点滴 (速度指定) mL/h 【208mL/h】	09:45
2	ブレオ注射用 5 mg	30 mg/m <sup>2</sup>
	大塚生食注2ポート 100 mL	1 キツ
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【200mL/h】	10:00
3	生理食塩液 PL 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	11:00

BLM: 30mg/body(D1,8,15), ETP: 100mg/m<sup>2</sup>(D1-5), CDDP: 20mg/m<sup>2</sup>(D1-5) / 3w

アプレピタント併用

CDDP(放射線併用)

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	21

Day1, 2, 3, 4, 5

1	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	シスプラチン	20 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 10 mL	1 S
	静注	

EP

がん腫	精巣腫瘍
1 サイクルの日数	21

Day1

1	ソルデム3A輸液 200mL (*ツタT3) 点滴 (速度指定) mL/h 【100mL/h】	1 袋 08:00
2	グラニセトロン静注液 1mg / 1mLシリンジ デキサート注射液 6. 6mg (*デカトロン) 生理食塩液PL「フソー」 50mL 点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【212mL/h】	1 筒 1 瓶 1 瓶 09:45
3	エポシト点滴静注液 100mg/5mL「サント」(*ラステット) テルモ生食 500mL 化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【126.25mL/h】	100 mg/m <sup>2</sup> 1 袋 10:00
4	シスプラチン点滴静注 10mg 20mL 大塚生食注 250mL 化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【145mL/h】	20 mg/m <sup>2</sup> 1 袋 14:00
5	ソルデム1輸液 500mL (*ツタT1) プリンペラン注射液 10mg 2mL 点滴 (速度指定) mL/h 【80mL/h】	1 袋 2 A 16:00

Day2, 3, 4, 5

1	ラクテック注 500mL 点滴 (速度指定) mL/h 【50mL/h】	1 瓶 00:00
2	グラニセトロン静注液 1mg / 1mLシリンジ デキサート注射液 6. 6mg (*デカトロン) 生理食塩液PL「フソー」 50mL 点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【212mL/h】	1 筒 1 瓶 1 瓶 09:45
3	エポシト点滴静注液 100mg/5mL「サント」(*ラステット) テルモ生食 500mL 化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【126.25mL/h】	100 mg/m <sup>2</sup> 1 袋 10:00
4	シスプラチン点滴静注 10mg 20mL 大塚生食注 250mL	20 mg/m <sup>2</sup> 1 袋

	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【145mL/h】	14:00
5	ソルデム 1 輸液 500 mL (*ソタ T1)	1 袋
	プリンペラン注射液 10mg 2mL	2 A

GC

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	28

Day1, 8, 15

1	ソルデム 3 A 輸液 200 mL 点滴静注	1 袋
2	生理食塩液 10 mL 静注	1 S
3	デキサメタゾン 3.3 mg 生理食塩液 50 mL 点滴静注	1 A 1 瓶
4	ゲムシタビン 5%ブドウ糖液 100 mL 点滴静注	1000 mg/m <sup>2</sup> 1 キツ
5	生理食塩液 50 mL 点滴静注	1 瓶

Day2

1	ラクテック輸液 500 mL メトクロプラミド 10 mg 点滴静注	1 瓶 1 A
2	デキサメタゾン 3.3 mg グラニセトロン 1 mg 生理食塩液 50 mL 点滴静注	1 A 1 筒 1 瓶
3	シスプラチン 生理食塩液 500 mL 点滴静注	70 mg/m <sup>2</sup> 1 袋
4	15%マンニトールS注射液 300 mL 点滴静注	300 mL
5	ソルデム 1 輸液 500 mL	1 袋



	メトクロプラミド 10mg	1A
	7%炭酸水素ナトリウム液 20mL	1A
	点滴静注	
6	ソルデム1輸液 500mL	1袋
	点滴静注	

## Day3

1	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
2	ラクテック輸液 500mL	1瓶
	メトクロプラミド 10mg	1A
	点滴静注	
3	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 10mL	1S
	静注	

## Day4, 5

1	ラクテック輸液 500mL	1瓶
	メトクロプラミド 10mg	1A
	点滴静注	
2	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 10mL	1S
	静注	

## GEM 単剤

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	28

## Day1, 8, 15

1	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

## GEM+CBDCA

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	21

## Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	カルボプラチン	AUC=5
	5 %ブドウ糖液 2 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

## Day8

1	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

## GEM+PTX

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	21

## Day1

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	3 瓶
	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	ファモチジン 2 0 m g	1 A
	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	パクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>
	5 %ブドウ糖注 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

## Day8, 15

1	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

## MMC 膀胱注入

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	7

## Day1

1	マイトマイシンC (マイトマイシン)	20 mg
	生理食塩液 20 mL	1 A
	膀胱内注射	

## Nivolumab

がん腫	腎細胞癌
1 サイクルの日数	14

## Day1

1	ニボルマブ (オブジーボ)	240mg
	生理食塩液 100 mL	1 <small>キット</small>
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 <small>瓶</small>
	点滴静注	

Nivolumab (480mg 4 週毎)

がん腫	腎細胞癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	ニボルマブ (オブジーボ)	480 mg
	生理食塩液 100 mL	1 <small>キット</small>
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 <small>瓶</small>
	点滴静注	

## THP-ADM 膀胱注入

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	7

## Day1

1	ピラルビシン (ピノルビン)	20 mg
	生理食塩液 20 mL	30 mL
	膀胱内注射	



## THP-ADM 膀胱注入（手術室）

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	7

## Day1

1	ピラルビシン（ピノルビン）	20 mg
	生理食塩液 20 mL	30 mL
	膀胱内注射	

オブジーボ アジュバント 2週間

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	14

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴（全開）	
2	オブジーボ点滴静注 100 mg / 10 mL	240 mg
	大塚生食注 2 ポート 100 mL	1 瓶
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【248mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴（全開）	

"Nivo: 240mg / 2w

投与期間：最長 1 年"

オブジーボ アジュバント 4週間

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴（全開）	
2	オブジーボ点滴静注 100 mg / 10 mL	480 mg
	大塚生食注2ポート 100 mL	70 mL
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【236mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴（全開）	

Nivo : 480mg(D1)/4 週

投与期間 : 最長 1 年

オブジーボ+カボザンチニブ 2週間（腎癌）

がん腫	腎細胞癌
1 サイクルの日数	14

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴（全開）	
2	オブジーボ点滴静注 100 mg / 10 mL	240 mg
	大塚生食注 2 ポート 100 mL	1 瓶
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【248mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴（全開）	

Nivo: 240mg / 2w、カボザンチニブ 40mg 1 日 1 回を連日

オブジーボ+カボザンチニブ 4 週間（腎癌）

がん腫	腎細胞癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	
2	オブジーボ点滴静注 1 0 0 m g / 1 0 m L	480 mg
	大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L	70 ml
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【236mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴（全開）	

Nivo : 480mg(D1)/4 週、カボザンチニブ 40mg1 日 1 回を連日

## カバジタキセル

がん腫	前立腺癌
1 サイクルの日数	21

## Day1

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	ファモチジン 20 mg	1 A
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	カバジタキセル (ジェブタナ)	20 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

プレドニゾロン：10mg 連日投与

ペグフィルグラスチム 3.6mg 投与 (day2)

キイトルーダ

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	ペムブロリズマブ (キイトルーダ)	200 mg
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

キイトルーダ アジュバント(200mg 3 週毎)

がん腫	腎細胞癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴 (全開)	化療①[23:31]
2	キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g 4 m L	200 mg/body
	大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L	1 瓶
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【216mL/h】	化療②[23:32]
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴 (全開)	化療③[23:33]

Pembro: 200mg / 3w

術後治療として 12 ヶ月間 (3 週毎、6 週毎合わせて)



キイトルーダ アジュバント(400mg 6 週毎)

がん腫	腎細胞癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴 (全開)	化療①[23:31]
2	キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g 4 m L	400 mg/body
	大塚生食注 2 ポート 1 0 0 m L	1 瓶
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【216mL/h】	化療②[23:32]
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	点滴 (全開)	化療③[23:33]

Pembro: 400mg / 6w

術後治療として 12 ヶ月間 (3 週毎、6 週毎合わせて)

## キイトルーダ+アキシチニブ

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	21

## Day1

1	ベムブロリズマブ (キイトルーダ)	200 mg
	生理食塩液 100 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

アキシチニブ：1回5mgを1日2回（最大1回10mgを1日2回）

キイトルーダ(400mg 6週毎)

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	42

Day1

1	ペムブロリズマブ (キイトルーダ)	400 mg
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

キイトルーダ(400mg6週毎)+アキシチニブ

がん腫	尿路上皮癌
1サイクルの日数	42

Day1

1	ベムプロリズマブ (キイトルーダ)	400 mg
	生理食塩液 100 mL	1 <small>キット</small>
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 <small>瓶</small>
	点滴静注	

アキシチニブ：1回5mgを1日2回（最大1回10mgを1日2回）

キイトルーダ+レンバチニブ 3週間（腎癌）

がん種	子宮体癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 100 mL	1 キット
	ペムブロリズマブ（キイトルーダ）	200 mg/body
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

レンビマ 20mg/日連日

キイトルーダ+レンバチニブ 6週間（腎癌）

がん種	子宮体癌
1 サイクルの日数	42

Day1

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 100 mL	1 キット
	ペムブロリズマブ（キイトルーダ）	400 mg/body
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

レンビマ 20mg/日連日

## ゴナックス(初回)

がん腫	前立腺癌
1 サイクルの日数	28

## Day1

1	デガレリクス (ゴナックス)	240 mg
	皮下注射	

ゴナックス維持(2回目以降)

がん腫	前立腺癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	デガレリクス (ゴナックス)	80 mg
	皮下注射	



## ゴナックス維持（3ヶ月製剤）

がん腫	前立腺癌
1 サイクルの日数	84

## Day1

1	デガレリクス（ゴナックス）	480 mg
	皮下注射	

## ゾラデックス 泌尿器

がん腫	前立腺癌
1 サイクルの日数	28

## Day1

1	ゴセレリン (ゾラデックス)	3.6 mg
	皮下注射	

## ゾラデックス LA(3 ヶ月毎) 泌尿器

がん腫	前立腺癌
1 サイクルの日数	84

## Day1

1	ゴセレリン (ゾラデックス LA)	10.8 mg
	皮下注射	

ドセタキセル

がん腫	前立腺癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

パドセブ

がん腫	尿路上皮癌
28	168

Day1, 8, 15

1	生理食塩液P L「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴（全開）	
2	パドセブ点滴静注用（30）	1.25 mg/kg
	注射用水 20 mL	1 A
	生理食塩液P L「フソー」 50 mL	1 瓶
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【100mL/h】	
3	生理食塩液P L「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴（全開）	

"パドセブ：1.25mg/kg (D1,8,15) / 4w 最大 125mg

1.25→1.0→0.75→0.5mg/kg で減量"

## バベンチオ+インライタ

がん腫	腎細胞がん
1 サイクルの日数	14

## Day1

1	大塚生食注2 ポート 100 mL 点滴（維持）	1 キット
2	ポララミン注 5 mg アセリオ静注液 1000mg バッグ/100mL 点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【202mL/h】	1 A 1 袋
3	バベンチオ点滴静注 200mg/10mL 大塚生食注 250 mL 点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【250.5mL/h】	10 mg/kg 1 袋
4	生理食塩液 PL「フソー」 50 mL 点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	1 瓶

アキシチニブ 5mg1 日 2 回 連日服用

## バベンチオ維持療法

がん腫	尿路上皮がん
1 サイクルの日数	14

## Day1

1	大塚生食注2ポート 100 mL 点滴（維持）	1 キット
2	ポララミン注 5 mg アセリオ静注液 1000mg バッグ/100mL 点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【202mL/h】	1 A 1 袋
3	バベンチオ点滴静注 200mg/10mL 大塚生食注 250 mL 点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【250.5mL/h】	10 mg/kg 1 袋
4	生理食塩液 PL「フソー」 50 mL 点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【600mL/h】	1 瓶

## リュープリンSR 泌尿器

がん腫	前立腺癌
1サイクルの日数	84

## Day1

1	リュープロレリン (リュープリンSR)	11.25 mg
	皮下注射	



リュープロレリン(月1回) 泌尿器

がん腫	前立腺癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	リュープロレリン	3.75 mg
	皮下注射	

## リュープリンPRO(6ヶ月1回) 泌尿器

がん腫	前立腺癌
1サイクルの日数	168

## Day1

1	リュープロレリン (リュープリンPRO)	22.5 mg
	皮下注射	

